





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1792/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1792/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1792/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1792/A

q. 1. 1.

1792

A

L

42580  
PEDANII  
**DIOSCORIDIS**

ANAZARBEI, DE  
MEDICA MATERIA

LIBRI SEX,

Ioanne RVELLIO Suefsionensi  
interprete.

*HIS ACCESSIT, PRAETER  
Pharmacorum simplicium catalogum,  
copiosus omnium ferme medela-  
rum siue curationum  
Index.*




FLORI FRUCTUS

PAULATIM SUCCRESKIT.

LVGDVNI,  
Apud Iacobum Faure.

1554








# NAENIA IN OBITU

RUELLII.

Cesserat è viuis ad celsa Ruellius astra,  
Constitit atq; alti clarus in arce patris:  
Cū perijſſe hominē rata Mors, ait, Ecce triūphe  
Clamet io, cui cui victima grata cadit.  
Vicimus, en nostras toties qui eluserat arteis,  
Qui toties mortem vicerat, interijt.  
Ast vbi in ore virūm versari auditq; videtq;  
Hunc magis atq; magis viuere, victa fremit.  
Cui Peā, quibus ortus erat mihi redditur astris,  
Quemq; putas victum, bina trophæa refert.  
Prima, quod olim animas mille atro depulit orco  
Altera, quod moriens nunc quoq; mille rapit:  
Nempe Dioscoride Romana per oppida ducto,  
Cui toga, cui potior lingua Latina, sua est.  
Cetera quid memorem victuri scripta laboris,  
Naturā & stirpes, pharmacāq; omne genus?  
Non villas, nec equos, nec curam diuitis agri,  
Nullāq; vitæ hominis commoda præterijt,  
Quæ non tractarit, sapientibus edita Graijs,  
Quæ non reddiderit, vel meliora suis.  
Viq; mage inuideas, dicam amplius, edidit annis  
A mille haud quisquam tanti opus ingenij.






E P I T A P H I U M

Ioannis Ruellij , Diony=  
sio Corronio au=  
thore.

*Hic situs est, in quo vixit medicina, Ruellus:  
In quo naturæ notitia, atque poli.  
In quo prima fuit dos, Græcū vertere scripta  
In Latium, ac Latioscribere digna Ioue.  
Olim erat affinis, nunc est conuiua deorum,  
Premiaque illa sui grata laboris habet.*






P E D A N I I

# DIOSCORIDIS

A N A Z A R B E I, D E

Medicinali materia, li-  
bri primi præ-  
fatio,

Ioanne R V E L L I O Sueſſionenſi  
interprete.



*Vanquam, amicissime Aree, com-  
plures non veterum modo, sed recē-  
tiorum quoq; de medicamentorum  
compositione, viribus, atq; probatio-  
ne cōmentati sunt: nobis tamē nec  
vanum, nec à ratione abhorrētem impetum ani-  
mi ad hoc opus incesſiſſe, tibi oſtendere tentabi-  
mus: quòd eorū nonnulli abſolutū nihil ediderūt,  
aliq; quàm plurima, quæ auditu percunētando di-  
dicerāt, ſcriptis tradiderūt. Siquidem Bithynus  
Iolas & Heraclides Tarentinus, omiſſa præſus  
herbarū tractatione, rem ſanè quàm paucis per-  
ſtrinxerunt. Neque verò omnes illi de metallicis  
quicquā rebus aut odoramentis memorie prodi-  
derunt. Crateus autem herbarius, & Andreas  
medicus, qui cæteris diligentius hac in parte ver-  
ſati videntur, radices multas apprimè vtileis,  
herbāſq; haud quaquam adnotatas, reliquerūt.*



Veruntamen priscorum subscribere oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. In minoribus minus assentiendum: è quibus Iulius Bassus, & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiade omnes, medicinalem materiam vernaculam cognitamque vulgò, dignam censuerunt, quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: & ut medicamentorum vires probationesque cursim complexi, sic nullo experimento eorum effectus colligentes, inani verò reddendarum causarum studio verba fundentes, alia pro alijs scriptando, rem in aceruum congeriemque controuersitarum extulerunt. Siquidem, qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascentis in Italia, chamaeleæ succum esse contendit: androsæmonque eandem herbam cum hyperico esse. quinetiam aloën in Iudæa fossilem nasci, & pleraque his similia exponit, reclamante euidencia, quæ prorsus veritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine iisdem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantibus nullamque cognatione coniunctas vireis collidentes: pariterque cetera per elementa literarum scripta in ordinem dignoscentes, quò facilius memoriæ manderentur, gedorū sim nera & eorum effectus à sua cognatione displicium gentes. Nos verò ab inuentute, ut ita dicam, instudium. uenta, iungi desiderio cognoscenda materiæ allesti,

permis



per multis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem vitam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros cōtulimus: quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum, quo nos prosequeris, affectum. Etenim natura cum in omneis eruditione exultos, tum verò in eos quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles: in nos etiam aliquantò peculiaris. Enimvero non parum præbet tæe probitatis argumentum, optimi viri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam unà nobiscum degentes novimus, cum mutuam inter vos benevolentiam emulatione dignam intueremur. Admonitum autem te velim, eosque, qui in hosce commentarios incident, ne in verbis facultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima vis ipsi exactissimè cognovimus: quedam etiam ex ea, de qua inter omnes convenit, historia, percunctationeq; rerum apud singulos vernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differet ab alijs ordine tradito, genera medicinarum virèsq; describantur. Quod autem necessaria sit medicamentorū ratio, nemo est fermè qui ignoret: quod ea & toti arti coniuncta sit, universisq; eius partibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atq; mixturas. & facta in morbis pericula extendi, & incre-



mentum capessere potest, quàm plurimum confe-  
 rente singulorum medicaminũ cognitione. Quin  
 etiam vernaculam familiarẽq; materiam com-  
 plectemur, vt perfecta sit quæ à nobis relinque-  
 tur doctrina. Verũ in primis curã impedere oportet,  
 vt suis temporibus singula & demetãtur &  
 recondantur. certè pro horum ratione aut valēt  
 viribus, aut euanido nullòq; munere funguntur.  
 Serena igitur cœli cõstitutione demetēda sunt.  
 Magni siquidẽ refert inter colligendum, si vel  
 squalores vel imbres infestisint: quemadmodũ  
 si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & ventis ex-  
 posita sint & perflata, frigidaq; & aquis caren-  
 tia: in his enim locis vires eorum longè validio-  
 res intelliguntur. Contrã, quæ in campestribus,  
 riguis, & opacis, caterisq; locis à vento silentibus  
 enascuntur, plerunque degenerant, & minus vi-  
 ribus valent: multòq; magis, si non suo tempore  
 nec opportunè colligantur, aut si per imbecillita-  
 tem intabuerint. Neq; ignorandum, sæpe pro pe-  
 culiari loci natura, aut anni clemētia, maturius  
 aut serius adlescere. Nonnulla propria vi, hye-  
 Plantæ, me florent, & folia pariunt: quedam bis anno  
 vt exa- florifera. Quare cui in animo est horum peritiam  
 Et cognoscere assequi, necesse est cum prima germinatione solo  
 scantur, emergentibus, adultis & senescentibus adesse.  
 omni tẽ- Nam qui pullulanti herbæ duntaxat adstiterit,  
 pore in- adultam cognoscere non potest: neque qui adul-  
 piciedæ. tam tantum inspexerit, nuper erumpentem no-  
 scet.




scet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum faciē, caulium proceritates, florum seminiſque magnitudinem, & id genus alias peculiareſ notas, nōnulli, qui olim haſ rerum varietateſ non perſpexerunt, magno in errore verſentur. Quæ cauſa etiam nonnulliſ ſcriptoribuſ impoſuit, qui herbaſ quafdam, verbi gratia, gramen, quinque foliū, & tuſilaginē emittere florē, fructum & caulem negant. Ergo qui ſæpiuſ ad viſcēdaſ herbaſ & earum nataleſ ſe contulerit, earum cognitionem maximē conſequetur. Scire etiamnum conuenit, ſola ex herbaceiſ medicaminibuſ veratri genera, nigrum, inquam, & candidū multiſ edurare anni: reliqua à trimatu inutilia. Quæ verò frutiſoſa ſunt, ſicut ſtæchaſ, trixago, polium, abrotonum, ſeriphum, abſynthium, hyſſopum, & alia id genus ſemine pregnantia demetantur, floreſ quoque antea, quā ſponte ſua decidant. fructuſ autem, ut maturi decerpantur neceſſe eſt: & ſemina, vbi ſiccari cœperint, priuſquam defluāt. Herbarum ſuccuſ & foliorum elici debet, germinantibuſ tum primum cauliculiſ. Lac & lacrymæ excipiantur, inſiſo per ſummum adoleſcentiæ vigorem caule. Radiceſ, & liquamenta, corticeſ ve ut recondantur, eximere conuenit cū herba ſuiſ foliſ exuuntur. Siccantur etiam expurgatæ inibi, lociſ aſperginem non redolentibuſ: ſed quæ luto aut puluere ſunt obſitæ, aqua elui debent. Flores & omnia quæ iucundum odo



rem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obdu-  
ctis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs  
semina, vt perennent, aptè inuoluuntur. Liqui-  
dis medicaminibus densior materia, argentea,  
vitrea aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si mo-  
do rara non sit, accommodatur: & lignea, præ-  
sertim è buxo: sed ænea vasa ocularijs medica-  
camentis liquidisque, & omnibus ijs, quæ ace-  
to, pice liquida, aut cedria componuntur. Adi-  
pem autem & medullas stagnæis vasis recondi  
conuenit.

## Iris.

## CAP. I.



IRIS à cælestis arcus similitudi-  
ne nomen accepit. Folia fert gla-  
dioli, sed maiora, latiora, & pin-  
guiora. Flores in caule equalibus  
inter se spatijs distant, incurui,

\* *ἰρις* - varij: siquidem candidi, pallentes, \*lutei, purpu-  
reæ, non rei, aut cærulei conspiciuntur: quæ diuersi coloris  
\* *ἰρις* - specie, quedam cælestis arcus imago representa-  
\* *ἰρις* - ri videtur. Radices subiacent geniculatæ, \*du-  
idest, so- re, odoratæ: quæ frustulatim dissectæ, in vmbra  
lidæ. siccantur, & traiectæ lino reconduntur. Melior  
\* *ἰρις* - est Illyrica, & Macedonica: & inter has lauda-  
\* *ἰρις* - tissima, quæ pumila ferè & densa constat radi-  
\* *ἰρις* - ce, frangenti contumax, subrufo colore, \*gustu  
est, gu- amaro, odore perquàm sincero, ita vt nullum  
stu feruē prorsus situm redoleat: quæ dum tunditur, ster-  
tioræ. nutamenta mouet. Secundum locum habet Asi-  
cana,



cana, candicans, gustuq; amara. Teredines in  
vetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores red-  
di solent. Vis omnibus excelsatoria, extenuans,  
contra tussim efficax: humorum qui agrè reij-  
ciuntur crassitiem digerunt, bilem crassamq; po-  
tuitam ex hydromelite drachmis septem epotæ  
purgant, somnum conciliant, lacrymas ciunt, tor-  
minibus medentur. Eadem potæ ex aceto auxi-  
liantur serpentium ictibus, lienosis, cōuulsis, per-  
frictionibus, horroribus, & quibus genitura ef-  
fluit: menses ex vino potæ pellunt. Decoctum ea-  
rum, sceminarum fotibus utiliter imponitur, ad  
emolliendos locos, laxadāq; in eis venarum spira-  
cula: ischiadicis infunditur, fistulas, ac sinus car-  
ne explet. Radices ex melle glandis modo subdi-  
ta, partus extrahunt: quinetiam coctæ & illitæ,  
strumas, veteresq; duritias emolliunt. Siccæ quoq;  
ulcera replent, & cum melle purgant: nudata  
ossa corpore operiunt: doloribus capitis, cum ace-  
to & rosaceo magna utilitate illinuntur. Ad-  
mota cū albo veratro: & duabus mellis partibus,  
lentigines & vitia cutis in facie à sole cōtracta  
emaculat: pessis, malagmatis, & acopis inserun-  
tur. In vniuersum, magni ad omnia vsus.

## A N N O T A T I O.

Censetur Galanga officinarū. Nec enim  
Acori genuinam aut faciem aut naturam  
obtinet, quam vulgus herbariorum hoc no-  
mine solet indicare.

Aco



**A**corum folia iridis habet, angustiora tamen radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo caespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimū est densum, candidum, plenū, carie non excisum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum,

\* **Pli-** quod asplelion dicunt. Radici vis calfactoria. De  
ninus ani coctum potu urina cit: prodest lateris doloribus,  
so habet: & iocineris atque thoracis: item torminibus, vul  
ac sic e- sis, ruptis: lienem absumit, urinae stillicidio & ser  
tia Mar pentum ictibus auxiliatur, insidentibus ad mu-  
cello in liebres affectus iridis modo utiliter imponitur,  
commen oculorum caligines succo discutit, antidotis ra-  
ta. teste, dix magno usu commiscetur.

Græci

Meum. CAP. III.

quidā re **M**æon, quod Athamanticū vocāt, in Ma-  
tustissi- cedonia & Hispania plurimū gignitur.  
mi codi- \* anetho folijs & caule simile, sed eo crassius bi-  
ces. quæ nūm fermē cubitorum altitudine attollitur spar-  
diuersi- sis in obliquum rectūq; radicibus, longis, tenui-  
tas facit bus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ fer  
vt qua- uesacta ex aqua, vel trite citra coctionem, præ-  
lis herba clusorū renū vesicæq; farctæ vitia potu leniunt,  
sit Meo, urinae difficultati medetur. stomachi inflationes  
nō facile discutiant. Torminibus, affecte vulvæ, articulo-  
quis con rum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trite  
ecerit. cum melle in eclegmate auxiliatur, sanguinem  
per



per mēstrua pellunt, de sectionibus feruefactæ:  
infantibus autem illitæ imo ventri, vrinas mo-  
uent: quod si plus quàm deceat ex his bibatur, ca-  
put dolore afficiunt.

## Cypirus. CAP. IIII.

**C**ypirus, quem aliqui erysiceptrum, vt aspa-  
lathum appellant, folia fert porraceis proxi-  
ma, sed longiora & exiliora: caulem odorati iun-  
ti, cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius  
racumine minuta folia cum semine exoriuntur:  
radices, quarum in medicina est vsus, coherentes  
inter se, oleis oblongis similes, aut rotundæ, ni-  
gro colore, suauī odore, amaro gustu. In lacuno-  
sis, palustribus & cultis enascitur. Optima est  
grauissima, densa, fractu contumax, plena &  
aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi,  
qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus  
insulis petitur. Huic calida vis inest. Venarū spi-  
racula laxat, vrinam ciēt, ad calculos aquamq;  
subter cutem vtilissimè, bibitur, aduersus scorpio-  
num ictus remedio est, perfrictionibus vuluæ &  
præclusionibus fotu prodest, pellit menses. Contra  
vlcera oris etiam si depascant vorēntq;, farina  
eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, &  
vnguentorū spissamentis bene adiūci solet. Aliud  
cypiri genus tradunt in India nasci, gingiberis  
effigie, quod manducatum croci vim reddit, gu-  
sta amaro sentitur, & illitū præsentem psilothri-  
vim exhibet.

Card



## Cardamomum. CAP. V.

**C**ardamomum optimum est: quod ex Coma-  
gene, Armenia, Bosphoróq; deuehitur: in In-  
dia quoque, & Arabia prouenit. Eligi debet ple-  
num, frangenti contumax, occlusum, farctúmq;  
(quod enim huiusmodi non est, exoletum iudica-  
tur) & gustu acre, subamarum, & odore caput  
tentans. Ex calfactoriam vim habet, potúmque ex  
aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tusses, ner-  
uorúm resolutionem. Item ad rupta, vulsa, termi-  
na: latus ventris tineas excutit. Ex vino autem  
potúm, renibus, difficultati vrinae, à scorpione ictis,  
neq; non omnibus venenum vibrantibus, auxi-  
lio est. Cum cortice radicis lauri epota drachma  
calculos comminuit, partus suffitu enecat, scabiē  
ex aceto illitum adimit. Et ad vnguentorúm spis-  
samenta additur.

## Nardum. CAP. VI.

**D**uo nardi genera: vnum Indicum, alterum  
Syriacum appellatur, non quòd in Syria  
proueniat, sed quòd montis, in quo oritur, pars  
vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur.  
Ex hoc Syriaci genere precipuum est recēs & le-  
ue, largam gerens comam, flauúm colore, perquàm  
odoratum, ac cyperum redolens, breui spica, ama-  
ro sapore, linguam siccante, quod diu in sua odo-  
ris gratia permaneat. Ex Indicis autem nar-  
dum quoddā Gangitis vocatur, à fluuio Gange,  
apud quem enascitur, mōtem præterfluēte: quod  
gen



genus ob multam loci, in quo prodit, viginem,  
 viribus infirmius est, atq; procerius adolescit, plu-  
 res ferens spicas ab vnica radice comesas, vnâq;  
 conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum au-  
 tē odoratiùs spica breui ac mutila, odore cypero  
 ricino, ceteras habens Syriaci dotes. Est & ge-  
 nus quoddam, cui Sampharitico nomē locus in-  
 didit, frutice breui, in magnas se spargens spicas,  
 candidiore interim medio caule, hircorum virus  
 supra modū redolente: quod improbatur. Made-  
 factum vendi solet: quod vitium ex eo deprehen-  
 ditur, quòd candida sit spica, & squalida, \*nul-  
 lōq; puluere obsita. Adulteratur stilbio cū aqua,  
 aut palmeo vino, inspissationis ponderisq; causa  
 inspirato. Intueri autem oportet si lutum radici-  
 bus insideat, & incerniculo puluerem excutere,  
 eluendis manibus vtilem. Vim habent excalsa-  
 toriam, & exiccantem. Vrinam mouent, aluum  
 potu sistunt, vuluæ profluvia, saniēmq; apposita  
 supprimunt. Nauseæ ex aqua frigida auxilian-  
 tur, & stomachi rosionibus, inflationi, iocineri, re-  
 gio morbo, renum vitijis. Aquæ autem incoctæ  
 fetu ad insessum, vuluæ inflammationibus me-  
 dentur: ad glabras oculorum genas valent: si qui-  
 dem eas ad densiorem pilum reducūt. perfusis hu-  
 more corporibus insparguntur. Miscentur anti-  
 dotis, & in fictili nouo non picato ad ocularia me-  
 dicamenta reconduntur, trita in farinā, & cum  
 vino in pastillos coacta.

\* καὶ μὴ  
 ἵκεν ἢ  
 χρῶν,  
 id est, &  
 quod na-  
 tiua ca-  
 reat la-  
 nugine.

Nard



## Nardum Celticum. CAP. VII.

**C**elticum nardum nascitur in Ligurie Alpibus, saluunca patrio nomine appellatū, provenitque in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat usus est, & odoris suauitas: vnde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exempta terra panito solo atq; humeti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem vtile, cum aceroso, alienoque propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris gravitate, sed facilis cognitio: namq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neq; odorata, vti verum nardum est. Itaq; radices, atq; cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, vino excipiuntur, digerunturq; in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maximè recens, iucundi odoris, radice numerosa coherēs, plenum, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacum pollet: sed vehementius urinam cit, & stomacho vtilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absynthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & vesicæ vitia, et venenatos ictus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

Mora



Montanum nardum. CAP. VIII.

**M**ontanum nardū, quod ab aliquibus thy-  
lactis, & nitrū appellatur, in Cilicia, &  
Syria nascitur, surculo & folijs eryngio simili-  
bus, minoribus, minimè tamen spinosis, asperisq;.   
Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odo-  
ratis, ceu hastulæ regie, sed longè gracilioribus,  
& longè minoribus. Neque caulem, neque fru-  
ctum, neque florem profert. Ad eadem, ad quæ  
Celticum, efficax.

## ANNO TATIO.

\*Minoribus. ] Fuchsius in opere de Stirp.  
maioribus legendū suspicatur. Plinius, qui  
hinc omnia mutuatus est, mollioribus ha-  
bet. quod sanè vtrunque herbe, quàm aptis-  
simè quadrat.

\*Cytino hyoscyami. ] id est, flori hyo-  
scyami, qui veri cytini, quem domesticæ  
punicæ florem esse nouimus, aliquam ex-  
primit effigiem, vt in eius descriptione  
author est Dioscorides.

Asarum. CAP. IX.

**A**sarum, quod & ipsum aliqui syluestre  
nardū appellant, hederæ folijs \* minori-  
bus multò, rotundioribusq;, floribus \* cytino hyo-  
scyami similibus, purpureis, inter folia proximè  
radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen  
acinosum. [Cauliculos habet angulosos, asperos, Deest in  
& molles] radices numerosas, geniculatas, te- Græco.



nues, obliquas, gramine non dissimiles, longè tamen graciliores: odoratas, excalfacièntes, & quæ linguam vehementer mordent. Excalfactoriam vim habet: urinam cit, hydropicis & vetusto coxendicij dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa pote, menses trahunt, & veratri albi modo purgant. In vnguenta additur. Umbrosis montibus provenit, sed plurimum in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italiae Iustinensi agro.

## A N N O T A T I O.

\*Maiores ] Rectius fortè minoribus legas, ut Ruellius quoque monuit. Flores siquidem Valerianæ nunc dictæ, quam Phu esse omnes ferè suspicantur, Narcissum effigie expressissimè quidem referunt, eo tamen longè sunt minores: ni fortè soli diversitati id imputandum censeas.

Phu.

CAP. X.

\*Hippo-  
selini.

**P**Hu, quod & aliqui sylvestre nardum appellant, nascitur in Põto, folio\* olusatris, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, levi, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, floribus narcissi proximis, \*maiores, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flavescentibus, odoratis, cum quadam odoris gravitate nardum

emis



emulantibus. Excalfacit, vrinam mouet, si sicca  
tui detur. Decoctum eadem præstare potest. ad  
lateris etiam dolorē efficax, menses cit, antidotis  
inseritur. Adulteratur radice ruci ammixta: sed  
maleficiū deprehēditur: quoniam hæc dura est,  
& frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

Malabathrum. CAP. XI.

**M**alabathrum arbitrantur aliqui esse In-  
dici nardi folium, falsi quadam odoris co-  
gnatione: permulta enim nardum olent, quem-  
admodum phu, asarū, niris. secus autem res se ha-  
bet. Nanque malabathrum folium sui generis  
est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris  
modo innatans aquis, sine radice. Id collectum  
statim lino transsinitur, & siccatum reconditur.  
Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum  
aridis fruticibus vri: quod vbi non euenerit, ne  
amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex  
candido nigricans, integrū, nec fragile, odore ca-  
put feriens, quod diu in sua vi odore permaneat,  
& nardū sapore imitetur, nullo salis gustu. Infir-  
mum verò & minutim contusum, præsertim si ca-  
riosum virus olet, vitiosum est. Easde nardo sor-  
titur vires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam  
vehementius ciet, ac stomacho magis prodest ma-  
labathri vis. Lippitudinibus, inflammationibusq;  
tritum & in vino feruefactū commodè illiniur:  
subditum lingue, oris halitū & suauitatem com-  
mendat. Vestium quoque odorem interpositum



seruat, & ab erosione tuetur.

ANNOTATIO.

Officinis falso Cinnamomum hodie dicitur. Est enim earum Calsia, non quam hic Dioscorides, cui, sicut & alijs veteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro de Composit. medic. depinxit.

Calsia. CAP. XII.

**C**alsia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fulvescēs, pulchri coloris, coralli æmula, perquam angusta, \* *μετὰ* lingua, crassa, & fistulosa, gustu mordens & *πολλῆς*. \* cum aliquanto feruore adstringens, aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis, i. cū mul ca, appellatur, ab Alexandria negotiatoribus, daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locū tenet antedicta. Tertia, cui Muscletico blasto. id est germi, cognomē est. Reliquæ viles, \* Græ- & quæ \* aphemum dicitur, nigra, insuavis, corcus asy- tice tenui, ac rimoso: & quæ darca, et citto vocita phemon. tur barbaro nomine. Similior huic est pseudocasia, quā ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, herentēque medulle corticem habeat. Inuenitur etiam lata quedam fistula, mollis, levis, surculosa, quæ antedicta præfertur. Damnatur candicans, scabra,



bra, hircinum virus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, vri nam ciendi, siccandi, & leniter adstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lentigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra viperarum ictus pota auxiliatur, aduersus intestinas inflammationes omnes & renũ vitia, pota proficit. Fæminis in solio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationem vuluæ. Ea duplo pondere medicamenti mista, cinnamomi vicem supplet, si ipsum desit: nam eisdem effectus præbet, ad plurima perquam utilis.

## Cinnamomum. CAP. XIII.

**C**innamomi genera plura, patrium sibi nomen vendicãtia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassiæ, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat, effigiem. Sed in eo genere recēs, nigrum, ex vinoso in cinereum vergens, leue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè olens. Optimi ferè indicii, iucundi odoris proprietate cōstat. Inuenitur enim cū optimo, eoque quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomi proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quadãtenuis salsum, quod non citò confricanti asperum, aut friãtilanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum. facilis est huiuscemodi probatio: nãque fragmenta miscel-



lanca quaedam esse videntur. Quae autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consuluntur, olfactum expleant, deterioris dignotionem impediunt. Est etiam montanum, crassum, pumilum, fulvescens admodum. Tertium à Mosylitico, perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, cādicans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens radicem, quae cassiam plantam representat. Quintum genus, odore nares ferrens, subrufum & cortice fulvae cassiae simile, tangenti firmum, minus nervosum, densa radice firmatum. Is quae thuris, cassiae, myrti, aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at leue, et lignosum circa radicem, ut inutile reijcito. Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamomo cognomen est, vile, inualidi odoris, solutarumque virium. Vocatur etiam Zingiber, cum tamen sit xylocinnamomum, praebens quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomum, sarmēta longa robustaque ferens, odore longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamomum omne excaesat, emollit, & concoquit, urinam ciet: tam menses, quam partus potum aut ex myrrha impositum pellit, contra bestias, quae virus ei aculantur, venenaeque conuenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit.



discutit, crassitiem extenuat, lentigines, & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit: cōtra tusses, defluxiones, aquam subter cutem fusam, renū vitia, & vrine difficultatē efficax est, vnguentis pretiosis inseri solet: & in summa, magnū ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, vmbraq; siccatum, quò diutius eduret, reconditur.

[Est & quoddam cinnamomum, quod aliqui Desunt pseudo cinnamomum appellant, perquā denso in Gre-atque crasso sarmento, longè tamen inualidius co-cinnamomo, & odore, & gustu.]

## Amomum. CAP. XIII.

**A**momū exiguè fruticat, ex ligno se conuoluens in racemi modū. flore, ceu cādi-de violæ, paruo: folijs \* vitis albæ similibus. Lau-  
datur quā maximè Armeniacū, \* fuluo auri  
colore, ligno subrufo, valde odorato. Medicum,  
quoniam in campestribus, & aquosis enascitur, \* bryo-  
infirmius esse constat. Est autem magnum, \* nie.  
subuiride, tractu tenerum, frutice venoso, colo-  
re origani. Ponticum verò subrufum, paruum, \* χρυσί-  
fragile, racemosum, fructu turgens, & odore \* πορρί-  
nares feriens. Deligito recens, candidum vel \* χρόα, id  
subrubrum, quod nec adstrictum cihereat, nec est, colo-  
cōvoluatur sed solutum diffundatur: seminis ple-  
num, vuis paruis simile, graue, valde odoratum, re auris  
modo cariem non contraxerit, acre, gustu mor-  
dens, simplici colore non euariante. Vim habet  
calfaciendi, adstringendi, exiccādi. Somnum al-



licit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes, & meliceridas concoquit, discutitq; iuuat quos scorpium percussit, ex ocimo illitum, & podagricis confert, inflammationes oculorum, viscerumq; lenit ex vna passa, ad vuluarum vitia in pestis, aut in seſſionibus vtile est. Decoctum iocineri, renibus, podagra, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & pretiosissimis vnguentis. Adulteratur amomum herba simili, quæ amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nasctur in Armenia flore origani. Quare in huiusce modi probationibus fragmēta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab vna radice integros surculos emittunt.

Costus. CAP. XV.

**P**Recellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, leuis, vber, vt ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei excalfactoria, vrinā ciet, menses pellit, vitys, quæ vuluam malè habent, tam impositu quàm fotu & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex vino & absynthio. venerem ex mulso stimulat, latus ventris tinea ex aqua pellit, horroribus ex oleo, ante febrium



brium accessiones, & neruorum resolutionibus oblinitur: vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus emēdat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admistis helenij comageni præduris radicibus, adulterēt: quod deprehensum facile est: siquidem neq; gustu feruet helenium, neque validum odorem vibrat, vt caput tentare possit.

Odoratus iuncus. CAP. XVI.

**O**'doratus iuncus, in Africa & Arabiana Offici-  
scitur. Laudatissimus ex Nabathea, proximi-  
mus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognō-  
mināt, alij teuchitim: pessimus ex Africa. Eligē-  
dus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, ru-  
bentibus fragmētis, qui manibus confricando ro-  
sa odorem emittit, igne & mordacitatis ad linguā.  
Floris, culmorum, radicisq; est vsus. Vim vrine  
eiundæ habet, menses pellit, discutit inflationes,  
caput aggrauat, modicè adstringit, comminuit,  
excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius  
in potu utilis sanguinem reijcientibus, doloribus  
stomachi, pulmonis, iocineris, & renum miscetur  
antidotis. Radix adstringentior est: ideo fa-  
stidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma  
vna cum pari pondere piperis, per dies aliquot  
datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad  
desidentium fatus, vtile est.

Calamus odoratus. CAP. XVII.

**C**alamus odoratus in India nascitur: me-  
lior est fuluus, dense geniculatus, & qui



assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & adstringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Urina potu ciet: quare cum graminis aut apij semine coctus, in aqua subter cutem fusa morbo, renum vitij stillicidio urina, ruptisq; commodè bibitur: menses & potu & appositu pellit. tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagmatisq; odoris gratia commiscetur.

\* Mar-  
cello loc<sup>o</sup>  
hic suspe-  
ctus.

Balsamum.

CAP. XVIII.

**B**alsamum, arbor \* albæ violæ, lycij, siue pyracanthæ magnitudine conficitur. Folium rutæ proximum longè candidius, perpetuò virens: in Iudea solùm quadam valle & Aegypto nascens, his differens modis: scabritia, proceritate, gracilitate. Quodigitur tenui & capillacea coma est, theristum vocant, quasi demessile: fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetatur. Aestivis sub ortu Canis ardoribus, arborum virgibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem Opopalsamum vocant: sed tam exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidè quàm senis septenive congi cogantur, inibiq; pondus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, validi odoris, syncerus, non ad acorem vergens, dilui facilis, lenis, adstringens, ac modicè mordens gustu. Sed variè vitiatur, misto ab aliq



aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani vnguento: item susino, metopio, melle, aut Cypria ceraliquida. quod maleficiū facile deprehenditur. Nanque merus in laneam vēstem fusus, neque maculam facit, neque si eluatur notam relinquit: vitiatuſ autem inhaeret, & lac inſtillatuſ coagulat, quod adulteratuſ nō efficit. Quinetiā ſynceruſ in aqua aut lacte celerrimē liquatur, colorēq; lacteſcit: vitiatuſ verō olei modo innatat, ſe cōcluens, aut in ſtellæ modū diffundēs. Synceruſ ſeneſcēs craſſeſcit, deteriorq; redditur. Hallucinātur, qui aqua concretū peſſimū ire, & ad ima ſidere arbitrātur, poſtea diſſipatū ſupernatare. E ligni genere, quod xylobaſamum vocāt, probatur recēs, ſarmēto tenui, foliū odoratū, quadāntenus opobaſamum ſpirans. Neceſſariuſ etiam ſeminis erumpit uſuſ, quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderoſum, mordens guſtu, ſeruens in ore, modicē opobaſamum olens. Adulteratur ſemine hyperico ſimili, quod à Petra oppido deſertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, viriū ignauia, ſapore piperis. Efficaciſſima viſ ineſt ſucco, & quā maximē calfaciens: abſtergit quæ tenebras oculorum pupil- lis offundunt, medetur perfrictionibus vuluæ cū roſaceo cerato appoſituſ: menſeſ quoque, ſecundus & partuſ extrahit, horroreſ illituſ diſcutit, vlcera ſordida expurgat & cruda cōcoquit, vri-  
nam potu ciet, agrē ſpirantibuſ prodeſt: datur  
in



in lacte contra aconitum haustum, aut serpentium  
ictus: miscetur acopi, malagmatis, & antidotis.  
In summa, precipua authoritas succo, secunda se-  
mini, minima ligno. Semen comode potui datur  
doloribus lateris, pulmonum vitis, tussi, ischiadi-  
cis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, vrine  
difficultati, torminibus ac serpentum morsibus:  
ad muliebres suffitus perquam utile est. vulnam  
aperit in defensionibus balnearum decoctum, &  
humorem euocat. Lignum easdem habet vires,  
aliquanto minores. Ex aqua potum cruditatibus,  
torminosis, vulsis, venenatorum ictus opitula-  
tur, vrinam cit, ad capitis vulnera cum sicca iri  
conuenit, squammas osium extrahit, & ad un-  
guentorum spissamenta additur.

## Aspalathus. CAP. XIX.

\* ζυλῶ-  
δης id  
est, ligno-  
sus.

**A**spalathus, alij erysiceptron, frutex est  
\*surculosus multis spinis horrens, nasci-  
tur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula:  
quo ad unguentorum spissamenta pigmentarium  
vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice ru-  
bens, aut in purpuram vergens, densus, odora-  
tus, gustatu amarus. Est & alterum genus can-  
didum, lignosum, sine odore: quod deterius habe-  
tur. Vim calfaciendi cum adstrictione obtinet.  
vnde decoctum cum vino ad tetra oris vlcera col-  
luenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordi-  
da vlcera infunditur subiectum impesse, partum  
extrahit, aluum sistit eius decoctum: & sangui-  
nis



nis reiectionem potu cohibet, vrine difficultatem inflationeque discutit.

Muscus.

CAP. XX.

**B**ryon, id est muscus, à quibusdā splachnon appellatur: in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneum: in quo genere candidum & odoratius prestat, nigricās improbatur. Adstringendi vim habet. Decoctum insidentium vuluis vtile: vnguento balanino, oleis que inspissandi gratia inseritur: thymiamatum, acoporūque compositionibus conueniens.

Agallochum.

CAP. XXI.

Putatur  
lignū a-

**A**gallochū, lignū est, quod ex India atq; loēs offi- Arabia deportatur, thui e ligno simile, cinarū. maculatū, odoratum, gustu adstringens, cū quadam amaritudine, cute verius quā cortice vesti- tur, aliquātulum versicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia. Sudores arcet toto corpori insparsum: pro thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachme vnius pondere, humida stomachi vitia, & imbecillitatem, feruorēq; mulcet: si lateris, iocineris re dolor excruciat, si dysenteriae, aut tormi- na infestant, ex aqua bibere prodest.

Narcaphthum

CAP. XXII.

**N**arcaphthum ex India defertur, cortico- sum, simile sycomori libro: quod incūdi odo- ris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis com-  
pess



positis: constructionibus rulu.e suffitu prodest.

Cancamum. CAP. XXIII.

Videtur **C**ancamum Arabici ligni lacryma est, myr-  
quibus- rhæ quodammodo similis, virosi gustus,  
dā Lac- quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo, additis  
ca offici- styrace & myrrha, suffiuntur. Vim proditur ob-  
narum. tinere extenuandi obesos, si ternū obolorum  
pondere ex aqua, aut mulso aceto, plusculos dies  
ebibatur: lienosis datur, comitialibus, & suspi-  
riosi: mēses cum aqua mulsa pellit, oculorum ci-  
catrices confestim emendat, vino madefactum  
medetur eorundem hebetudinibus, aduersus gin-  
ginas humore pregnanteis, doloresque dentium,  
non aliud efficacius.

Cyphi. CAP. XXIIII.

**C**ypri odorati suffimenticōpositio est, dicata  
dys, qua abunde Aegyptij sacerdotes vtun-  
tur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur  
in potu. Per multe componendi rationes, qua-  
rum vna hæc est: Sumito cyperi dimidium sexta-  
rium, cum pari baccarum iuniperi adulta modo:  
vne passe pinguis, exemptis vinaceis, minas duo-  
decim: resine repurgate minas quinque: calami  
& iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum  
minam: myrrhæ duodecim: vini veteris sexta-  
rios novem, cum duabus mellis minis: ruam pas-  
sam detractis vinaceis tussam, cum vino & myr-  
rha subigito: cætera tusa & cribrata adycito, die  
vno humorem combibere finito, dein mel coquito  
dumz



dum sibi glutinis asciscat crassitudinem, eliquatâ resinam accuratè permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile vas recondito.

## Crocum. CAP. XXV.

**C**Rocum, optimum in medendi usu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum à quo detractum est nihil, quod madefactum manus inscit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre: in huius generis non est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coriceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio, è monte Olimpo. dein ex Aegibus Aetoliæ, Cyrenaicum & Centuripinum inter Sicilica omnia viribus infirmius est. Omnium natura oleacea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortarijs dicauerunt: quibus de causis magno venditur. Vilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immixto crocomagmate tuso, atque etiam sapæ sublitu: contrita, quò pondus adijciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine: sed maleficium declarat insidens pulvis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odoratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atque substringendi habet: vriam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passio biber



biberint crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cū humano lacte, cohibet: additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur: ad vulue etiā sedisq; cataplasmata, vtiliter inditur: venerem stimulat, vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet, auricularijs collectionibus vtile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole siccari oportet, celeritèrque versari. Urinam mouet radix ex passo pota. Fit etiam expressis vnguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, quod crocomagma vocat. Optimum est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, læue, subamarum, quod mades factum croci colorem reddit, gustatūq; vehementer dentes ac linguā inficit, \* multis durans annis, quale est quod à Syria defertur. Habet suas vires ad delenda quæ caliginē oculis obuerfant: urinam cit, calfacit, concoquit, & emollit. vires croci proportionē quadātenus representat, quādoquidem plurimam croci partem sibi vulgò crocomagma vendicat.

Enula  
cāpana.

Helenium. CAP. XXVI.

\* in p̄osu  
vōis, uñ  
cū uōis, id  
est, in mō  
tosis ac  
opacis.

**H**elenium folia habet verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga, caulem quibusdam in locis non emittit, radicem subalbidam, interdum subrufam, odoratam, subacrem, vegetē, magnam, ex qua agnate propaggines liliorū aut aristosis ac modo feruntur. \* Montibus in vmbrosis, siccoq; solo provenit. Foditur æstate radix, particulatimq;



timq; dissecta siccatur. Potum radicis decoctum menses & vrinas ciet. ipsaq; in eclegmate ex melle prodest tussi, orthopnoeæ, ruptis, conuulsis, inflationibus, & serpentium morsibus. In summa excalfaciens. Folia ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinuntur. Helenium stomacho vtile in passo conditum: siquidem salgamarij paululum siccata radicem, mox decoctam, & frigida aqua madafactam, in sapam coniungunt, & ad vsus recondunt. Trita potaq; ad cruentas excreationes efficax est. Alterum helenij genus in Aegypto gigni Crateus tradit: herba est cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repentibus, folijs lenticulae circa ramos sed longioribus crebrisque, radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, superne crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusq;. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacinum oleum. CAP. XXVII.

**O**leum, quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos vsus rectè valentibus accommodatissimum: omphacinum id appellatur. Prestat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho vtile est, quod adstringat: gingivas contrahit, dentes firmat, sic cõtineatur in ore, sudores cohibet, & quod vetustius ac pinguius, eò ad medicamenta aptius est. Et (vt reliqua in commune dicantur) omne oleum calfacit, emollit ven-



trem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsū mque promptius ad obeūda munera reddit, aluū emollit, vlcera venenorū vires permistum hebetat, cōtra venena datur, assiduè potum redditūmq; vomitionibus: soluit aluum hemina mensura cum pari ptisanae succo aut aqua potum, ad tormina calidū simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur, ventris animalia pellit, idem maximè ilei intestini morbo laborātibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorum claritatis sublitum cōfert. Si vetustū non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, vt vetustatem representet.

Oleum sylvestris oliuæ.

CAP. XXVIII.

**O**leum, quod sylvestres oliuæ fundūt, vehementer adstringit, & ad sanorū vsus secundum sibi locū vendicat. In doloribus capitis vtiliter pro rosaceo substituitur: sudores arcet, defluētes capillos inhibet, fursures, vlcera capitis manantia, scabiem, leprāsq; abstergit: tardius cautionem sentiūt, quicquid quotidie perungūtur. Candidum oleū fit hoc modo: Album colore, nec anniculo vetustius, in nouū fictile oris patuli funditur, centum heminarū mensura, & sub solem media quaq; die concha refunditur: ex altōq; demittitur, vt assidua deuolutione, iētūq; agitatā respumet: octaua die finum græcū mundū quinquaginta denariorū pōdere, calida aqua madefactum.



factū donec emollescat, in supradictū oleū deijci-  
tur, ita ne extillet aqua: postea tede præpinguis  
piceæ, assulatim case equale pōdus adycitur, &  
transactis octo diebus, oleum cōcha mouetur. Vbi  
candorem contraxerit, in vas nouū vetere vino  
affusum recondi debet, substratis sertule cāpa-  
ne corollis drachmas undecim pendentibus, cum  
pari iridis pōdere. sin minus, rursus Soli mādan-  
dum, & idē munus obeūdū, vsq; dum inalbescat.

Sicyonium.

CAP. XXIX.

**S**icyoniū componendi ratio hæc est: In lebetem  
oris lati stanno inductum, funditur olei albī  
quod crude oliuæ reddid. rūt, cōgius vnus, aque  
semicōgius. leui id igne coquitur, leuiter mouen-  
do. at vlti bis efferbuit, & subtracto igne refri-  
xit, immatans oleum concha decapulatur, & ad-  
iecta noua aqua conferuescit, & reliquis, vt di-  
ximus, peractis reponitur. In Sicyonia maximè  
fieri consuevit, Sicyoniū inde accepto cognomine.  
Calfactoriam ad quendam vsque modum vim  
habet. Fibri ac nervorum vitijs prodest. fæminæ  
ad commendandum faciei nitorem eo vtuntur.

Strigmenta balneorum. CAP. XXX.

**S**trigmenta à balneis calfaciūt, molliunt, di-  
scutiunt: ad sedis rimas & condylomata illi-  
nuntur. Illa verò quæ ex palæstris puluerem sibi  
asciuerunt, in sordis speciē redacta, articulorum  
mōdos imposita adiunāt: ischiadicis in focus aut  
malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur.



Deraſæ gymnaſiorum parietibus ſimulacriſque ſordes, calfaciunt: tubercula, quæ ægrè ad cocti-  
onem perducuntur, diſſipant: de ſquammatis &  
ulceribus ſenum profunt.

Elæomeli.

CAP. XXXI.

**I**N Palmyris Syriæ, quod elæomeli vocant, ex  
quodam caudice manat, oleū melle craſſius,  
ſapore dolci. Bilem, cruditatēſq; detrahit, ſexta-  
rio cum vna aquæ hemina dato. Sed qui ſumpſe-  
re, torpeſcunt & viribus deſiciuntur: quod mi-  
nimè vereri oportet, verū crebro excitare, ne  
veterno preſſi ſomnos captent. Fit & oleū è pin-  
guitudine ſurculorum oleæ optimum vetus, craſ-  
ſum, pingue, non turbidum. Calfacit, priuatimq;  
caliginibus oculorū illinitur: lepras, nervorūq;  
dolores illitum emendat.

Cicinum oleum.

CAP. XXXII.

**C**Icinum oleū hoc modo temperatur: Matu-  
ri ricini, qua voles quantitate, torrido ſole  
flacceſcūt, & vuarū more inſtratitantiſſer in-  
ſolantur, dum veſtiēs cortex fractus decidat. Ca-  
ro colligitur, & cōiecta in pilam diligenter tun-  
ditur. poſtea in lebetē ſtanno illito, qui aquā ha-  
beat, demittitur, ſubiectoq; igni ferueſcūt: & ubi  
inſitum prorsus humorē reddiderunt, ſublato ab  
igni vaſe, innatans oleum concha tollitur, & re-  
conditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit  
uſus, longè ſecus fieri ſolet. Nam repurgatos ri-  
cinos mole mandant, & accuratè molitos per  
ſport



sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt ricini, cum continentibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & vlcera capitis manantia valet: prodest sedis inflammationibus, vuluís conuersis atque præclusis: itē indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum, potu aquam aluo extrahit, ventris animalia pellit.

## Amygdalinum. CAP. XXXIII.

**A**mygdalinū oleum, quod aliqui metopium vocāt, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aque, quæ ferbaerit, sextarius adiicitur, et vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quàm antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis hesit, concha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aque inspergitur, & postquā ebilerint, idem opus proseguendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra vuluarū dolores, strangulatus, cōuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: vitij renum, calculosis, difficili vrinae, suspiciosi, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitúsq; discutit: maculas & vitia cutis tollit è facie, & eam erugat cum melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceo cerato, & oculorum hebetudines emendat, vlcera capitis manantia & furfures cum vino abstergit.



## Balanium. CAP. XXXIIII.

**S**imili modo fit balanium oleū, quod repur-  
gat maculas, lentigines, varos, et cicatrices  
nigras. Aluū soluit, stomacho aduersatur, cōtra  
auriū dolorē, sonos, et tinnitus auxilio est, cum  
anserino adipe instillatū. Similis sesamini ratio.  
Fit etiā è nuce iuglande oleum, quod caryinum  
vocant. Eandem vim habet quam balanium.

## Hyoscyaminum. CAP. XXXV.

**H**yscyaminum sic fit: Semen candidū, re-  
cens ac siccum tunditur, & calida asper-  
gitur aqua, vt in amygdalino diximus. dūmq;  
insolatur, siccate, quæ sub manu sunt, partes cō-  
reliqua massa permisceatur: hoc ī ante fieri oport-  
et dum nigrescat et grauitur oleat: mox pres-  
sum atq; excolatum reconditur. Ad aurium do-  
lores efficax est. pessis miscetur, ad emolliendum  
utile. Fit et è grano gnidio purgato et tuso. Vis  
ei aluum soluere potu. Non secus cnicinū oleum  
temperatur: cui facultas eadem est, quæ factō  
è gnidio grano, verū inualidior. Rhaphaninū  
è rhaphani semine fieri solet, ceterorum more.  
Phthiriasis mala valetudine cōtractas tollit, sca-  
britis cutis in facie emendat. Ad obsonia vtun-  
tur Aegyptij. Melanthinum idem quod rhapha-  
ninum potest. Tritum sinapis semen, & calida  
aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimi-  
tur. Id ad diuturnos dolores efficax est, trāsferre  
humores, qui in aliqua parte concreuerunt.

Myre



## Myrteum. CAP. XXXVI.

**M**yrtei faciundi ratio hæc est: E myrto nigra syluestri, aut sativa. foliorū molliſſima quæque tuſa premuntur: ſucco pares omphacini olei portiones adijciuntur, ſubiectiſq; carbonibus inferneſcūt, donec cōcoquantur, innatans oleum deraditur. Sed longè facilior hæc cōpoſitio: Tenera folia contuſa coquuntur in oleo et aqua, et quod innatat eximitur. Privatim alij deiecta in oleum folia in ſole macerant: alij prius oleum inſpiſſant malicorio, cupreſſo, cypiro et iunco odorato. Efficacius eſt amarū guſtu et oleoſum, viride, tranſlucens, et olens myrtū. Adſtringit et indurat, ideò medicamentis miſcetur, quæ cicatricem obducunt: prodeſt vlceribus in capite manantibus, ambuſtis igni, et papularum eruptionibus. Facit ad attrita et furfures, ſedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis ſudores compeſcit, et omnia quæ adſtrictionem inſpiſſationemque deſiderant.

## Laurinum. CAP. XXXVII.

**L**aurnum fit hoc modo: Lauri bacca cūm mature ſunt, in aqua coquuntur: ſiquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinē reddunt, quæ manibus ſubaſta concha excipitur. Alij omphaciniū prius oleū cypiro, iūco odorato, et calamo inſpiſſant, deinde tenera lauri folia concoquunt. alij etiā baccas, donec oleum odorem contraxerit, alij ſtyracem et myrtum addunt.



Optima laurus ad id latifolia & montana. Oleū laurinum vtilius quò recentius, quòq; viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei ex calfactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus nervorum vitijs, algoribus, distillationibus, aurium doloribus, malis rennum frigore contractis, illitum non aliud iuvantius: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. CAP. XXXVIII.

**S**imilis lentiscini ratio. Nā ē maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, ut in laurino diximus. Hoc scabiē iumentorū canūmq; sanat: vtilissimū pēsis, acopis, & leprarum medicamētis sudores cōhibet. Nec secus terebinthinum fieri solet, quod refrigerat & adstringit.

Mastichinum. CAP. XXXIX.

**M**astichinum ē trita sit mastiche, quod contra omnia vulnē mala efficax est: mediocriter calfacit, adstringit, & emollit. Adversus prominentes stomachi durities, cœliacorum, dysentericorūmq; cruciatus vtile: faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

Vnguentorum compositio. CAP. XL.

**D**E ratione vnguentorum consequēter tractandum existimavimus, quandoquidē ea in nonnullis corporū vitijs, aut medicamētis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimū profunt: in quorū probationibus consule-

te nares



re nares oportet, an ea oleāt, ex quibus tēperantur. Optimū huiuscemodi iudicium, quod in quibusdam planè obseruari nō potest, propter ea quæ admiscētur odore cæteris præualētia: vt in amaracino & crocino, telino, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri cōueniet.

Rosaceum.

CAP. XLI.

**R**osaceum sic fit: Iunci odorati quinque libras & bessē tundito, & subactas aqua in viginti olei libris & quincūce subinde mouendo, coquito: dūmq; percolaueris, in olei libras viginti & quincuncem, adijcito rosas nō madefactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto, interdū premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi recrementū pessumierit, mutato vase, in craterem melle illitum recondito. Cæterū rosas, quæ antea pressæ fuerūt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias vsque, quartasve perfusiones infundens exprimere voles, secundarium fiet, tertiarium, & quartariū vnguentū. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debent. Si verò secundam infusionem instituire libet, in expressum oleū, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas inijcito: manibus melle premadefactis, agitans premito: & iterum, tertio aut quarto simili modo exprimens facito, totiesq; recenteis rosas detra-



Etis vnguibus immittito: fiet enim ita oleū multo validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prælum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, vnguentum corrumpet. Alij autem detractis vnguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo: Rosæ quæ scilicet pondere equant, in sextario olei diebus octo madescunt, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamentum faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, et salem, quò minus oleat. Vim adstringendi et refrigerandi obtinet, fomitis et cataplasmatibus utile. Potum soluit aluum, stomachi ardorem restringit, ulcera caua replet et mulcet, quæ cacoëthe vocantur: ulceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitum efficax est, ad lacescitia interanea et concitatas vulvas utilissimè subiicitur.

Elatinum.

CAP. XLIII.

**F**Racta elate tusa & scarificata, in labellum deijcitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent utriusque portiones, dein mundo vase ad usus reconditur. Viribus rosaceo proportionem respondet: aluum tamen non mollit.

Mellin



## Melinum. CAP. XLIII.

**M**elinum hoc modo tēperatur: Olei cōgius decē aquae sextarijs admiscetur. Adijci-  
tur elata palmarum fractae quadrans, & iunci  
odorati vncia: quae die vno macerata coquun-  
tur, mox in vas oris patuli oleū excolatur, et in-  
dita arundinacea crate, aut vetusta tegete, co-  
tonea mala superponuntur, et vestimentis oper-  
ta tantisper inibi resident, dum malorum vires  
ad se oleum alliciat. Alioqui cotonea, decē dierū  
spatio operimentis inuoluūt: vt contineatur odo-  
ris suauitas, nec evanescat: postea biduo macera-  
ta oleo exprimuntur, oleūque reconditur. Id  
vim refrigeratorem & adstringentem habet.  
Contra scabiosa vlcera, et quae serpunt, ac furfu-  
res, perniunculósque effectum praebet: exulceratis  
vuluis infunditur, citatam vrinam sistit infu-  
sum, sudores cohibet, contra cantharidas, bupre-  
stim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maxi-  
mè quòd cotonea mālā olet.

## Oenanthini compositio. CAP. XLV.

**O**enanthē è labrusca, optimè olens post-  
quam emarcuit, deiecta in omphacinum  
oleum mouetur, voluiturque: & cū biduo man-  
serit, exprimitur, & recoditur. Adstringit pro-  
ximum rosaceo effectum praebens: sed alium nō  
resoluit, aut mollit. Probatissimū est, quod odore  
œnanthen refert.

Telin.



Telini componendi ratio. CAP. XLVI.

**F**oeni græci libræ quinque, calami libra una, cypiri libræ duæ, olei libris nouem, septenis diebus maceratur, quotidie ter mouentur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum substituunt, & cypiri loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato fenum græcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit, omnibus vuluarum duritijs magnopere conuenit, feminis difficile parientibus subiicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt, sedis inflammationes lenit, tenasmo subditum prodest, ulcera capitis manantia furfurisq; expurgat, ambustis, & pernionibus addita cera proficit, vitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod non vehementer fœni græci odorem præ se ferat, et manus abstergat sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

Sampsuchini compositio. CAP. XLVII.

**S**Erpilli, cassiæ, abrotoni, florum sisymbrii, frondium myrti, sampsuchi singule portiones, quadam pro viribus ipsorum coniectatione, una tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium vires non euincat: hæc post quatrimum exprimuntur. Denuò noua alia, simili mensura, et equali tempore macerata premuntur: ita enim validius reddi solet. Eligi oportet



ret sampsuchum colore ex atro viridi, plurimum redolens mediocriter acre, Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus vuluæ præclusiones conuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, vuluæ strangulatus recreat, lumborum inguinumq; dolores lenit: sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem vehementi adstrictione locos indurat. Lassitudines illitum discutit, in opisthotonicorum, vulsorumq; cataplasmata utilissimè additur.

## Ocimini compositio. CAP. XLVIII.

**O**cimum oleum fit ut cyprinum: Ocimi folia decerpta librarum undecim, & besis pondus, die nocturnumq; viginti olei libris macerato, premito, colato: cumq; exhauseris quallum, rursus partem olei modum fundito, exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum equali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spatio maduerit, exprimitur, & oleum recoditur: quod si in animo fuerit ter, aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

## Abrotonini compositio. CAP. XLIX.

**O**lei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorum abrotoni libras octo die nocturnumq; madefactas premito. Quod si in longum



gum tempus oleum velis asseruari, eiectionis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vuluæ duritiis præclusionesq; efficax est, menstrua & secundas pellit.

Anethini compositio. CAP. L.

**O**lei libris octo & dodrante, florum anethi libris vndecim & bessem, maceratas in oleo die vna, manibus premito & recondito. Quod si iterum perfundere velis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vulvarum duritiis emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntes auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articularum doloribus.

Susinum. CAP. LI.

**S**usinum, quod alij lilinum appellat, sic temperatur: Olei libræ nouæ cum quincunce, calami libræ quinque & quadrās, myrrhæ vnciæ quinque, permixto odorisfero vino decoquuntur, & colato oleo, cardamomi tusi & celesti aqua madefacti libræ tres & semis macerantur, premunturq; tres libræ cum semisse spissati olei assuuntur: mille lilia decerptis folijs, in latū, nō tamen profundū, labellū demittuntur: iniectū oleū, manibus melle perunctis agitur: die noctūq; cōquiescunt, & in pyxidē matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet: (non enim, vt rosaceum, moram tolerat: nam concal factum.

feruet



seruet & cōputrescit: quare sepius decapulādū) vasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes vasis faucibus hēsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quasillo in label- lum trāsfusis, rursum olei prius odoribus imbue- di, quod primū pondus aequet, & cardamomi tusi drachmæ decem cōiūciuntur. Hæc manibus scitè pressa, interiecta breui mora exprimūtur: quod profluit, repurgatur. Tertiò eadem infundūtur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madefactis. Longè optimum erit, quod prius ex- primitur: secundum, quod sequitur: tertium lo- cum sibi vendicat, quod nouissimum prodit: De- nuò in mille lilia emulsis folijs expressum prin- do oleū infunditur: tum eadem ratione prosequen- dum, idēq; faciendū, vt prius, addito cardamo- mo, dein expresso: & quò frequentius recentia li- lia maceraueris, cō validius vnguentum efficies. Deniq; cum factum abundè videlitur, singulis compositionibus miscere conuenit myrrhæ quàm optime duas & septuaginta drachmas, & croci decē, cardamomi quinque & septuaginta: croci verò & cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribrata in lutram cum aqua demittuntur, expressūq; primò vnguentum infunditur: & paulò post excipiūtur vasculis siccis, myrrha aut gūmi antea perfusis, & croco, melle et aqua ma- defactis. Eadem sūt in altera aut tertia expres- sione. Aliqui simplex ex balanino, aliòve oleo, & lilijis



& lilij componunt. Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum primis laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emollit vulvæ præclusiones, & collectiones aperit, vtilissimum ad muliebria mala: vlcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, furfurēque emendat: vibices cicatricēque celerrimè ad colorem reducit, ita ut sepe fallant. In summa extenuat, potum bilem per aluum extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum.

CAP. LII.

**N**arcissini elci spissamenta ita fiunt: Sex libbre aspalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libbre septuaginta cum vncijs quinque assumuntur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinque libris, & besse adijcitur, cum myrrha gleba cōtūdatur, cribratāque ac vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac autē cum ijs efferbuerit, eximitur: refrigeratū oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quā plurimi coniunguntur, qui bidui spatio (ut in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum, siquidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vulvæ duritias præclusionēque: sed capitis dolores facit.

Crocinum.

CAP. LIII.

**C**um crocinum componere voles, prius elci, ut in susino diximus, spissamenta facies, eisd.



eisdem ponderibus, & mensuris: cuius olei libras  
treis & semissem, croci vnciam vnā assumes,  
identidem quotidie moueto, & sexta die, quā  
hoc assiduò peregeris, oleum à croco colis incerni-  
to, eidem croco parem olei modum adijcito, moue  
triduo, dein contusa myrrhæ atque cribrata dra-  
chmas quadraginta permisceto, & in pila agita-  
tum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cypri-  
num imbuto in crocini cōpositione vtuntur. Opti-  
mum est, quod abundè crocum spirat, in medendi  
vfu expetitur. Proximū, quod myrrham refert.  
Calfacit, somnū allicit, quare persepe phreniti-  
cis subuenit, perfusum, aut naribus admotū, aut  
illitū: pus mouet, vlcera purgat, contra vuluæ du-  
ritias atq; præclusiones, & vlcera, quæ cacoëthe  
vocantur, prodest cum croco, cera, medulla, dupli-  
cato olei pondere. Concoquit enim, emolit, hume-  
stat, & permulcet: ad oculorum glaucitates ex  
aqua illinitur. Huic autem proportionē respon-  
dent butyrinum, onychinum & styracinum: quæ  
& sinominibus distant, viribus & compositione  
cognata sunt.

## Cyprini spissamentum. CAP. LIIII.

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ cœlestis  
tantundem cum semisse, cuius vna parte  
oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis  
admiscetur: dein assumptis assalathi libris quin-  
que, & semisse, calami libris sex, & semisse, myr-  
rhæ libra vna, cardamomi libris tribus, & do-

d



drante, olei libris nouem, & vncijs quinq;. Aspalathus tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo donec cōferuescat. myrrha autē vino vetere odorifero subacta, contususq; simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exēpto aspalatho immittuntur & vbi effertuerint, sublato ahenō, oleū percolatur. Cardamomū tusum reliqua aqua aspersum infunditur. spatula agitur, nulla, dū refrigerit, interpellatione. Post hæc colato oleo, in viginti octo libras olei floris ligustri, quod cyprum vocant. sex et quadraginta libræ cū lesse instillatur, quæ sufficiēter madesactæ per sportulā exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectū simili modo prematur: et iterum aut tertio si quis velit, madesacere poterit, et ita reldetur efficacius. Eligi oportet bonū, quod cū odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomū addūt. Calfacit, emollit, orō venarū adaperit, vuluæ neruorūq; vitij cōuenit, plenriticis, fractisq; per se vel cerato immistum: malagmatis impenislet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur. item in acopa adijcitur.

Irii spissamentum. CAP. LV.

**S**pathe quā minutissimē contuse sex libras cum lesse, in drachis et septuaginta libris æquinoctiæ olei, æreo vase, additis decem aquæ hæminis incoquito, quoad odorem acceperit postea in cupulam melle oblitam colato: ex eo aromati-



bus imbuto oleo, irinum primò temperatur, iride  
ex oleo inspissato macerata, vt scripsimus. Sed a-  
lia est cõponendi ratio: In olei septuaginta libris  
& quincẽce, xylobalsami (vt dictũ est) cõtusi, li-  
bras quinque & sextãtem excoquito, postea de-  
tracto xylobalsamo nouem libras & dextantem  
adycito, & myrrhæ glebam vetere vino odorato  
perfusam, & in olei ita odoribus imbuti quatu-  
ordecim libris, totidem tuse iridis, binis diebus ac  
noctibus madefacito, strenuè & vehementer di-  
stringito. Quòd, si vis validius fieri, par pondus  
iterum ab tertio similiter maceratũ exprimito.  
Longè optimum est, quod solã irin olet, quale est  
in Perga Pãphyle, & Lide Achaiæ natũ. Vim  
habet calfactoriam atque emollientem, crustas  
adimit, sordida vlcera & putrida purgat: con-  
fert feminis vulue causarũ: itẽ inflãmationibus  
eiusdem atque præclusionibus, partus eijcit, hæ-  
morrhoidas recludit, contra auriũ sonitus ex ace-  
to, ruta & amaris nucibus, prodest: diuturnis  
destillationibus, naribus illitum, & contra gra-  
ueolentia earum vlcera, quas oxenas vocant, au-  
xiliatur: aluũ purgat cyathus epotus, facit ad ilei  
cruciatus, vrinam mouet, difficileis vomitiones  
adiuuat, perũctis eo digitis & immisis, vel ijs  
que ad vomitũ ciendũ indũtur, angine etiã illini-  
tur, aut ex aqua mulsa gargarizatur. itẽ contra  
arterie scabritiam datur etiam ijs, qui cicut. im-  
coriandrum, aut venena fungorum hauserunt.



## Gleucinum. CAP. LVI.

**G**leucinum absolutè constat omphacino oleo iunco odorato, calamo, celtica nardo, spatha, aspalatho, fertula campana, costo, & musto: circumdatis interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & nervorum vulnibus; vitis auxiliatur, omni acopo iuvantius, quippe quod emolliat.

## Amaracinum. CAP. LVII

**A**maracinum longè optimum in Cyxico fieri solet ex omphacino & balanino: spissamentis è xylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis, conditisque amaraci, costi, amomi, nardi, cassie, carpo balsami & myrrhe odoribus. Aliqui, quod pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & vinum assumuntur: hoc in vasorum illitione, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit, putrilaginitibus ac fistulis per quam utile: necnon humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra ulcera, que theriomata vocant, rumpit: difficili urinae, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hemorrhoidas illitu soluit, vulnus subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vulnus tumores discutit, vulneratis nervis, & musculis



sculis confert, laneo centunculo modicè madefactum & impositum.

## Megalinum, CAP. LVIII.

**F**Actitabatur olim megalinum sed nūc compositio exoleuit, & prorsus oblitterata est. Cuius ad hystorie complementū meminisse non fuit alienum. Mīstura cum amaracino eadem erat, sed resina exuperabat, hac tantū ratione differens. Quare leniter emollit. Resina vnguetis, neque tutelae neq; voluptatis gratia adūcitur, sed coloris crassamenti q; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendae ratio declarabitur, dum de resina differemus.

## Hedychroum. CAP. LIX.

**Q**uod hedycroon vocant, in Co fieri solet: eisdem prae dictum viribus & mīsturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

## Metopium. CAP. LX.

**F**It in Aegypto vnguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbani mīstionem: nam lignum, in quo galbanū enascitur, metopion vocant. Constat amaris nucibus, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino, myrrha, balsamiscimine, galbano & resina. Probat pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrham, quā galbanū respiciat. Calfacit vehementer, & adurit, atq; extrahit, ora venarum aperit, vlcera purgat, extrahitq; : ad praecisos nervos, & musculos, ad



hernias humore cōtractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis et malagmatis inseritur, horroribus, convulsisq; præsertim quibus cervix in scapulas deiecta, et retrorsum cōtracta est, vtile habetur: sudores ciet, vulvæ spiracula recludit, et eiusdem durities laxat: in summa, molliendi naturam habet.

Mendesium. CAP. LXI.

**M**endesium constat balanino oleo, myrrha, cassia, et resina. Aliquitamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta nō fuisse, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multò.

Stactæ. CAP. LXII.

**S**tactæ vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tusæ, et organo expressæ. Ea perquam odorata, ac pretiosa est: atq; vnguentum per se facit, quod stactæ nominatur. Maxime probatur, quæ nullam olei mixtionem admittit, cuius minima portio compos est virium plurimarum. Vim calfactoriam myrrhæ & calidis vnguentis respondentem habet.

Cinnamominum. CAP. LXIII.

**C**innamominum confit è balanino oleo, et xylobalсами, calami, iunci odorati spissamentis, atq; cinnamomi, et seminis balsamini suavitate conditur, quadruplâq; myrrhæ ad cinnamominum portione, mel ad cogenda omnia adiicitur.

Laud



Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratū, gustu perquàm amaro. Id nō à resina, sed myrrha crassitudinem obtinuit: resina enim neq; amaritudinē præbet, neq; ullam odoris gratiam adyicit. Vim habet admodum acrem, amaram, & calfaciētem. Itaq; ora venarū aperit, calfacit, discutit, diffundit, humores & spiritus attrahit, caput aggrauat, contrā vulue vitia cū duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimoniæ exolefcit, & quedā emolliēdi vis contrahitur. alioqui adurit, & præ omnibus crassis vnguentis induratur. Facit mirū in modum ad fistulas & vlcera, quæ putredinis vitium senserunt: itē ad hernias humidiores, carbunculos, febriū horrores, tremores, gangrenasq; cū cardamomo: aduersus serpentū morsus illinitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

## Nardinum. CAP. LXIIII.

**R**atio nardini faciendi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerūq; autē balanino oleo, aut omphacino, iuncus odoratus spissamēti gratia adyicitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, nō acre, nardi aride aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris, expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat.



Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo & nardo.

Malabathrinum. CAP. LXV.

**M**alabathrinum spissamenta nardini habet, insuper myrrhæ plusculum additur: qua de causa calfacit, crocino aut amaracino viribus respondens.

Iasminum. CAP. LXVI.

**A**puđ Persas fit, quod iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ: quorū sextans in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, violis, ut in lilino diximus, vicissim permutatis. Apud Persas inter epulandū usurpatur odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cū in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemq; desiderant: grauius enim spirat, quā ut libenter à plerisque recipiatur.

Myrrha. CAP. LXVII.

**M**Yrrha lacryma est arboris, quæ in Arabia gignitur. Aegyptiæ spinæ non dissimilis: è cuius vulnere defluit lacryma in subiectas tegetes, alia circum caudicem concrescit. Dicitur ex his aliqua pediasimos præpinguis, qua expressa, stacte emittitur. Alia gabirea pinguisima, leto & pingui solo nascens, ea copiosam sudat stacten. Omnium prima est, quæ Troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit: splendens, subuiridis, ac mordens.



dens. Quinctiā legitur tenuis quedā, quæ à Troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, verūm odore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & retorrída. Omniū deterrima, quæ ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex ijs pastilli fiūt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è siccioribus haudquaquam pingues, & inodorati: minus odore pollet, quæ oleum non admittit, cū in pastillos digerebatur. adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, vndique concolor, quæ confecta venas vnguium modo candidas et leues ostēdat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens. superuacua & inutilis est ponderosa, coloris picei. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccatur, adstringit, vulnam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit, cum absynthio, lupinorum cremore, vel succo rute admota: tuberculo fabæ deuoratur in vetere tussi, orthopnoea, in laterū pectorisq; doloribus, in alui profluvio, & dysenteria: horrores discutit, dualius horis ante febrim accēssiones, fabæ magnitudine pota cū pipere et aqua: subdita linguae liquatāq; scabritiē arteriæ expolit: obtusam vocem expedit, ventris tineas enecat, contra grauem oris halitum man



ditur, & aduersus alarum tedia cū liquido alumine illinitur: gingiua & dentes stabilit, colluto cū vino & oleo ore: vulnera capitis illitu glutinat, medetur fractis auribus ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleae carnibus. Item purulentis auri- bus inflammatisq; cum meconio, castorio, & glaucio. ad varos autē cū cassia & melle illinitur, impetigines ex aceto purgat, defluētes capillos cum ladano & vino myrteo illita, firmat: diuturnas destillationes lenit, illitis pinna naribus: oculorū vlcera complet, albugines tollit, caliginē discutit, scabritiem leuigat. Fit ē myrrha, pērinde atq; thure, fuligo, & vt postea ostēdemus, ad eadē conueniens. Bæotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bæotia nascentis. Melior est, quæ myrrhæ odoris suauitate representat. Vis ei calfactoria inest, emollit discutitq; suffimentis commodissimè inseritur.

STYRAX. CAP. LXVIII.

\* *λίπα*. *S*tyrax lacryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur\* sordescens, flauus, resinosus, albicantibus grumis, quàm plurimum in sua odoris gratia permanens: qui dum mollitur, mel leum liquorem reddit: qualis ē Cataballis, Pistidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, fursu- rosus, friabilis, canoq; situ obductus. Ceterū lacryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & myrrhæ emula: verūm perpauca manat. Adulteratur ligni scobe, quā vermiculi eroden-  
tes



tes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos exprimunt, venundantque. styracem hunc [quoniam in vermiculorum speciem contrahatur] scoleciten cognominant, tanquam syncerum imperiti approbāt, nō interpretantes ad præcipuam odoris fragrantiam: siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, rancedini, gravedini, et interceptæ voci: vuluæ preclusæ duritiæve laboranti conuenit, cit menses potu appositūq; aluum leuiter mollit, si exiguum cū resina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutiētibus malagmatis, acopisq; Adoletur autem et igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadē cōueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verū caput dolore afficit, adgrauatque, & soporem adfert.

Bdellium. CAP. LXIX.

**B**dellium alijs bolchon appellant, alijs madelcon: lacryma est \*saracenice arboris. Pro- \*Vox adulteri-  
batur gustu amarū, translucidum, taurini glutinis in morē intus pingue, liquefcēs facile, ligni na Mar  
ac sordis expers, suffitu odoratum, vngui simile. cello.

Est



Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum. vberioribus glebulis in offas cōvolutum, aspala-  
thi odore, ex India aduectum. Defertur etiā a  
Petra oppido siccum, resinosum, liuescens, sed fa-  
cultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita  
vitiatum nō p̄inde gustui amaritudinē repræ-  
sentat, nec vsque adeo suffitionibus odoratum.  
Calfacit & emollit, duritias, & turgētia guttu-  
ra, humidasq; herniis discutit, cū ieiuna salina  
dilutum. vulue spiracula laxat appositū & suf-  
fitis, & partus humiditatesq; omneis extrahit,  
calculos potu comminuit, vrinam mouet, tussien-  
tibus & à serpēte percussis, vtilissimē datur: va-  
let ad rupta, vulsa, laterū dolores, & discursan-  
tes spiritus: malagmatis inseritur, quæ cōtra du-  
ritias & neruorum nodos prosunt: contusum re-  
id est, soluitur affuso vino, aut aqua calida.

subru-

Thus.

CAP. LXX.

sum est. **T**hus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera  
\* ο Αραβία cognominatur. Primatum tenet in eo gene-  
Plex nō o re masculum, stagonias appellatum, suapte na-  
ip Σπι- tura rotundum: tale autem indiuiduum est, cādī  
e αω. id dum, cū frangitur, intus pingue, in suffitu sta-  
g est, Ara tim ardens. Indicū verò \* fuluescit, & colore li-  
bias di- uet, sed rotundū industria factitant: nā in qua-  
etum, et drāgulares formas dissectum fctilibus versant,  
quod in donec rotunditatem cōtrahat: verūm huiusmodi  
Smilo p thus tempore flauescit, quod atomum aut syagriū  
uenit. appellant. Secundum locum habet\* Arabicum,  
& in



in Smilo nascēs, quod aliqui copiscum vocāt,  
 minus multo & fuluius. Est & genus aliud, cui  
 momita cognomen est, alioqui candidum: quod  
 um mollitur, mastiches more digitis cedit. Adul  
 eratur \* in itinere, pini resina & gummi, quod \* mudo -  
 acilē deprehendi potest: siquidem suffitum gum- d'vōur-  
 ni flammam non ei aculatur, & resina in fu- vō, id  
 num euanescit, thus verò statim ardet, idem ma est, artifi  
 eficiū odor prodit. Ad calfaciendū & adstrin- ciosē cō-  
 gendum pollet, oculorum caliginem discutit, caua formatiō  
 vlcera complet, & ad cicatricem perducit, cruen Sic  
 ta vulnera glutinat, infrenatque cūctas sangui- Marc.  
 nis eruptiones, etiam si cerebri mēbranis effluat.  
 vlcera, quæ cacoēthe vocantur, & sedis & reli-  
 quarum partium permulcet tritum cū eo & la-  
 cte linamentum, formicantes verrucas inter ini-  
 tia, impetiginēsque, ex aceto & pice illitū, tollit.  
 ambusta igni, pernionēsque cum suillo adipe, aut  
 anserino, & vlcera in capite manantia cū nitro  
 si infricetur, sanat: paronychys cū melle, auribus  
 fractis cum pisce, medetur: ad reliquos aurium do-  
 lores cum dulci vino infunditur, inflāmata à par-  
 tu māmæ cum cimolia & rosaceo magna vtilita-  
 te perungūtur, additur ad arteriæ viscerūque  
 medicamenta, prodest sanguinis excreationi po-  
 tū: sed in secunda valetudine haustū insaniam  
 mouet, & largius cum vino potum interficit. In  
 fictili mūdo thus crematur, flagrante glebula suc-  
 censum à lucerna, donec exuratur post perfectā  
 vstionē



ustionem operire oportet, usque dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aeneo vase cavo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo uacibus prunis torretur, dum non amplius lullet, aut pinguitudinem vaporumve emittat. facile enim comminuitur: quod perustum non est.

Thuris cortex. CAP. LXXI.

**P**refertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lauis, minimè scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris verò cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporè ei aculeatur. Thuris modo uritur, & vis eadè quæ thuri, sed validior adstringentiòrque. Quare potu cruentis excreationibus, vuluis fluxione laborantibus in pecto confert. ad cicatrices oculorum, & cana sordèsque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Manna thuris. CAP. LXXII.

**M**anna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandè quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui crassa brata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant: sed hæc igneprehenduntur.



tur. Neque enim æquè suffitu aërium vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permixtum suaueolentie halitus virus habet.

Thuris fuligo. CAP. LXXII.

**F**uliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas, in nouam fictilem ollam cōcavā imponito: & areo vase in medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito: alteram ad moueto, ex altera eius parte aut vtraq; subiectis quaternūm digitorū altitudine lapillis, quò facilius persfici queat, si vratur: & quā locus capax fuerit, glebularum alias supponito, & antea quā prorsus prior gleba restinguatur, aliam imponito, donec sufficientem fuliginem videaris cōgisse. Continuò tamē externe eramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim temperato aris feruore, fuligo omnis inherebit: quæ alioqui per leuitatē decidua, thuris cineribus admiscetur. Deterasa itaq; fuligine, cinis cremati thuris seorsum subtrahendus est. Idem opus, quæ ad satisfactum tibi videbitur, obeundū. Oculorum inflāmationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, cana explet, carcinomata sistit. Simili modo è myrra, resina, styrace, reliquisq; lacrymis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

Picea & Pinus. CAP. LXXIII.

**P**inus & Picea generi eide adscribuntur, sed quandam flagitat specierum distinctionem,  
arbor



arbores vulgò cognite: quarum cortex adstrin-  
git, prodest tritus & illitus intertrigini, vlceri-  
bus summum corpus occupantibus, ambustisque,  
cum spuma argenti & manna. Vlcera delicatu-  
lorum acrimoniam recusantium, cerato myrtino  
exceptus, ad circatricem perducit: tritus cum su-  
torio atramento serpentia cohibet, suffitu partus  
& secundas eicit, potus aluum sistit, vrinam  
mouet. Folia eorum trita & illita inflammatio-  
nes leniunt, vulnera ab inflāmatione vindicāt,  
trita autē & decocta in aceto, feruētī collutione,  
dentium dolores mulcent: hepaticis vtilia sunt,  
drachmæ pondere in aqua aut mulsā pota. Pineæ  
nucis cortex & folia potu idem præstāt. Teda ea-  
rum particulatim secta si in aceto coquatur, &  
decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiā  
fit spatha acoporum pessorumque cōpositionibus  
idonea. Quinetiā earum crematarum fuligo ad  
librarij atramenti confectiōem excipitur: ea cir-  
cunlitionibus efficacissimè imponitur, quibus  
palpebras ornant, colorēque mentiuntur, calli-  
brep̄hara Greci vocāt: arrosio oculorum angulis,  
callofis glabrisque genis, & collacrymationibus  
opitulatur. Pityides appellantur pinorū piceæq;  
fructus, qui in conis inueniuntur. Vim adstricto-  
riam habent, & aliquātum excalfaciētem: tussī  
& pectoris vitijs auxiliatur, per se, aut ex melle  
sumpti. Nuces pineæ cum strobili repurgatæ  
manduntur, aut cum passo aut cucumeris semine  
bib

Pityides



bibuntur, urinā cient: acrimonias in renibus & vesica helant, stomachi rosiones leniunt: data cum portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pinæ nuces integræ recenter arboribus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ vetustæ tussi ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Lentiscus.

CAP. LXXV.

**L**entiscus nota arbor est, cui toti vis inest adstringēdi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognate insunt vires. Liguamentum autē ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquuntur, et ubi abunde cocta refrigeratāq; sunt, folia abijciuntur. aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinē. Lentiscus sua adstringēdi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item cōtra eruptionē sanguinis ē vulua, & eiusdē aue sedis procidentia. In totū acaciæ & hypocistidis vicem representat. Idem facit succus ē tritis folijs. Decoctum fotu cava explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, urinam pellit, motus dentium collutione stabilit. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit ē semine oleū, \* quod prodest, cum quid adstringi opus est. Lentiscus Mastix resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, officii- & ab aliquibus, \* mastiche. Pota utilis est nis.

\* ΣΥΡΤΙ-

ΝΟΡ.

Μαστι-

οφί-

nis.

ε



sanguinem reiicientibus, & tussi veteri stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur indentificia & illitiones faciei, ad nitore cuti conciliandum. Palpebras oculis incommodas repliat, manducata halitum oris commendat, gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Praefertur [nitedule modo] reab inter splendescens, & candore Tyrrhenicae cerae similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resineq; pineae nucis mistura.

Terebinthus. CAP. LXXVI.

**T**erebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex adstringunt, & ad eadem ad quae lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, vrinam mouet, venerem excitat, contra phalangiorum morsus conuenienter in vino libitur. Resina eius ex Arabia Petraea defertur. Prouenit etiam in Iudea, Syria, Cypro, Aphrica & Cycladibus insulis: sed praeualet candida, perlucida, vitreo colore, & in ceruleum vergente, odorata, terebinthum olens.

\* Offi- \* Terebinthina resinas omneis antecedit: proxima lentiscina, & è pinu, & abiete: has sequitur è picea & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi ac tibi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle, vitia pectoris expurgant, vrinam



inam cient, cruda concoquunt, ventrē emol-  
nt, palpebris commodissimē replicant, lepras  
lunt, cum erugine ac sutorio atramento, ni-  
sque: auribus saniem emanantibus cum melle  
oleo, item in pruritu genitalium vtiles: ma-  
gmatis, acopisque admiscuntur. Laterum do-  
ribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ. CAP. LXXVII.

Iquida resina è pinu & picea, à Gallia &  
Hetruria conuehi solet, atque olim à Colo-  
bone petebatur: hinc Colophonie sibi cognomen  
m vendicauit. A Gallia quoque subalpina:  
uam vernaculo nomine laricem appellant inco-  
e. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest  
si veteri. Colore inter se distant: siquidem alia  
andida est, alia oleosa, alia mellei liquoris simi-  
tudine, vt larigna. Cupressus etiā liquidam fun-  
it resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ verò ari-  
larum generi ascribuntur, quædā ex pineis nu-  
ibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt.  
Eligi debet longè omnium odoratissima, translu-  
rens, non retorrida, neq; diluta, quandam cere  
faciem præbēs, & friabilis. E picea & abiete re-  
sinæ cæteras antecedunt: odorate enim sunt, atq;  
thus odore imitantur. Præstantiores à Pityusa  
insula deferuntur, quæ secundum Hispaniā sita  
est. Sed quæ è picea, nucibus pineis & cupresso  
manarūt, nil il ad illis, nec tātis viribus potiun-  
tur. Veruntamen eorundem gratia, quorum &



ille sumi solent. Lentiscina terebinthinae respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruple capacitatis ad humorem, qui infunditur: itaque resinae congius, in duobus aqua pluviae coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat. Ceterum ubi refrixit, in fictile non picatum, quod aconitum vocant, id est non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata precoletur, quod feculenta sordes excernatur. Vruntur quoque sine aqua, primum lento igne: & ubi coire ceperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquuntur, usque dum antedictas naturae suae notas exuerint: mox, ut dictum est, reponuntur. Aridas unius diei spatio decoxisse satis est. Vsta odoratis malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E resina perinde atque thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea: quibus palpebras fucat, & colorem metiuntur. Prodest glabris genis, collacrymationibus, erosisque oculorum angulis. ex ea fit atramentum scriptorium.

Pix liquida. CAP. LXXVIII.

**P**ix liquida, quam alij conum vocant, est pinguisimis pini piceaeque lignis congregatur. Optima est splendens, sincera, levis. Contra venena, phthisis, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores, qui difficile exsuscitantur.



ausiuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum & vuae inflammationes, anginaq; vtiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cū rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium morsibus adiecta verò paricera scabros vngues extricat, impetiginēsque emēdat: vulue dūritiā, ac sedis tubercula discutit: cū farinaq; hordeacea & pueri impubis vrina decocta, strumia rumpit: cohibet vlcera, quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut fursuribus illita. Caterū cum thuris manna & cerato profundos vlcerū sinus conglutinat, rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur: vlcera replet, & cum melle purgat: quin & cum vuae passa, & melle carbunculos, & putrida vlcera emarginat, disrumpitque: eroentibus medicamentis, quas septas vocant, probè immiscetur.

Picinum oleum.

CAP. LXXIX.

**E** Pice fit quod pissoleon appellāt, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serū lacti. Nam expansa, quādiu pix coquitur, supra cortinam vellera pura madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in vas.\* Quas pix liquida præbet vtilitates, alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitū, quibus & liquida pix medetur, iumentorum vlcera scabiēmq; emendat.

Hæc desunt,  
καὶ τοῦ  
το ἄρ  
γίνετα  
ἐφ' ὅσους  
ἄρ χρο-  
νους ἡ

Fuligo liquidæ picis.

CAP. LXXX.

**F** It hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua, quæ ellychnium habet, nonnihil picis

πῶς  
ἐκτῆς.



incendito, lucernamq; fictili vase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solet, operito, & adoleri finito: consumptoque liquore nouum infundito, quoad sufficentem vsui fuliginem collegeris. Vis ei adstringens, acrisque. Vsi est ad pigmenta, quibus palpebras linunt & venustant, & ad circumlitiones. Item ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososque oculos, insuper ad ecrundem vlcera non inutilis est.

Pix arida.

CAP. LXXXI.

**L**iquida pix decocta in sissam coit, quam vocant aliqui palimpissam: quo in genere quaedam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probat purpurea, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæque simul naturam habentes. Calsactoria vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula pannosque discutit, vlcera replet, vulnerariis medicaminibus commodè permiscetur.

Zopissa.

CAP. LXXXII.

**Z**opissam aliqui aiunt derasam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Bitumen.

CAP. LXXXIII.

**B**itumen Indicū ceteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpure modo splendeat, sitque ponder



ponderosum, ac validum odorem vibret. Nigrū autē & sordidum, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, et Sidone. Liquidum inuenitur in Acragātino Sicilie, fontibus innatans, quo vtūtur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur, qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. CAP. LXXXIII.

**N** Ascitur in Apolloniatarū agro circa Epidaurū, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs mōtib; deuoluta, impetu fluminis rapitur, estūq; in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Naphtha. CAP. LXXXV.

**N** Aphtham vocāt Babylonij, bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei igniū rapax, ita vt exspatio protinus in eā transiliant. Ad suffusiones oculorū, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur, vulnarum procidētia. strangulationesq; olfactu, suffitu, inpositu, emendat. comitiales morbos suffitum deprehendit, gagate lapidis more: purgationes mulierum cum vino, & castorio potū elicit, tussim veterem & anhelitum adiuuat. serpentium morbis, coxendicum laterūmq; doloribus auxiliatur, datur celiacis in catapotio deuorandū. cum aceto potum discutit sanguinem concretū, dysen-



tericis cum ptisana liquatum infunditur, destillationibus suffitione medetur, mitigat dentium dolores oblitum. ceterum pilos incommodos sic cum replicat, specillo impositum: cōcalfactum autem, & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, pedagris, articulorum doloribus, lethargicisque prodest. Pissa asphaltos eadem, quæ pix & bitumen, si misceantur, potest.

Cupressus.

CAP. LXXXVI.

**C**upressus refrigerat, & adstringit. Cuius folia ex passo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ rheumatismis, & urinae difficultati auxiliantur. Pilule autem ex vino tuse in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnoea, aut si reijciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur: earum decoctum easdè præbet effectus: tusa cū fico duritias emolliunt, nariumq; polypo medetur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros ungues eijciunt, hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilule cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita & imposita, vulnera cōglutinant: sanguinem supprimunt, capillum ex aceto tingunt, illinuntur per se, aut cū polenta ignibus sacris, vlceribus, quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus, admota cum cerato stomachum corroborant.

**I**uniperus. CAP. LXXXVII.

Iuniperi genera duo: altera maior, altera minor,



nor, vtraq; acris est. Excalfacit, & vrinam mouet, accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine, nonnunquã grã descere, alie\* nucem Ponticã æquare inueniuntur: rotunde, odoratæ, in mādēdo dulces, sub amara lanã intra, quæ arceuthides etiam id est, bacca iuniperi tellige. nominatur. Modicè calfaciunt, & adstringūt: stomacho vtilis: cōtra pectoris vitia, tuſsim, inflationes, tormina, & serpētium ictus efficacissimè bibuntur: vrinā cient, vnde ruptis, conuulsis, & vuluæ strāgulatui subueniunt. Folia acrimoniã habent: ideo tam ipsa, quàm eorum succus, ex vino contra viperarum morsus illini aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. Ramenta ligni deuorata interficiunt.

## Herba Sabina. CAP. LXXXVII.

**S**abina duorū generū est. Vna folijs cupresso similis, spinis horridior, grauiter olēs, acris & feruens: arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinē fundit: huius folijs nonnulli pro suffitu vtūtur. Altera tamarici folio similis est. Viriusq; folia nomas sistūt, collectiones illitus mitigāt, & cum melle nigritias sordēsque; repurgāt, carlunculos cū vino pota rūpunt, sanguinē per vrinā eliciunt, partus appesita extrahunt, et suffitu idem præstāt, vnguentis calfacientibus immiscentur, & priuatim gleucino.

**C**edrus. CAP. LXXXIX.

**C**edrus arbor magna est, ex qua picem colli-



gunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas  
parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas.

Cedria optima est crassa, perlucida, gravis odo-  
ris: quæ dum effunditur, guaiatim non dissipata  
Cedrus mortuo - coit. Cui ea vis inest ut defuncta corpora conser-  
rum vi- uet, & viuentia corrumpat: quæ ex causa mor-  
ta dicta. tuorum vitam aliqui appellauere. Vēstimenta  
quoque, & pelles eximia calfaciendi & siccandi  
dote, corrumpit: magni ad ocularia medicamen-  
ta vsus, quippe illita oculis claritatem affert, al-  
bugines cicatricēsque; detergit: instillata autē cū  
aceto vermes aurium necat, cum hyssopi decocto  
infusa sonitus sibilosque; sedat, canis dentiū indi-  
ta eos frangit, et dolores leuat. Idem facit cū ex  
aceto colluitur: peruncto ante coitum genitali  
abortiuum fieri constat: angine ea perunguntur,  
tonsillarum inflammationibus auxilio est, lentes  
pediculosque; illitu enecat, cerastæ morsibus cum  
sale imposita subuenit, contra hausta leperis ma-  
rini venena, in passo sumpta, auxiliatur: in ele-  
phantia, aut linctu, aut perunctione proficit: pul-  
monum vlcera purgat. et si cyathus eius sorbea-  
tur, persanat: vermes & tineas subter indita ne-  
cat, & partus extrahit. Fit & oleum, à cedria  
separatum, dum coquitur, velleribus supra hali-  
tum eius expansis, ut in pice. Eiusdē ad omnia  
vsus: priuatim vehementer perunctum scabiem  
quadrupedum, canum, boiūque; personat: inherē-  
tes ricinos enecat, vlcera quæ ex tonsura accepe-  
runt,



runt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habent. Stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, strangurie: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur. Serpentes fugantur, perunculo ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginem, quo modo ex pice, congeri oportet, quae eandem, quam picea fuligo vim praebet.

Laurus.

CAP. XC.

**L**Aurus quaedam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque ex calfactoriam naturam habet, & emollientem. Unde decoctum earum in mulieres in secessu additum, vulvae & vesicae vitium conuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoque ac trita vesparum apiumque ictibus opitulantur, eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant, sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouent. Lauri baccae magis, quam folia calfaciunt: ergo in eclegmate tritae cum melle vel passo prosunt tabi, orthopnoeae, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionum ictus ex vino bibuntur, vitilignes emaculant. Succus baccarum utilissime aurium dolori, & grauitati instillatur, cum vino vetere, & resaceo. In medicamenta autem adijciuntur, quae nervorum lassitudines reficiunt, acopa vocant: & ad vnguenta, quae calfaciunt, & discutiunt. Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodest.



prodest, tribus obolis in vino odorato potus.

Platanus.

CAP. XCI.

**T**Enerrima platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in vino potæ, serpentium morsibus auxiliantur: exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant incidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus.

CAP. XCII.

**F**Raxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemq; potu perniciem afferre tradunt.

Populus.

CAP. XCIII.

**P**otus albe populi cortex vncie vnius pondere, ischiadicis ac vrine stillicidio prodest: Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoq; cum vino post purgationes pota, idem prestare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilule, quæ primo foliorum partu exiliunt, illitæ cum melle, oculorum lebetudini medentur. Memorie proderunt corticem albe populi, & nigre particulatim cesum, & sulcis stercoratis mandatū, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigre folia cum aceto illita, magna vtilitate podagric



gricis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quæ in malagma additur. Semen potum ex aceto comitialibus vtile est. Lacrymam populorum commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, alij chrysophorum. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum potumque stomachi ventrisque fluxiones sistit.

De ortu electri multa lib. vlt. capit. 3.

Macer.

CAP. XCIII.

& 4.

**M**acer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquam adstringens: qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

apud Plin.

Vlmus.

CAP. XCV.

**V**lmi & folia & cortex & rami, vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia, si fasciæ loco interqueatur: nam in lori more flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua frigida vnciatim potus, pituitas trahit: fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum, corticis aut radicis foveantur. Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciemque splendidiorem præstat. Qui dum siccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt cocta, olerum more ad obsonia usurpantur.

**E**x Lignorum marciorum. CAP. XCVI.  
Ex caudicibus lignisq; veteribus caries coagitur.



ritur, quæ farine modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: serpentia cchibet, si cum pari aniso & vino subacta, linteis que imposita illinatur.

Harundo.

CAP. XCVII.

**I**N harundinũ genere quedam nastos, id est, farctior, vocatur, ex qua sagitte faciliari solent. Alia femina, qua tibiariũ ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cineta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concava, apud amnes nascent: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candicans, vulgò cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula, aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumberumq; dolores cū aceto mulcet. virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere peruncte cū aceto alopecie sanatur, panicule lanugosi aures intrauerit, exsurdant. Eundem effectũ implet harundo quæ cypria dicitur.

Papyrus.

CAP. XCVIII.

**P**apyrus, qua chartæ fiunt, nullis nõ cognita, præcipue in medicina utilitatis, ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, vsq; dum inaruerit: constricta enim atque immissa in hiatum, humore cõpletur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nes. i. quid alimenti radix: ita quæ  
Aegyptij.



Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expuunt. Ipsius radicibus pro ligno vtuntur. Cremata papyri cinis depascētia vlcera cum omniū partiū, tum oris maximè, cohibet: verū melius id combusta charta pręstat.

Myrica.

CAP. XCIX.

**M**Yrica seu tamarix arbor vulgò cognita Officinis Ta-  
est, cum apud pigras & stagnātes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens compage marimuscum. Aegyptus Syriaq; alterā gignūt miscus. tiores, syluestri cetera similem. Fructum parit galle proximū, inequaliter adstringentē gustu: quo conuenienter vtimur vice galle in medicaminibus oculorum orisq;. Datur cruēta excretioni in potu, & celiacis, & cōtra profluvia fœminarum, regiū morbum, & phalangiorū morsus, illitus tumores inhibet. Cortex in eosdē vsus adhibetur. Decoctum feliorū cum vino potū, lienem alsumit: ad dolorē dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vuluę opportunis in defectionibus, phthiriasi lendibūsq; circumfusum prodest, abundantia fœminarū sistit impositus arboris cinis, potorios calices è caudice lienosis moliuntur, quò datus in his potus proficiat.

Erica.

CAP. C.

**E**rica \* fruticosa arbor, myricę similis, longe minor: cuius flore apes reprobū mel fruticem efficiunt, tam flos quàm coma serpentium ictibus illitū medetur. \* Plin.

Acacalis .



Acacalis.

CAP. CI.

**A**cacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadamtenus similis: cuius aqua, in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Rhamnus.

CAP. CII.

**R**hamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos & aculeos in acuta spinæ modum, folijs paruis, oblongis, subpinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusque folijs constat, & quadamtenus rubetibus: cuius rami quinum ferè cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusque rigentibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, te-

\* τοι κὸς νῦν, follicularij specie, \* verticillo simile. Omnium ἀσφο - folia igni sacro, & serpentibus ulceribus, effica-  
 Ἀέλω, citer illinuntur. Fama est ramos huius valuis se-  
 id est, a- nestrisve impositos, veneficia depellere.

sphodeli

Halimus.

CAP. CIII.

fructui

similem.

**H**alimus frutex est sepimētis idoneus, simili-  
 lis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus: nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix, conuulsa, rupta, torminæque mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsa pota: eadem lactis vbertatē facit.

Paliurus.

CAP. CIIII.

**P**aliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum in-

uenit



uenitur: quod potum tussi opitulatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium iclibus aduersatur. Folia & radix adstrictoriam vim habent: quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresque omnes discutit, trita & imposita.

Acuta spina. CAP. CV.

**A**cuta spina, quam pyrinam aut pityan- Officina  
then aliqui vocant, arbor est pyrastrosi- rū Ber-  
milis, spinosa valde & minor, baccas profert beris.  
myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum:  
radicem multifidam, aliter descendente. Huius baccae  
potu aut cibo, alui profluvium, & abundantiam fe-  
minarum sistunt. Radix illita aculeos & spicula  
extrahit, abortum fieri tradunt, si ter radice ven-  
ter, aut sensim feriat, aut perungatur.

Rubus canis. CAP. CVI.

**R**utex est arboris instar, rubo longè maior:  
folia fert multò laticora myrto, robustis  
circa ramos spinis, flore candido, fructu ob-  
longo, nucleo olivæ simili, qui per maturitatem  
fulvescit, & flocculos intus continet. Fructus ex-  
emptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit:  
feruescenti enim in vino, mox poti, arteriam  
infestant.

Ligustrum. CAP. CVII.

Offici-

**L**igustrum arbor est olivæ folijs circum ra- nis Alcā  
mos similibus, latioribus, mollioribus, & na.

f



colore viridioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Folia adstrictoriâ vim habent: quare commanducata vlceribus oris medentur, illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; prosunt, decocto eorundem igni ambusta fouetur. capillû rufant trita folia, quæ in radicule succo maduerint. Flos ex aceto fröti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, excalfacit, emollitq; nervos: si quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

## Tilia. CAP. CVIII.

**T**ilia arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ, nigrioribus & latioribus, fructu\* lentis, nigro, subdulci, racematim coherente, asperis nascitur. Huius folia adstringunt: ad eadẽ vtilia ad quæ oleaster, cûm adstrictione est opus: maxime ad oris vlcera, commanducata, aut si decocto colluantur: pota vrinam ac menses cient.

## Cistus. CAP. CIX.

**C**istus, quem aliqui citbaron, aut cissarö vocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, folij rotundis, acerbis, hirsutis. flos\* masculo vt mali punice, femine albet. Vis adstringens: vnde flores in vino austero bis in die poti, presunt dysentericis, & nomas perse illiti colibet. vetustati vlcerû, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis, orchethran, aut cylinus à nonnullis cognominata, iuxta cistis radices

\* Vox  
ex Plinio  
reposita.



radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia cãdida. Liguatur acacie modo. Aliqui tamẽ exiccãt, fractãmque macerãt, & incoquũt, reliqua; vt in lycio prosequũtur. Vires acacie habet, verũ aliquantò magis siccãt, & adstringit. Prodest dysentericis, caliacis, sanguinem excreantibus: fæminarum profluuiò & pota & indita.

Ladanum. CAP. CX.

**E**st & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorũ vis adstringens, ac eosdem, quos cistus, effectus præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hirci; , pinguitudinẽ conspicuẽ barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adherescentem reportant: quam deperdentes incolæ, colantẽs; cogunt in offas, & ita recondunt. Alij verò attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in ladanum. Maximè probatur odoratum, subviride, faciliè mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore oblitum est, resinosum, quale in Cypro gignitur. Arabicum verò Libycũ;q; vilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, mollinendi: ora venarum patefacit, capillum fluentẽ continet, addito vino, myrrha, & myrteo leo: cicatricibus decorem reddit, cum vino illi-

Colligen  
di lada-  
ni mo-  
dus.



tum: medetur aurium doloribus, cum Hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundas eicit, pennis immistum vulue duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tussimq; finiunt, & malagmata utiliter inseritur: aluum sistit cum vino vetere potum, & urinam ciet.

## Ebenus. CAP. CXI.

**E**benus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens venarum discursus, factitij cornus leuore cum frangitur densa apparet, mordet gustus, atq; leniter adstringens. Suffitur iucundo odore supra carbonem, sine fumi tadio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & irrita ad cotem rufescit. Altera est Indica, internatis segmentis candidantibus, & modice fulvis item frequenter maculis: ceterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consimilia pro ebena veneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureis assulas resolvuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentie in suffitu preferentia. Caliginem oculorum absterget, ad veteres destillationes pustulasq; mirum in modum pollet: si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes rametave vino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ipsa excolant, reliquaq; eodem in modum peragunt. Alij pro vino aqua utuntur. Vritur in fictili no-



uo, donec in carbones redigatur. Lauatur plum-  
bi vsti modo, & ita siccis scabrisque lippitudi-  
nibus conducit.

Rosa.

CAP. CXII.

**R**osa refrigerat & adstringit, sed sicca mul-  
to magis. Succus recentibus folijs exprimi-  
tur, defectis forsice vnguibz (sic appellantur can-  
dida foliorum partes) reliquū in pila premi &  
teri debet in vmbra, donec cogatur, & ita ad  
oculorū circūlitiones recondi. Siccātur etiam-  
num folia rosarum, cōtinuò versata, ne muceāt,  
neve situs in ijs insideat. Aridis rosis & in vino  
decoctis expressus liquor, facit ad dolores capi-  
tis, aurium, oculorum, gingivarū, sedis recti inte-  
stini ac vulue, pinna illitus aut infusus. Eadem  
sine expressione tusa, precordiorum inflāmatio-  
nibus, humidis stomachi vitijs, igni sacro illini  
prodest. siccis ac tritis femina asperguntur. Mi-  
sceri solent vulnerarijs antidotis, atque composi-  
tionibus, quas antheras vocant. Folia vruntur  
in calliblephara. Flos, qui in medijs rosis inueni-  
tur, siccatus, gingivarum fluxionibus efficaci-  
ter inspergitur. Capita pota citam aluum, &  
cruentas reiectiones sistunt.

Quid vn-  
guis in  
rosa.

Rosei pastilli.

CAP. CXIII.

**P**astilli, quos rhodides vocant, hac ratione  
conficiuntur: Rosarum viridium, que nul-  
lo antea humore madefacte extabuerint, dra-  
chmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ de-

f 3



cem, myrrhae drachmae sex, trite digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pondus aequet: siccatique in umbra, in fictili non picato, atque obturato reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis Illyrica totidem, & vinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium vice collo circumdato vsui sunt, ad retundendum graue sudoris virus. Tritis etiam vtuntur ad illitiones & diapasmata, quae sunt ad sudores coercendos, ita vt à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium. CAP. CXIIII.

**L**ycium, quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium culitorum, aut longioribus: folijs buxi, densis: fructu piperis, nigro, leui, amaro, densoque: cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. Aspera loca amat. Succus extrahendi ratio haec est: Rami cum radiculis tusi, & antè per multos dies macerati, coquuntur, tum abiectis lignis iidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurcae, aut absynthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur: reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit lycium, semine expresso et insolato. Optimum, quod vri potest, restinctumque rubentem spumam ostendit, glabris



his extrinsecus nigris, intus, cum fregeris, rufis.  
 \*odore minimè viroso, cū amaritudine adstrin- \* Ita ex  
 gens, crocino colore (cuiusmodi Indicū est) ceteris Plinio.  
 præstātius atque efficiaciū. Lycium adstringit,  
 caliginem oculorum discutit, genarum scabiem,  
 pruritus, veterēsque fluxiones sanat: facit ad puru-  
 lentas aureis, exulceratas gingiuas, tōsillis, labio-  
 rum fissuras, sedis rimas, attritūsq; illitum: cœlia-  
 cis, dysentericis, potū inditūque conuenit. da-  
 tur sanguinem excreantibus & tussi, ex aqua:  
 contra rabiosi canis morsus in catapotio deuo-  
 ratur, aut in aqua bibitur: flauo facit pilos: re-  
 duūis, vlceribus, quæ serpunt aut putrent, mede-  
 tur: fœminarum profluvia appositum sistit: ra-  
 biosorū ictibus ex melle potum aut, vice catapo-  
 tū deuoratū, auxiliatur. \* Tradunt Indicū fieri  
 lycium, ex frutice lonchitide appellato: ea spina-  
 rum generi adscribitur, ramos rectos habens ter-  
 nūm cubitorū longitudine maiorēsve, rubo cras-  
 siores, à radice numerosos. Fractus cortex rube-  
 scit, folia olei similia. Herba in aceto decocta pro-  
 ditur lienis inflammationibus & regio morbo  
 mederi, & fœminarū purgationes elicere. Assene-  
 rāt etiā crudā in potu, eosdem effectū, præstare,  
 Semem cyatho dimidio potum, pituitam expur-  
 gare: venenis quoque auxilio esse.

Acacia CAP. CXV.

**A**cacia in Aegypto nascitur spina instar  
 arboris, fruticosa, non se in rectū attollēs.

\* Viden-  
 tur mar-  
 cello quæ  
 hinc se-  
 quuntur,  
 notha.

\* Non  
 est genuū  
 na offici-  
 narum  
 Acacia,  
 quauis  
 eadē vi  
 ac natu-

ra prædi-  
 ta.



Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccatur in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succū. Manat & gūmi ex ea spina. Vis ei ad spissandū, refrigerandūq; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacrum, vlcera que serpunt, perniones, pterygia, & oris vlcera: procidentes oculos reprimat, mensium abundantiam sistit, prociduum vuluam cohibet: citam aluum suppressit, aut potius aut subter inditus: capillos denigrat. Lavatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod cōcreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu perflata. Spina decoctum solutos artus fotu committit. Praefertur eius spina gummi, quod in vermiculorum specie contrahatur, & vitri modo perluceat, ligni expers: proximum est candidum: sordidum verò ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat, ambustis ex ovo illitum, pustulis nō patitur erumpere. Alterū acaciae genus in Cappadocia Pontóque provenit. Aegyptiae spinae similitudine, longè minus, tenerius, humile: aculeorum vallo munitur, folia habens rute. Semē lenticula



ticula minus fert autumno, in loculis connexis, ternum quaternumve capacibus. Succus eius adstringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

## VITEX. CAP. CXVI.

**V**itex siue lygos frutex est in arbore assurgens, nascitur in fluminum ripis, asperisq; locis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, fructu pernicaces: folia oliue: sed molliora. Duo genera eius, vna harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, vt piper. Ex calfactorias vires habet, & adstringatorias. Semen eius potum venenatis ictibus, aque, que cutem subiit, lienosisq; auxiliatur: lac euocat, menses ciet, drachme pondere in vino potum: genitura exoluit, caput tentat & sopor effert. Decoctum herbe & seminis in desensione, mulieribus vulue malo opportunis opitulatur, item inflammationibus. purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu vel appositu. capitis dolorem dissoluit illitum, instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. Folia suffitu aut substratu fugant venenata: illita quoque serpentium morsibus auxiliantur: testium durities cum butyro & folijs vitium emolliunt: rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat, & cum folijs medetur luxatis, vulneribusq;. Virga qui manu teneat dum iter facit, negatur intertriginem lygi sentire. Agnum, quasi dicas castum, vocant Graeci.

Barbaris a-  
gnus castus.

Nominum  
agni &  
tio.

f s



ci, quoniam matrone in thesmophorijs Atheniense-  
sum castitatem custodientes, folijs huius cubit  
sibi sternunt. & lygon, quasi vimen, propter inui-  
etam ferè ramorum flexilitatem.

Salix. CAP. CXVII.

*S*alix vulgò nota est: cuius semen, folia, cor-  
tex & succus spiss. indi vim habet. Trita fo-  
lia cum exiguo pipere & vino pota, ilecis subue-  
niunt. sumpta per se & cū aqua præstāt mulieri-  
bus ne cōcipiāt. Salignū semen in potu sanguinē  
expuentibus prodest: cortex eisdem præbet effe-  
ctus. Corticis cinis admisto aceto maceratus, illi-  
tu clauos & callos tolit. Ex folijs & cortice suc-  
cus cum rosaceo in calice punici calfactus, au-  
rium doloribus auxiliatur. Decocto eorum poda-  
gras foveri utilissimum: fursures purgat in cor-  
pore. Exipitur succus, qui manat ex ea cū flo-  
ret, exciso cortice: in plaga enim concretus hu-  
mor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant ocu-  
lis, suam vim prælet.

Sylvestris olea. CAP. CXVIII.

*S*ylvestris olea, quam Latini oleastrum appel-  
lant, alij Aethiopicam oliuam, folia adstrin-  
gunt: trita autem & imposita ignem sacrum, vl-  
cera, quæ serpunt, epinyctidū, carbunculos, redu-  
cias nemāsque cchibent: crustus emarginant cū  
melle illita. Quinetiam sordida vlcera repur-  
gant: inflammationes panósq; cum melle impo-  
sita discutunt: cutem à capite vulsam congluti-  
nane



nant: oris vlceribus, & priuatim infantium, com-  
manducata medentur. Succus & decoctum eisdem  
habent effectus: sanguinis eruptiones, ac mulie-  
bre profluvium, ad motus succus inlilet: vna oculo-  
rum, pustulisq; prodest: vlcera et veteres deflu-  
xiones sistit, (quapropter in collyria additur.)  
ad genarum erosiones perquam utilis. Exprimi-  
tur succus tuis folijs, affuso vino aut aqua, sic-  
catusq; sole in pastillos digeritur: sed longè vali-  
dior ad recondendum succus habetur, qui cum  
vino quàm cū aqua expressus est. Auribus sub-  
uenit siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia con-  
uenienter coeliacis cum farina hordacea illinun-  
tur: vruntur cum floribus folia, vt spodij vicem  
cinis præstet, in cruda olla, oblito ore luto, usque  
dum figlinum percoquatur: restinctaq; vino &  
rursus subacta, eodem modo vruntur, postremò ce-  
russæ modo elota cōguntur in pastillos. Huinsce-  
modi cinerem in medicamentis oculorum constat  
spodio non cedere, sed eisdem viribus præditum  
esse putandum est. Foliorum sativæ oleæ eadem  
vis intelligitur, sed aliquatò inferior: vnde oculo-  
laribus medicamentis et suam mitiorē vim con-  
venientior est. Sudor ligno virenti accenso ma-  
nans, illius sanat lichenas, furfures & scabiem.  
Oleaginum semen illius medetur furfuribus, &  
vulnibus quæ depascunt vorantq; quod autē in-  
tra nucleum est, ex adipe & farina scalros vn-  
gues excutit. Colymbades tritæ & ambustis il-  
litæ



lite postulas gigni prohibet, sordida ulcera purgant, muria succus collutas gingivas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua flaua & recens stomacho utilior est, ventri difficilis: nigra autem & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascetia ulcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestri oliue gingiuis putri vlrigne laborantibus colluitur, dentium mobilitates stabilis, calfacti foris gingiuis fluxione laborantibus utilis est. lanam enim specillo circumligatam oleo madesacere oportet, & gingiuis adnouere, donec albe spectentur.

Lacryma Aethiopice olea.

CAP. CXIX.

**L**acryma, quam Aethiopica olea stillat, scammonio similis quadamtenus est, fulua, stillis exilibus constans, mordax: quae autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec guttu mordens, superuacua est. Nostrates olea, oleastrisq; similem lacrymam sudant, quae commodè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices albuginesq; illitu emendat, urinam & menses ciet, canis dentium impressa ad dolores efficax est: inter venena scribitur: partus pellit, lepra & impetigines sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis olea.

Amurca. CAP. CXX.

**A**murca (expressae oliuae recrementum) decoct



cocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præbens lycij effectus. Insuper dentium doleri & vulneribus, cum aceto, vino aut mulso commodè illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruētia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si verò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumentorum scabiem cum decocto lupini, & chamaeleōte illitus sanat. Cruda & recenti amurca podagras articularesque dolores foveri, vtilissimum: peritæta in villosa pelle, & hydropicis imposita tumoris molem reprimunt.

Quercus, glans, fagus, ilex.

CAP. CXXI.

**Q**uercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber, qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pessulo, feminis fluxione vuluæ laborantibus subiicitur. Glandes eosdem effectus exhibent: urinam ciunt, capitis dolorem & flatum in cibum sumptæ pariunt, resistunt esitæ venenatorum ictibus. Decoctum earum & corticis cum lacte vaccino potum, prodest contra toxica: intritæ crude, inflammationes illius leniunt: ad duritiæ, quas cacœthe vocant, & malefica vlcera cum salsa axungia



gia conueniunt. Ilignee glādes viribus quernas antecellunt. Fagus & ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Ilignee radicis cortex cum aqua coctus, cum molitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium trita & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Castanea. CAP. CXXII.

**S**ardianae glādes, quas aliqui castaneas, aut slopima, aut glandes Iouis appellant, adstringunt, similisq; effectus praebet: praesertim tunica quae carnē & corticem media intercursat. Carobis, qui ephemerum biberunt, conueniens est.

Galla. CAP. CXXIII

**G**alla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidē, sed tuberosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quae efficacior est. Viriusque vis vehementer adstringere. Tritae excrescentia in carne, fluxiones gingivarum & vuae, atque oris ulcerationem cihibent. Nucleus, dentium cauernis inditus dolorem sedat. Cremata carbonibus, donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acida muria extinctae, sanguinem supprimunt. Decoctum, quibus insidere expedit, efficax est, & contra vulnus procidentis fluxionesque. Capillos denigrant, aceto aut aqua macerata, dysentericis caliacisq; cum vino  
aut



aut aqua trita cōuenienter illinuntur, aut bibū-  
tur: obsonijs addi debet, aut integræ in aqua præ-  
coqui, in qua nonnihil excoquendū est, quod his  
affectibus conferat. In summa, his vtēdum ad  
adstringenda, aut siccanda quæ opus sunt.

Rhus. CAP. CXXIIII.

**R**hus quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus *Officinis*  
erythros appellata, semē est coriarij fruti- *sumach,*  
cis, sic vocati, quoniam coriorū infectores eo vtā *Arabij*  
tur, ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris *more.*  
nascens, binūm ferē cubitorum altitudine, folijs  
oblongis, subrubentibus, in ambitu serratis, acino  
vuarū gracilium denso, magnitudine terebinthi,  
quadāmtenus lato: cuius corticosa tunica per-  
quā vtilis est. Folia vim habent adstringendi,  
& acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos  
denigrat, dysentericis infunditur, & in potus eo-  
rum in seßusq; adijcitur: instillatur auribus puris  
lentis. Gangrenas & pterygia cohibent folia ex  
aceto aut melle illita. Liguamentum fit ex aridis  
folijs, ad crassitudinē mellis in aqua decoctis, ad  
eadem, vt lycium, conueniens. Semen eosdē effe-  
ctus exhibet: cæliacorum, dysentericorūque ob-  
sonijs inspergitur: fracta, desquamata, liuida q;  
illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: lin-  
guæ asperitates cum melle abstergit, candida fœ-  
minarum profuuiā sistit, hæmorrhoidas sanat,  
cum querno carbone intrito admotum. Aqua, in  
qua semē maduit, decocta, cogitur cœtque effica-  
cior



cior ipso semine. Gummi defert, quod dentium  
cavis imprimitur, ad dolores finiendos.

Palma. CAP. CXXV.

**P**alma in Aegypto gignitur. Ea medio ma-  
turitatis vigore, autumno decerpi solet,  
Arabici myrobalani similis, pomatis cognomi-  
ne, colore viridi, & odore malicotonei. quod si ad  
maturitatē peruenire sinatur. phœnicobalanus  
fiet. Palma acerba est & adstringens: cōtra alui  
foeminarūmq; profluvia, in vino austero bibitur:  
hemorrhoidas sistit, vulnera glutinat illitu. Phœ-  
nicobalani recentes plus siccis adstringunt. capi-  
tis dolorem afferunt, copiosiores in cibo inelriāt,  
sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis, &  
dysentericis utiles in cibo: illinuntur cum coto-  
neo & cerato œnanthino vesicæ vitūs. Cariotæ;  
præsertim esu faucium asperitati medentur. The-  
baicarum decoctum potu æstuationem sedat, vi-  
res recreat cum hydromelite veteri sumptum: ci-  
bo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem cō-  
ueniens. Decoctū per se potu & gargariZatio-  
ne magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei  
palmarū, ceterorū more cremati in crudo fœtili,  
& vino restincti cinere loti, si edū vicē efficiūt:  
miscentūrq; in callilephara. Quod si non iustam  
vstionem acceperint, denuō cremandi. Vim ad-  
stringendi habent, & spiracula cutis obductu suo  
claudunt: contra oculorum vuam & pustulas,  
palpebrarū defluvia, cum nardo effectū præbēt:  
corpor



corporis excrescentias cum vino reprimunt, vl-  
cera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas  
vtilis ex palmis humilibus Aegyptiae.

Palma elate. CAP. CXXVI.

**P**alma, quam aliqui elaten aut spathā ap-  
pellant, fructus palmarū adhuc florentium,  
inuolucrum est calyxq; quoinstissamēta vnguen-  
tarū vtuntur. Optima habetur odorata, adstrin-  
gens, ponderosa, preclusa, intus pinguis. Vis ei  
adstrictoria: sistit vlcera quæ depascunt, laxa-  
tos artus cōmittit, trita miscetur cataplasmatibus  
& malagmatis: prodest p̄cordijs, imbecilli stoma-  
cho, & iocineri affecto, mixta conferentibus ca-  
taplasmatibus. Eius decoctū subinde detersum, ca-  
pillos denigrat: datur bibendum cōgruē, renum,  
vesicae, & viscerum vitijs: vuluē ac ven-  
tris fluxiones sistit: scabiem cum resina, & cera  
sanat, si viginti diebus recens apponatur. Inuo-  
lutiūsq; in ea elate fructus, quē suo amplexu fo-  
uet, elate etiā vocari solet, et ab aliquibus teras-  
sus. Adstringit, et spathæ effectus præstat, non sic  
vnguētis expetitus. Alba medulla caudicis recēs  
in cibo, aut decocta eadem facit, quæ borassus.

Malum punicum. CAP. CXXVII.

**M**alum punicū omne boni succi est, stoma-  
cho vtile, per exiguū sufficiens alimen-  
tum. Dulcia stomacho utiliora habentur, sed  
aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes  
pariunt, vnde in febre abdicantur. Acida ad-

Vulgò  
malum  
crana-  
tum.



stringunt, æstuanti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient. Ora gingivasq; ledunt. Vinosa verò mediâ sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctive, fluentem aluum stomachumq; sistunt. Cælesti aqua madescunt, bilunturq; cōmodè sanguinem excreantibus: ad desessus dysentericorum, foeminarumq; fluxione vulvæ laborantium vtilis sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, & sedis ulcera, nomas, reducias, & ea, quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium vitia: præsertim acidorum.

*Cytinus*

Huius flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant, quas punicum, præstant utilitates: humida gingivarum vitia mobilesq; dentes decocto colluuntur, herniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. memoria tradunt qui tres quàm minimos cytinis deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum: eliquatur hypocistidis exemplum.

*Malicorium.*

Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant. Id spissandivim habet, & quos cytini, præbet usus. Decoctum radicis potu latus ventris tineas pellit, & easdem euocat.

*Balaustium.*

Balaustium sylvestris punici flos est, cytino similis, cuius complura genera reperiuntur: candidum, fulvum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui adstri



adstrictoria vis inest, eadem faciens, quæ hypocistis, & cytinus.

Myrtus.

CAP. CXXVIII.

**M**Yrtus sativa nigra utilior est medicinae quam candida, & in hoc genere multo magis montana: semen tamē imbecillius parit. Vis & myrti & seminis adstringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguinē excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus baccis expressus eosdem effectus exhibet: stomacho utilis, urinam cit: prodest contra phalangū morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis decoctū capillum tingit, ius decocti in vino vlcera in extremis membris nata sanat, oculorum inflammationes illitū cū polline polenta lenit, contra egilopas illinitur, crapulā arcet præsumptū vinum, quod feruefacto aliquantum eius semine exprimatur: aliās enim acorē contraheret. Præstat idem seminis effectus. Vitale procidentie vuluarium in defectionibus, sedis vitij, & fœminis fluxione vulvæ laborantibus: purgat furfures, vlcera capitis manātia, atq; eruptiones papularū: fluentes capillos continet. Additur quoq; in medicamenta, quas liparas vocant, uti cleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad defectiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & male solidescentes. Eo fracta ferruminationi repugnantia utilissimè fouetur, vitiliginē emēdat, purulentis auribus infunditur, et



capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis vlceribus, et partibus omnibus fluxione laborantibus, coeliacisq; profunt: & admiſto omphacino oleo, aut exiguo roſaceo cum vino, ad vlcera ſerpentia ignem ſacrum, teſtium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arentium foliorum farina vtiliter inſpargitur paronychijs, pterygijs, & cōtra alarū ſceminūmq; perfuſiones: cardiacorum ſudores cohibet. Folia cruda ſeu cremata cum cerato, ambuſtis, paronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs ſuccus adſuſo veteri vino aut aqua celeſti, cuius recentis uſus eſt: nam exiccatus planè cariem ſentit, & vires amittit. Myrtidandum dicitur, adnatum inequabile, verrucoſum intumeſcēſque, & concolor: quod pèrinde quaſi manus myrti caudicem amplectitur. Magis quàm myrtus adſtringit: tuſum addito auſtero vino reponitur, coactūmq; in paſtillos ſiccatur in vmbra, multò efficacius, & folio & ſemine, cerato, peſſis, inſeſionibus, cataplaſmatis admiſtum, ubi adſtringendum aliquid eſt.

Ceraſia.

CAP. CXXIX.

Ceraſia aluo vtilia ſunt, ſi viridat ſumantur: eadem ſiccata, illam ſiſtunt. Gummi, quod ceraſi reſudarunt, cum vino diluto tuſi vetuſta medetur: colorem commēdat, viſum exaceruit, appetentiam inuitat: idem ex vino potum calenſis auxilio.

Silaq



Siliquæ.

CAP. CXXX.

**S**iliquæ recentes stomacho aduersantur, aluū *Græcis*  
 soluunt: eadem siccata sistunt, stomachoque *Ceratia:*  
 utiliores sunt. Urinam ciunt: sed præcipuè, quæ arbor au  
 vinaceis conduntur. *tem ipsa*

Mala.

CAP. CXXXI.

*Galeno*

**F**olia, flores, & germina cum omnis mali, *cerato-*  
 tum maximè cotonea adstringunt. Pomis *nia dici-*  
 acerbis adstringendi vis inest: maturis verò longè *tur.*  
 secus. Eæ ijs vernabilem gignunt, nervos omneis  
 ledunt, inflationes pariunt. Cotonea stomacho  
 utilia, urinam ciunt: verum tosta mitiora habentur.  
 Prosunt coeliacis, dysentericis, purulenta extus-  
 sientibus, cholericis, præsertim cruda. Mace-  
 ratorum liquor commodè in stomachi aut vètris  
 fluxionibus, potui datur. Succus crudorum as-  
 sumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fo-  
 uentur vuluæ, & sedes si procidat. Cotonea, quæ  
 melle cōdiuntur, urinam mouent: mel autem si-  
 bi constringentem illorum vim, & inspissantem  
 adsciscit. Quæ cum melle coquuntur, stomacho at-  
 que origratiora sunt, sed minus inspissant. Cru-  
 da cataplasmatibus adiunguntur, ad colibendam  
 aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vomitio-  
 nes effundatur, ad mammarum inflammationes,  
 præduros lienes, & condylomata. Fit vinum  
 ex ipsis tuis expressisq;: sed quò perduret, quin-  
 decim sextarijs succi vnus mellis adiungitur, alio-  
 quin in acorem degenerat. Prodest ad omnia,



que dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod melini<sup>us</sup> vocauimus, quo utimur quoties adstringēti oleo est opus. Eligi oportet vera, que sanè sunt rotunda, parua & odorata: que verò Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs conueniēs, que adstrictionem desiderāt, inflammationibus oculorū, reiectionib<sup>us</sup>q; sanguinis. Contra citam aluum, & mensium impetus, in vīno bibitur. Melimela ventrem molliūt, & ab eo animalia expellunt. stomacho negotiū exhibent.

Aestuosa. Ea multis dulcia mala vocātur. Epitrotica mala, que Latine orbiculata dicuntur, stomacho utilia: sistunt aluū, vrinas euocant, malis tamen cotoneis inualidiora. Siluestria mala similia sunt vernis, & adstringūt. Sanè in hunc usum immatura omnia opus sunt. Persica poma matura tā stomacho, quā vētri utilia sunt. Acerba aluum colibent: sed sicca vehementius. Decoctū ē siccis alui stomachiq; fluxiones sistit.

Armeniaca, que à Latinis precocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora.

Medica mala Persicave aut cedromela, que Latini citria vocant, nemini nō cognita. Arbor ipsa omnibus anni tēporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malū oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum gravitate odoratum. semen habet pyri. Id in vino potū venenis resistit, aluum mouet, oris suauitatem com-

ment



mendat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus: vestiarijs impositum eb erosionis vitio vestes vindicare existimatur.

Pyra. CAP. CXXXII.

**P**yrorum multa genera, quae tamen omnia adstringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è siccis & cruda ipsa aluum sistunt: ieiunos esitata ledunt. Achras pyrastri genus est, quod tardissime ematurescit. Vim pyro adstringentiorē habet, & ad eadem conuenit: stringunt etiā eius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aut fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus. CAP. CXXXIII.

**M**espilus, quae à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio pyxacanthae: fert pomum suauē, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardè maturescit, esus adstringit, stomacho gratum est, aluumq; supprimit. Alterum mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanium, alij epimelida vocant. Arbor folijs mali, sed minoribus: pomum fert rotundum esui aptum, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor. CAP. CXXXIIII.

**L**otus arbor est vastae magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibis gra-



tam, stomacho facilem. Aluum sistit laccis. Ramen-  
torū ligni decoctum siue potu, siue infusione  
dysentericis ac feminis fluxione vuluæ laborāti-  
bus, auxilio est rufat capillos, citā aluū cohibet.

Cornus.

CAP. CXXXV.

**C**ornus dura arbor est, baccas ferens oliuæ  
modo oblongas, quæ primū virēt, dēin per  
maturitatem rubescunt, aut ceræ colorē repræ-  
sentant. In cibo adstringunt, profluvio alui atq;  
dysentericiæ salutare, siue in edulio, siue in defu-  
to exhibeantur. Muria, vt oliuæ, condiuntur.  
Sanies, quā virentia folia torrendo resudarunt,  
impetigini conuenienter illinitur.

Sorba.

CAP. CXXXVI.

**S**orba colorem luteū referentia prius, quā  
maturescant, dissecta & sole siccata mādun-  
tur, vt album sistant. Eadem est functio molito-  
rum farine, si polentæ loco sumatur: quod &  
decoctum eorum in potu præstat.

Prunus.

CAP. CXXXVII.

**P**runus arbor est nota, cuius pomū estur: sed  
stomachum malè habet, aluū mollit. Syria-  
ca pruna, & præcipuè quæ Damasci gignūtur,  
exiccata stomacho utilia sunt, aluū adstringūt.  
Folia pruni in vino decocta collutione, & gar-  
garizatu vuam, gingiuas, & tonsillas fluxione  
laborāt eis reprimūt. Præstant idem syluestriū  
prunorum bacce, post maturitatem exiccate, cū  
sapa verò decoctæ, stomacho utiliores reddūtur,  
aluū m



aluumq; magis adstringunt. Gummi prunorum agglutinat, potum in vino calculos comminuit: ex aceto quoq; illitum, lichenas infantium sanat.

Arbutus.

CAP. CXXXVIII.

**A**Rbutus, siue vnedo, arbor est cotonea malo non dissimilis, tenui folio: \* cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo: huic memaculo cognomen est maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus, stomacho aduersatur, capitisq; dolorem mouet.

Amygdalæ.

CAP. CXXXIX.

**A**mygdalæ amare radicum tritarum decoctum vitia cutis in facie corrigit: illite nuces idem munus præstant, menses admodum ciunt, capitis dolori auxiliantur, illite fronti aut temporibus cum aceto vel rosaceo: epinyctidas sanant ex vino, item putrescentia vlcera, & que serpunt, & morsus canum cum melle: earum autem esu dolores finiuntur, aluum emolliunt, somnum faciunt, vrinam cient, contra sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur, renum vitis, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu aut eclegmate cum resina terbinthina dantur: calculosis difficilique vrinæ in passo auxiliantur, & illinctu cum melle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellane magnitudine: quinis septenisve præsumptis ebrietatem non sentiunt potiores: vulpes, si cum quadam esca eas vorauerint, emoriuntur.

\* Prunis magnitudine ne quidem hic fructus nequaquam cedit: cæterum effigie adeo expressere fert fraga, ut nil queat expressius.



tur. Gummi eius calfacit, et adstringit: reijciendis sanguinem, potum auxilio est: impetigines, quæ summum corpus occuparunt, illud cum aceto tollit: tussi vetusta cum diluto vino potum medetur: calculosis cum passo bilere prodest. E' nucibus gravis, dulces cibo idoneæ, sed multò minus valent in remedijs. quàm amaræ: attamē extenuant, urinam ciunt, recentium esu cum suo putamine, humida stomachi vitia emendantur.

Pistacia.

CAP. CXL.

**P**istacia, quæ constat in Syria gigni, pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica: trita cum vino contra serpentium ictus prosunt, siue edantur, siue bibantur.

Nuxiuglans.

CAP. CXLI.

**N**uxes iuglandes, quas nonnulli Persici vocant, sunt difficiles cōcoctu, stomacho inutiles, biliosæ, capitis dolorē inferentes, tussientibus inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo aptæ. Cum ruta verò & ficis præsumptæ, & à summo cibo, venenis resistūt: nec minus si à veneni haustu comedantur: largius esitate tineas latas pellunt, illinūtur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatisq; cum mellis exiguo, & ruta: cum cepa autem, sale et melle, canis hominisq; morsus proficiunt: tormina, cum calyce suo perusta, & umbilico admotæ, sedāt. Putamen combustum tritumq; in oleo, & vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Sistūt menses



ses nuclei vsti, si triti ex vino admoueantur: yde  
 è veteribus, illiti carbunculis, gangrenis, & agi-  
 loijs medentur: alopecijs commaducati, et impo-  
 siti presenti sunt remedio. Nucibus tussis oleum  
 exprimitur. Recetes stomacho innocetiores sunt,  
 vtpote suauiores: itaq; allio miste eximunt acri-  
 moniam. Liures in corpore illita tollunt.

## Nuces auellanae. CAP. CXLII.

**N**uces auellanae, quae & leptocarya vocat,  
 stomacho infesta sunt: ipsae tamen tritae, &  
 in aqua mulsa potae, tussi veteri medentur: tostae  
 & cum exiguo piperis potae destillationem conco-  
 quunt, crematarum cinis cum axungia aut adipe  
 vrsi perunctus alopecijs capillum reddit. Aiunt  
 nonnulli vsta earum putamina, & in cineris spe-  
 ciem redacta, cum oleo, caesiorum oculorum pa-  
 pillas infantibus denigrare, perfuso sincipite.

## Morus. CAP. CXLIII.

**M**orus arbor nota est, cuius fructus aluum  
 soluit, stomacho inutilis est, & facile cor-  
 ruptione sentit. Hoc idem praestat mori succus:  
 decoctus autem aereo vase, atq; insolatus, adstrin-  
 gentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, &  
 tonsillarum inflammationes, addito mellis exi-  
 guo. Sed inolescit vis eius, adiecto scissili alumi-  
 ne, galla, croco, et myrrha: ite myrica semine, iri,  
 & ihure. Immatura mori poma siccantur, tusaq;  
 acinorum rhois vice obsonijs miscetur, vt calia-  
 cos iuuat. Radicis cortex decoctus in aqua et po-

tus



tus aluum resoluit, latas ventris tineas excutit, his quoq; auxiliatur, qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntq; capillum, vitium & fici nigrae frondibus simul coctis in aqua caelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

SYCOMORUS. C. AP. CXLIIII.

**S**YCOMERUM aliqui etiam sycaminum, id est, merum, vocant, cuius fructus sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo late abundans: folys mori, pomum ter aut quater anno fert, non ramis, ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus: quod non maturescit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisque non multi tritici feracibus: ubi prouentu fecundo restitilique iuuamentum adfert, cum annonae caritas premit. Pomum aluo utile est sed per quam exilem praebeat alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructuum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice de quaerato: si enim altiore plaga viol



violetur cortex, nihil effluet. Spōgia aut vellere lacryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vulnera conglutinat, discutit collectiones coctioni repugnantes bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. Celerrimè teredinē sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distāt, quæ cum sit vlmus, prædita tamen est folijs sycomori, fructu pruni magnitudine, multò dulciore, supradictis cætera similis.

## Fici. CAP. CXLV.

**F**ici mature recentes stomachum ledunt, aluum solvunt: sed facile contracta ab eis fluxio sistitur: sudorē euocant, papulāsque, sitim sedant, calorem restringunt. Siccis natura ex-calfaciēdi, vires alunt, sed sitim magis stimulat, aluo vtilis, rheumatismis ventris et stomachi contraria: gutturi autem, arteriæ, renibus, vesicæ, & ijs, quos longa valetudo decoloravit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissima: feruefactæ cum hyssopo & potæ, thoracem purgāt: tussi veteri, diuturnisq; pulmonum vitijs conueniunt: aluum molliunt tuse cum nitro & cnico, dēum manducatæ. Decoctum arteriæ & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmati miscetur, & in muliebres fœtus cū fieno greco & piisana. Ceterum cum rata cocta torminibus infunduntur



tur. Coctæ illitæq; duritias discutiunt, parotidas & furunculos emolliunt, panos ad maturationem perducunt, maximè nitro, iri, aut calce addita. Crude si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt: cum malicorio, pterygia purgât: cum atramento sutorio, deploratis ferè tibiæ fluxionibus, & cacoëthicis vlceribus medentur: quin & cum vino decoctæ addito absynthio, & bordeacea farina, vtilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cū cerato sanât perniones, pruriginēs, sonitûsq; si crude terantur, & sinapiliquorēq; aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam sylvestris, quàm sativæ fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumq; dissolvit, ut acetum: exulcerat corpora, meatus aperit, solvit aluum, vuluam recludit cū detrita nuce græcapotus, mēstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum cataplasmatiscum farina fœnigræci & aceto utilis: lepras, lichenas, vitiliginēs, vitia cutis in facie, psoras. vlcera in capite manantia, cum polenta expurgat: instillatus plagæ, percussis à scorpione, venenatorum iētibus & rabiosi canis morsibus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, & canis eorum additus: verrucarum informicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, qui lacte pregnâtes, silente adhuc oculo, tusi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur.



nitur. Et lac & succus imponuntur exulcerato-  
rijs medicamentis. Decocti cum tubulus carni-  
bus ramuli ficulni, faciem afferunt decoctionē.  
Lac efficiunt quod magis soluat, si inter coque-  
dum ficulneo surculo spathe loco moueatur.

Grossi.

CAP. CXLVI.

**G**rossi, quæ crinei nonnullis vocantur, cœctæ,  
illitæ strumas nodosq; omneis emolliunt: cru-  
de formicas, verrucas & thymos, nitro farināq;  
additis, tollunt. Folia eadem possunt, illita cum  
sale et aceto ulcera in capite manantia, epinyeli-  
das, & furfures sanant: ijs sicosæ extuberatiōes,  
& genarum scabritie perficiantur. Nigræ ficus  
folijs cauliculisq; candidæ vitiliginēs perungū-  
tur, faciūt ad canū morsus, et ulcera quæ ceria,  
id est fauos, vocāt. Grossi cū syluestris papaueris  
folijs ossa extrahūt, furūculos cū cera discutiūt,  
contra muris aranei morsus, et scolopēdræ vene-  
na, cum eruo & vino illitæ, auxiliantur. Fit ex  
cinere ficus tā syluestris quā sativæ lixiuiū,  
crematis ramorū cauliculis: quod subinde mace-  
rari opus est et inueterascere: siquidē inter cau-  
stica intelligitur. Gangrenis prodest: nāq; expur-  
gat & consumit, quæ excrescunt: eoque sic uten-  
dum est. Spongia assiduē hoc lixiuio imbuta su-  
perponitur. Interdum dysentericis, & influxio-  
nes vetustas, & sinus cuniculatim excedentes,  
magnosq; instillari cōueniet. Etenim purgat, cō-  
glutinat, carne replet, & oras cōmittit, nō secus  
atque



atq; emplāstra, quæ cruentis vulneribus iniiciū-  
tur, enema vocant. Bibitur ad discutiendum san-  
guinem concretum, & cōtra præcipitationes, ru-  
pta, cōuulsa, cū cyatho aquæ recentis colatū: ad-  
dito olei exiguo, cœliacis, dysentericis per se cy-  
athus datus predestinernorū vitis, cōuulsionibus  
cōmodè illinitur ex oleo, vipole quod sudores mo-  
ueat: aduersus gypsi potum, et phalangiorū mor-  
sus bibitur. Hæc eadem præstāt reliqua lixiua,  
præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Persea.

CAP. CXLVII.

**P**ersea arbor est, in Aegypto, fructum ferens  
cibi idoneum, stomacho vtilem: in quo pha-  
langia cranocolapta nomine inueniuntur, præser-  
tim in Thebaide. Arida folia in farinā redacta,  
illitus sanguinis eruptiones sistūt. Arborem hanc  
prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse,  
translatāq; in Aegyptum, mutata natura in  
cibos receptant.

Iberis.

CAP. CXLVIII.

**I**beris, siue cardamantica, folia habet nastur-  
tū, vere virētiora caulē culitalē, aut mino-  
rē: in incultis nascitur, æstate lacteū florē pro-  
mit, quo tēpore efficacior est. Radices duas na-  
sturtio similes habet, calfaciētes et adurētes: ipse  
enim ischiadicis cū salsa axungia emplāstri mo-  
do vtilis, quaternis horis alligata, vt deīn in bal-  
neas descendatur, & postea oleo cum lana locus  
perungatur.

PRIME LIBRE FINIS.





P E D A N I I

## D I O S C O R I D I S

A N A Z A R B E I, D E

Medicinali materia,

L I B E R I I.

Ioanne R V E L L I O Sueſſionenſi  
interprete.

*I*n primo, chariſſime Aree, libro, quem de medicinali materia cōdidimus, de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lacrymis, seminibusq; diſſeruimus. In hoc autē ſecūdo de animalibus, melle, lacte, adipe, ſugibus, atque oleribus explicabimus ſubnexis herbaceis, quæ acri prædita ſunt facultate, vt pote quæ cum ipſis cognitione iūcta ſint: qualia alliū, cepa, ſinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires diſiunxiſſe videamur.

Echinus, ſue erinaceus. C A P. I.

*M*arinus echinus ſtomacho vētriq; ue utilis eſt: vrinam cit, huius teſta cruda inafſata commodē medicamentis admiscetur, quæ pſoras abſtergunt: cremata verò cinis ſordida vlcera expurgat, luxuriātem carnem reprimit.

h



Terrestris erinacei corium combustum alopecij cum pice liquida aptissime illinitur, assiccatum corpus & cum aceto mulso polum, renum vitij auxilio est: item aque, quae cutem subijt, conuulsionibus elephantie, & male habitis, quos cachectos vocant: viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad eosdem vsus vtilissime recenditur.

Hippocampus. CAP. II.

**H**ippocampus marinum animal est exiguum, cuius crematicinis exceptus cum liquida pice, aut axungia seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

Purpura, buccina, corinque volutæ.

CAP. III.

**P**urpura vsta exiccat, dentes abstergit, excrescentias in carne cohibet, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem præstant cremata buccina, sed vehementius vrunt: si quis salis plena, fictili cruulo adurat, detificio conueniunt: ambustis vtiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet: nam postea quam vulnus cicatricem duxerit, ipsum in teste medum induratum, sponte sua decidet. Fit etiam calx è buccinis, ut in eius mentione demonstrabimus. Cionia vocatur purpurarum buccinorumq; medicæ partes, circa quas teste volumen clauicula-tim interquætur. Cremata simili modo, maiorena purpuris buccinisq; facultate vtendi consequuntur.

2247



tur, quoniam apprimendi naturā obtinēt. Buccinorum carnes ori grate sunt, & stomacho utiles: sed aluum non molliunt.

## Mituli. CAP. II II.

**M**ituli laudatissimi in Ponto. Cremati eū-  
dē buccinis effectum præbent. Privatim  
plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum  
melle utiles habentur: genarum crassitudines  
absument, albugines purgant, & cetera quæ  
oculis caliginem offundunt: carnes eorum ad  
canis morsus utilissimè imponuntur.

## Tellinæ. CAP. V.

**R**ecentes tellinæ aluo utiles, sed maximè ius  
earum: salite vruntur, triteq; in cinerem  
& cum cedria instillatæ, auulsos pilos \* renasci  
non patiuntur.

\* τ βλ  
φάσωρ.

## Chamæ. CAP. VI.

**C**hamarum conchularumq; in exigua aqua  
decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino as-  
sumitur.

## Vnguis odoratus. CAP. VII.

**V**nguis siue onyx conchyly tegumentū est,  
ei simile quo purpura integitur: quod in  
Indiæ nardiferis lacubus inuenitur. suauē ideo  
spirans odorē, quod cōchylia inibi nardi pabulo  
rescantur. Colligitur posteaquā stagnantes  
aque æstiuis caloribus inaruerunt. Laudatis-  
simus qui à rubro mari defertur, candicans, pin-  
guis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspi-



citur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquate-  
nus castoreum olent. Idem suffitu excitant femi-  
nas vulue strangulatu oppressas, comitialesq; po-  
ti ventrem molliunt. Crematum conchylium ea-  
dem efficit, quæ purpura & buccinum.

Cochleæ. CAP. VIII.

**T**errestris cochleæ stomacho viles sunt, &  
non facile corrumpuntur. Optimæ Sardoni-  
te, Aphricane, Astypaleica, & quæ in Sicilia, ac  
Chio gignuntur, & quæ in Ligurie alpibus, poma-  
tie, id est operculares, cognominate. Marina sto-  
macho idonea, & facile aluo excernitur: fluuiati-  
lis virus olet. Quæ verò vepribus frutetisq; glu-  
tinata coheret, quam vocant nonnulli sesilon,  
ventrem & stomachum turbat, vomitiones exci-  
tat. Cremate omnium teste excalfaciendi & vrē  
di naturam sortiuntur: purgant lepras, vitiligi-  
nes, dentesq; emendant oculorum cicatrices, &  
vitia cutis in facie, albugines, ac visus habetudi-  
nes, si cum carne sua vitæ triteq; ex melle illinā-  
tur. Crude cum tegumentis impositæ, aquæ inter  
cutem tumores exugunt: sed non antè solvantur,  
quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflā-  
mationes leniunt, impactos corpori aculeos illitæ  
euocant, menses trite & admote ciunt. Carnes ea-  
rum cum thure & myrrha illitæ, cum vulnera  
alia, tū maximè quæ nervi acceperunt, congluti-  
nant: trite in aceto, sanguinē naribus erumpen-  
tē infrenant. viue corpus, & præsertim Aphrica-  
na



ne, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat, trita cum testa, vino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli vesicaeque cruciatus sanat. Terre stris pilos incōmodos replicat, si quis abraso aculentore eius, pilum attingat.

## Cancro. CAP. IX.

**C** Ancrorum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentianae modo, triduo potus cum vino, magnopere prodest canis rabiosi morsibus: rimas pedum sedisque, perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit: triti crudi, potique ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus: decocti autem & cum iure esitati, us profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt: necant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, verum inefficacius omnia praestant.

## Terrestris scorpio. CAP. X.

**T** Errestris scorpio tritus & impositus, suae plagae remedium est quin estur assatus, ad eadem.

## Marinus scorpio. CAP. XI.

**M** arini scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.

## Draco marinus. CAP. XII.

**D** raco marinus dissectus & apertus impositusque ictus spine suae qua feri, medela est.



Scolopendra. CAP. XIII.

**S**Colopendra in oleo decocta stillinatur, auellit capillos: sed contactu pruritus facit.

Torpedo piscis. CAP. XIII.

**M**arina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiā mulcet: eadem apposita euersam sedem prociduamq; coërcet.

Viperæ. CAP. XV.

**V**iperinae carnes si cocta edantur, claritatem oculis afferunt, nervorum vitijs auxiliantur, incrementis strumas reprimunt: detracta autem cute caput caudaq; quoniā carne vacant, amputari debent. quippe commentitiū est quod precipitur, certam utrinq; mensuram precidi oportere. Reliquum verò corpus exēptis interaneis elotum dissectumq; discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs, qui vipersas esitēt, pediculos procreari: quod planē à veritate abhorret. Adyiciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescuntur. Sal ex eis ad eadem cōfici-  
tur, sed inefficacior est. Viua autem vipera in fictile nouum demittitur, adyiciuntur salis caricarumq; tritarū, singulatim quinq; sextarij, mellis cyathi sex, mox fictilis operculū luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciē, recōditur. Plerunque, ut ori gratior fiat, immiscetur nardi spica, aut foliū, aut malabathri momētū.

Seneēt



## Senecta anguium. CAP. XVI.

**S**enectus anguium in vino decocta dolori aurium, infusu, & dentium collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed precipuè viperinam.

## Lepus. CAP. XVII.

**L**epus marinus loligini parua similis est, qui per sese tritus, aut cū vrtica marina illitus capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cerebrum mādatur, iuuandis tremoribus, qui valetudine contracti sunt: affricu aut cibo facilem infantibus dentitionem præstat: exustum caput & cum adipe vsino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulū post triduum à concubitu potum, conceptum adimere, partusq; spem intercipere proditur: vuluæ & alui fluore sistit, comitiales iuuat, cōtra venena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum lac, & viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginēsq; sanat.

## Pastinaca. CAP. XVIII.

**M**arina pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squāmis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nā eos frangit, & euocat.

## Sepia. CAP. XIX.

**S**epiæ coctæ dum estur atrametum agrè coquitur, aluum mollit, collyrijs è testa factis conueniēter genarum scabritiæ perfricatur:



ustū in sua testa donec id, quod crustosum est, ab-  
jedat. postea tritum, expurgat vitiliginēs, surfu-  
res, dentes & vitia cutis in facie: elotum in medi-  
camenta oculorum adi solet: cōtra albugines, ocu-  
lis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia  
oculorum absūmit, cum sale tritum & iniectum.

Mulus piscis. CAP. XX.

**M**ullorum assiduo cibo, aciem oculorum he-  
betari cōstat. Is marini draconis, aranei,  
ac scorpionis morsibus medetur, si crudus atque  
dissectus admoueat.

Hippopotamus. CAP. XXI.

**H**ippopotami testes exiccati ac triti contra  
serpentium morsus bibuntur.

Fiber. CAP. XXII.

**F**iber ancipitis vitæ animal, plerunque cū pi-  
scibus & cancris ex aqua victum capeſcit.  
Huius testes serpētium venenis aduersantur, ster-  
nutamenta mouent, & in vniuersum varios obti-  
nent vsus: siquidem menses ac partus ciūt, dua-  
bus drachmis cū pulegio poti: partus secundasq;  
eijcunt: contra inflationes, tormina, singultus, ve-  
nena, & xiamq; ex aceto bibuntur. lethargicos, &  
vt cūque veterno obdormiscentes excitāt infusi:  
cū aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suf-  
fitu, idem faciunt: poti & illiti prosunt tremulis,  
conuulsionibus, & omnibus neruorum vitijs. In  
summa, calfactoriā vim habent. Eligi debent te-  
stes qui ex vno ortu cōnexi sunt (fieri enim nō po-  
test,



test, vt gemini folliculi in vna membrana cōiun-  
cti reperiātur) liquore intus veluti ceroso, odore  
gravi & virus redolente, gustu acri, mordēte, ac  
friabili, naturalibus tunicis circūdato. Quē frau-  
de aliqui corrumpunt, conijcientes in follē gum-  
mi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio  
subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod tra-  
ditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abijci, quum  
venatu vrgentur: siquidem tangi nequeunt, ita,  
vt in sue, substricti. Operæ autem pretium est, di-  
uisa pelle melleum liquorem cum euestiente tu-  
nicæ assumere, & siccatum potui dare.

Mustela vulgaris. CAP. XXIII.

**M**ustela, quæ in domibus nostris oberrat,  
ambusta exenteratur, et inueterata sale,  
in umbra siccatur. Ea binis drachmis cum vino  
pota, aduersus omnia serpentium venena presen-  
taneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, re-  
sistit. Eius ventriculus coriandro farctus inuete-  
ratúsque percussis à serpente, & comitialibus potu  
auxiliatur. Cremata in fictili podagricis cōfert,  
cinere ex aceto illito. Sanguine perunctæ strumæ,  
iuvantur: comitialibus etiam prodest.

Ranæ. CAP. XXIIII.

**C**ontra omnium serpentium venena pro an-  
tidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ  
edantur, inisque earū itidem sorbeatur: cōtra in-  
ueteratos tēdinum rigores pollent. Illitus earum  
cinis profluentis sanguinis impetus sistit: explen



dis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium ranarum cruor auulsos genis pilos renasci prohibet, in vestigia euulsoꝝ instillatus: decoctus in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

Silurus.

CAP. XXV.

**S**ilurus recens in cibo nutrit, & facilem præbet aluum: sale verò coctus, minimū suppe-  
ditat alimētum. Arteriam expurgat, et vocem expedit, Illita saliti caro, aculeos & infixā corpori spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in desidentium fetus adijciatur, fluxiones siquidem ad summa cutis elicit: ischiadicis infusa medetur.

Smarides.

CAP. XXVI.

**S**maridis piscis caput exustum, excrescētes ulcerum oras puluillōsque reprimat: nomas cohibet, thymos clauōsque absomit. Caro non secus atque salsamentum prodest à scorpione percussis, aut à cane demorsis.

Mænæ.

CAP. XXVII.

**M**ænarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet. Eius etiā garum oris putrilagines collutione sedat.

Gobius.

CAP. XXVIII.

**G**obius recens in suillum ventrē coniectus, si confuta rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo supersint, decoquatur, excolatus et sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine molestia deijce



deicitur. Illitus contra serpētiū canūmq; morsus auxilio est.

Thunnus.

CAP. XXIX.

**C**onditanei thunni caro, quam omotarichon vocant, sumpta ijs auxiliatur, quos vipera nomine prester momorderit: sed oportet vinum quam plurimū subinde cogantur haurire, ita vt vomitione reddatur. Cōtra acrimonias estiatorū maximē valet, canū morsibus vtilissimē illinitur

Garum.

CAP. XXX.

**G**arum omne, quod ex piscibus carnibúsq; sale maceratis liquamen est, si ex eo fatus fiat, depascentia vlcera sistit: morsis à cane medetur, dysentericis atque ischiadicis infunditur: nonnullis, vt exulcerata adurat: alijs autem, ad laceffenda, quæ vlcera non senserunt.

Ius piscium.

CAP. XXXI.

**R**ecentium pisciū ius, modò per se, modò ex vino potum, aluum subducit. Priuatim ad hunc vsū conficitur è phycidibus & scorpionibus, & iulide: è percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec virus resipientibus, simpliciter cum aqua, oleo & anetho.

Cimices lectularij.

CAP. XXXII.

**C**imices, qui in cubilibus enascūtur, canis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deuorētur, quartanis auxilio sunt: et citra fabas sumpti, percussis ab aspidē profunt: vulnarum exanimationes olfactu renocant: poti

cum



cū vino aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt: triti & vrinaria fistula impositi, vrinae angustias leuant.

Millepeda. CAP. XXXIII.

**M**illepede, quae sub aquario vase stabulatur, animalia sunt multis pedibus nientia, quae contacta manu contrahuntur in orbem: haec ex vino potae difficili vrinae, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis cū melle vtilissimum. Tritae, & in cortice mali punici factae, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Blatta pistrinaria. CAP. XXXIII.

**B**latta eius, quae in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cū oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Pulmones. CAP. XXXV.

**P**odagræ pernionesque emēdat pulmo marinus recēs, tritus & illitus, Suillus & agnus vrsinusque; pulmo impositu attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus verò si arefactus bibatur, suspiriosos adiuvat. Adeps quoque liquefactus infususque, auris dolorem finit.

Genitale cerui. CAP. XXXVI.

**G**enitale cerui tritum & in vino potū, à vipera demorsis auxiliatur.

Vngula asini. CAP. XXXVII.

**V**ngularum asini cinis per dies multos binis



nis cochlearibus potus prodiur comitiales adiu-  
uare, eadem oleo subacta strumas discutiunt: &  
illita pernionibus medentur. Caprinarum cinere  
peruncta ex aceto alopecie sanantur.

Lichenes equorum. CAP. XXXVIII. \* Κατ'

**L**ichenes sunt in equorum genibus, & \* su- ἐπιγνα-  
φῶ, non  
ἐπιγνα-  
φῶ.  
per ungulas in flexu harum partium indu-  
rati calli: qui triti & in aceto poti, comitialibus  
mederi traduntur.

Iocinera. CAP. XXXIX.

**A**Sini iecur inassatum esu comitialibus  
prodest, verū tamē ieiunis edendū preci-  
pitur. Capre verò inassati decidua sanie, inungi  
lutiosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos  
halitu eius vaporari: prodest in cibo tostū ad ea-  
dem. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales  
deprehendi. Aprinum recens si arefactum tera-  
tur, ex vino potum contra serpentīū volucrūmq;  
morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagita-  
tur, tostū & in cibo ab emorsis sumptū, ne ten-  
tentur metu aque tueri creditur. Utuntur autē  
ad arcendos aque pauores dente eo, qui caninus  
dicitur hunc à cane, qui momordit exēptum, &  
folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectūt.  
Inueteratum autē sale mergi iecur, ex hydrome-  
lite binis ligulis potum, secundas pellit.

Coria veteramentaria. CAP. XL.

**V**eteris corij cremati illitus cinis ambusta  
igni, intertrigines, necnon calceamentorū  
attri



attritus sanat.

Gallinæ. CAP. XLI.

**D**issectæ gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium morsibus auxiliantur: sed identidem aliis sufficere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morsus sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore ventriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus speciei similis (ea verò inter coquendum abijci solet) siccat, tritaq; in vino convenientissimè stomachicis datur in potu. Ius è vetere gallinaceo aluū deijcit. Abiectis itaque interaneis salem coniungi oportet, & cōsuto ventre decoqui in viginti sextarijs aquæ, donec ad treis heminas redigantur: totū id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquant olus marinum, mercurialem, cnicū, aut filiculā. Crudos humores crassosq; atram bilem, & strigmenta elicit prædest longis febribus, spirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.

Ouorum natura. CAP. XLII.

**O**uum molliculum plus alit sorbili, & durum plus molli. Luteum oui contra oculorum dolores vtile est: inassatum sedis inflammationibus prodest, cum croco, & rasacco: & comolyomatist: cum meliloto: cum vna autē fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet.

Candidum oui crudum refrigerat, spiramentum  
cutis



cutis occludit, inflammationes oculorū infusum lenit, ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt: faciem à Solis adustione tuetur, fronti impositum cum thure fluxiones arcet, auertitq; inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & vino, mitigat: vtiliter cōtra hæmorrhoidis serpentis morsus erudum scorbetur. Summè tepidum predest vesicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritie, reititionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.)

## Cicadæ. CAP. XLIII.

**C**icadæ quæ inassatæ manduntur, vesicæ doleribus prosunt.

## Locustæ. CAP. XLIIII.

**L**ocustæ oderis suffitu vrinæ difficultates adiuvant, præsertim quæ fæminis malè habet: earū carnes nullo sunt in vsu. Est & quoddam genus locustæ, quæ asiracos aut onos dicitur, sine pennis, prælongis cruribus. Exiccata autem si ex vino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abundè vescuntur Aphri, qui Leptin incolunt.

## Ossifragus. CAP. XLV.

**V**enter eius auis, quam Latini ossifragum appellat, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

## Galetita. CAP. XLVI.

**G**alerita auicula est parua, apicem in rextice.



tice, pavonis modo, gestans: quæ assa, & in cibo sumpta, celiacos adiuuat.

Hirundines. CAP. XLVII.

**D**issectis crescente luna pullis hirūdinis, qui primopartu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, vnum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terram attigerint, in iuuentæ corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sepe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti ficedule, in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam pullorum, quam matrum in fistili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, angine eo commodè perunguntur: vnde & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuant, qui angine morbo conflictantur.

Ebur. CAP. XLVIII.

**E**Boris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus. CAP. XLIX.

**S**vis talus comburitur, dum è nigro albe cat: qui tritus & potus inflationibus colli, longisque torminibus medetur.

Ceruinum cornu. CAP. L.

**C**eruini cornu cinis elotus, linis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, celiacis, regio morbo, & vesicæ doloribus



bus cum tragacantha : fœminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnum indito, vritur donec albescat: id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum, & defluxionibus salutare est: infictum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur. feruefactum in aceto, si eo gingivæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Eruca.

CAP. LI.

**E**RUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruneli, à venenatis bestiis feriri negantur.

Cantharides.

CAP. LII.

**E**FRUMENTIS congestæ cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec æstu exanimentur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in penis transuersas habent, promissoq; corpore crassæ ac blattarum modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucæ.

CAP.

LIII.

**S**IMILI modo reconduntur buprestes, generæ quedam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intosta, reponuntur. Vis omnium communis cro-



dere, vlcera, calorem elicere: qua de causa amiscentur medicamentis, quae lepras, ferāsque lichenes & carcinomata sanant. Menses ciunt pessis emollientibus addite. Aliqui cantharidas antidotis impositas, aqua subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quod urinam moveāt. Alij pennas pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.

Salamandra.

CAP. LIIII.

**S**alamandra lacertae genus est, iners, variū, quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfactoriam, exulcerantem. Additur, ut cantharis, in medicamenta, quorum vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite in melle seruatur ad eundem usum.

Araneus.

CAP. LV.

**A**raneus, quem holcum, alij lycon, id est, lupum vocāt, subactus cum splenio, & linteo illitus, prolatúsq; vtriusq; temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera, quae summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamq; telam orditur: quae in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

Lac



Lacerta.

CAP. LVI.

**L**acerta caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixæ extrahit: varos, formicantes verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocat, tollit. Iecur exesis dentibus coniectum dolores finit. Si diuulsa admoueatur, ictis à scorpione leuamentum præstat.

Seps.

CAP. LVII.

**S**eps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocant, in vino pota morsus suos sanat.

Scincus.

CAP. LVIII.

**S**cincus aut Aegypti, aut Indie, aut rubri maris alumnus, quâvis inueniatur in Lydia Mauritania. Est autem terrestris crocodilus, sui \* generis, sale inueteratus cū nasturtio. \* ἸΑΙΟΤΕ  
Aiunt carnes, quæ renes amplectatur, id sibi vi- vñs τ α-  
rium vendicasse, vt si drachmæ pondere bibatur, ex χυό-  
venerem accedant. Verum decocto lentis cū melle μινος ἐπ  
aut semine lactucæ cum aqua pota, veneris cupi- καρδία-  
ditates inhihentur. Additur in antidota. μαι.

Terreni vermes.

CAP. LIX.

**T**erreni vermes impositi, præcisos nervos glutinant, tertianas discutiunt: decocti cum anserino adipe, & infusi, affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus præstant auxilium: triti in potu ex passo urinam ciunt.

Mus araneus.

CAP. LX.

**M**us araneus dissectus, & impositus, sui



morsus veneficia luit.

Mures. CAP. LXI.

**M**Vres, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis utilissimè imponi, in confesso est: si inassatos infantes ederint, oris saluam exiccare promittunt.

Lac. CAP. LXII.

**L**Ac generatim omne boni succi est: corpus alit, aluum emollit, stomachum & intestina inflatione vexat: vernū tamen dilutius est: uo habetur, & è viridi pabulo aluū magis emollit. Probat autē candidum, equali crassitudine, quod vngui instillatū cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniā pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frōdibus, & terebintho magna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatissimū reddi solet. Ouillū autem dulce, crassum, & præpingue, non vsque ad eò utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, ventri magis idonea: sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scāmoniam, veratrum, clematidē, aut mercurialem pascūtur, lac omne ventrē & stomachum subuertit. quale in Iustinis mōtibus esse, à nobis proditū est. Siquidē capre, quibus candidum veratrū pabulo fuerit, primo feliorum partu euomunt: & eorū lac haustum nauseam creat, & stomachū in vomitiones effundit. Ventrem adstringit lac omne decoctū, præcipueq; candentibus calculis marinis exustū:



& in summa, omnibus auxiliatur internis exul-  
 cerationibus, praesertim faucium, pulmonis, intera-  
 neorum, vesicae, & renium: foris verò contra pruritum  
 cutis, eruptiones papularum, & vitiatos corporis  
 succos, recēs cum melle crudo, addito sale, datur  
 exigua aqua dilutū. Minus inflat quodcūq; se-  
 mel feruefactum. Decoctū cum calculis marinis  
 ad dimidias, vlcerosis vētris fluxiones adiuuat.  
 Lac quodcūq; serum cōtinet implicitum, quod  
 ubi discessit à lacte, multò potētissimum ad pur-  
 gationes redditur. Datur quibus sine acrimonia  
 volumus deiectionem moliri, vt melācholicis, co-  
 mitialibus, lepris, elephātis, & erūpentibus toto  
 corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistū,  
 id est scissile, appellant. Lac autē fictili nouo fer-  
 uet, ramōq; ficulneo recenti mouetur, insparsis,  
 postquam bis aut ter efferbuerit, totidem acetū  
 mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis: ita enim  
 serefcēs liquidū ab eo diuiditur, quod in caseum  
 concreuit. Sed cūm feruet, ne superfundatur, con-  
 ueniet spongia ex frigida continuò fictilis labrū  
 detergere, sextariūmq; argenteū frigida aquae  
 plenū demittere. Bibitur heminis per interualla  
 singulis, vsque ad quinas, ita vt intercedentibus  
 spatijs potātes ambulent. Lac autem recens ef-  
 ficax est contra resiones vstionesq;, ab exitiali-  
 bus medicamētis factas: vt à cantharidibus aut  
 salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyo-  
 scyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero. praeser-



tim bubulū ad id eximiē confert. Gargarizatur autem exulceratis faucibus, iōsillisq;. Asininum peculiariter collutos dentes gingivāsq; stabilīt. Fluxiones alui, si vlcera sentiantur, tenemōsq;, ouillum, bubulū, aut caprinū cum marinis lapillis decoctum, sistit: per se autē & cum hordeacea ptisana aut halicaceo cremore infusum magnopere intestinorū rosiones mitigat: exulcerata vulue immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maximē alit: mammis autē exuētū, prodest tibi, & stomachi rosionibus: contra haustum leporem marinū praesidio est: oculis cruore ex ictu suffasis cum thuris polline instillatur: podagricis vtile est, cum meconio, & cerato illitū. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & nervorum vitio laborātibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, vt ostēdimus, schistum praebet. Primi para canis lacte perunctos narrant glabrescere: potum contra venena antidoti vicem obtinet, abortus mortuos expellit.

## Caseus.

## CAP. LXIII.

**C**aseus recens sine sale sumptus alit, stomacho utilis est, & facile in membra delegatur: corpus auget, aluum modicē emollit: alius tamen alio praestantior, pro natura lactis, à quo cōficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde inassatus, aluum sistit: illitus, oculorum inflammationibus, & sugillatis prodest. Qui verò recens salit



salitus est, minus alimenti præbet: corpus aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium ventri interaneisq; exhibet: vetustiore sistitur aluus. Sero, quod à caseo manauit, quàm optimè canes aluntur. Quod hippacem vocât, caseus est equinus: ea virus redolet, magnopere alit, bubulôque proportionem respondet. Nec desunt, qui hippacem, equinum coagulum appellarint.

Butyrum & eius fuligo. CAP. LXIIII.

**E** Lacte pinguisimo probatū sit butyrū, quale ouillum est: sit & ex caprino, agitato in vasis lacte, donec pingue separetur. Butyrū natura oleosum est & emolliens: vnde largius epotum, ventrē resoluit: prodest, vbi oleum nō adfuerit, contra venena. Cum melle si infricetur, dentitiones adiuvat: gingivarum pruritus, & oris vlcera infantibus emēdat. Illitū foris: capaciora alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatētibus asserit. Contra inflammationes & duritias vuluæ, quod nec virus resipit, nec vetustatem sentit, butyrū efficax est: dysentericis, et coli exulcerationibus infunditur: in medicamēta addi solet, quæ pus mouēt: vtile præsertim cū nerui, aut cerebri mēbrane, vesicæ ceruicis, vulnera acceperit. Id autem purgat, replet, carnē creat, ab aspidē percussis vtilissimè imponitur. Recens obsonijs additum olei vicem pensat, & adipis vice fungitur in bellarijs. Colligēde ex eo fuliginis ratio hæc est. Butyrū in lacernā no-



uam ingestum accenditur, fictiliq; operculato quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo: abeat, crematur, & subinde aliud in assumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad vsus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exicare & adstringere: fluxiones cchibet, & vlcera celeriter ad cicatricem perducit.

Medicina lanarum. CAP. LXV.

**S**uccide lane molles, è collo feminibúsq; laudatissimæ habentur. Solueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut vino imbutæ: siquidè facile succos comlibunt qui us immerguntur, & ob pecudum sordem [ sic enim asypum vocant ] emolliunt: capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cum aceto & resaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis crustas obducit, excrecentias in carne cohibet, & vlcera ad cicatricem perducit. Munde autem & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, vruntur. Nec secus fimbriati marinarum purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo vrunt. Alij in fictili cris patuli, verucula inter se distantia componunt, & conceptas carminatásq; lanas oleo ita suffusas, vt ne stillare quidè possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permuta  
tim



rim interstratis, leuiter succendunt, & vstas tollunt: quod si è teda pix, pinguitudine vlla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus conficant, & considerare patiuntur: idq; sæpius, mutantes aquam, donec linguam adstringat, nec mordeat.

Oesypum.

CAP. LXVI.

**O**esypum vccant Græci, succidarum lanarum pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est: Succidæ molles, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in lal ellum cris ampli coniectis, aqua infunditur, magnóq; impetu ligula, vti respu- met, agitur, aut lignea rude validiusculi conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur, confidente pingui quæ supernatabat, collectóq; in altero fictili vase, denuò aqua in labellum fusa agitur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum æsypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcitia, confestim demitur: exclusaque sensim omni aqua, recetiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum lingue æsypum adstringat leuiter, nec mordeat, atq; pingue candidúmque spectetur: tum in fictili vase conditur. Verùm omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigi-



da aqua eluunt, & manibus, non secus atq; ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis & sordibus quibuscūq; exemptis, ac lento igne in aeneo vase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua, vt diximus, lauāt: colatūmq; in fictilem patellā, quæ calidam aquam contineat, luteo operiunt, atq; Soli mandant, donec calidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spatio aquam effundunt, noramq; adijciunt. Melius est leue, radícula non curatum, quod succidarū virus oleat, & si manu in concha fricetur cū aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut cōcreti habens: veluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet vlcera, & emollit: præsertim sedis ac vuluæ, cum meliloto & butyro: in vellere appositū, menses & partus euocat, vlcera non aurium modò sanat, sed & genitalium cū anserino adipe: cōtra crescos angulos oculorum, scabiososq; genas, quæ occalluerunt, & ciliorum defluuia, efficax est. In testā noua torretur, donec reductum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, vti demonstrauius: quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

## Coagulum.

CAP. LXVII.

**L**eporis coagulum tribus obolis ex vino, venenatorū morsibus, coeliacis, dysentericis, & fæminis fluxione vuluæ laborantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur. Sanguinē in gru

mos



mos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cum luto, præstat mulieribus vt concipiant: potum verò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui vocant, priuatim coeliacis dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capreæ laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubaliq; coagula similes naturas sortiuntur. contra aconiti potum in vino, & concretum lac in aceto, conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires representat: comitialibus, strangulatis vuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimētum est: aqua inspergitur, quæ paulisper cum alterius animantis, cum præcipue agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liquefit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nōdum natari possunt. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Adeps.

CAP. LXVIII.

**A**deps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale cōditus, ad vuluæ vitia proficit: sale inueteratus, & qui tēperis spatia acrimoniā concepit, vuluæ inimicus est. Recens exēptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quæ curare institueris. obstructo diligēter

ter



ter vase, flagrantissimo Soli exponitur: elique-  
 scens inde humor in fictile alterum excolatur,  
 donec adeps omnis absumatur, mox loco vehe-  
 menter frigido reconditur, et ad vsus digeritur.  
 Alij fictile fulciunt super aquam calidam, aut  
 tenuem & elanguidam prunam, quæ Solis vice  
 pŕset. Est & alia curandi ratio: Exemptis mem-  
 branis teritur, coniectusque in ollam eliquatur,  
 adiecto minuti salis momento: mox lineo colo-  
 transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta  
 additur, quæ lassitudines & fatigationes leuât.  
 Suillus adeps & vrsinus hoc curantur modo: Re-  
 cens, præpinguis, renibus potissimū detractus, in  
 largiore aqua celesti, & quàm frigidissima, exē-  
 ptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur,  
 & exprimendo fermè siccatur, subindēq; noua  
 aqua abluitur: ceterum fictili capacitatis duple  
 inditus, in aquam demergitur, & subditis leui-  
 bus prunis spatha mouetur: eliquatusque colo-  
 transfunditur in aquam: vbi verò refrixit, &  
 guttatim aquā omnē exclusit, in prælotum ficti-  
 le demittitur, et infusa aqua leniter eliquari de-  
 bet, & manu deprimi, quò facilius faculentū vi-  
 rus pessum eat: postea in pilam spongia madesa-  
 ctam transfunditur. Vli coire cœpit, residens in  
 imo sordes eximitur. Tertiò citra aquam eliqua-  
 tur, repurgatusq; fictili benè operculato, per quā  
 frigidis locis reponitur. Hircinū serum, ouillum,  
 ceruinūmq; ita curato: Elotum ex his quodcūq;  
 tunic



tunicis, (vt in suilli mentione dictum est) exemptis, pile emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam fictilem cōiūcito, & adiecta aqua, vt superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atq; in aquam colato: cūmq; refrixerit, iterū in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito. Tertiò sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilā colato, refrigeratūq; , vt in suilli ratioe diximus, recōdito. Bubulum autē seuū, renibus maxime detractum, exēptis mēbranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pile tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cū verò dissolutum fuerit, in fictilem ollam cōiūciendum, & marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluendum, decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis: excolatumq; , detractis quæ pessum ierāt sordibus, in nouo fictili reponendum: opertumq; Soli interdiu credendum, vt ad candorem reducatur, & odoris virus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquā exiguum salem insperferit, liquefacito: dein in nitente aquā excolato, & vbi concrefcere cœpit, manibus ite-

rum



rum conficando vehemēter lauato, aqua sepius infusa refusāq; donec quā optimē elotū videatur: rursus in olla cū pari modo vini odorati decoquito, & cū iterum efferbuerit, dempto ab igni vase, ibidem finito pernoctare: postridie si grauius adhuc oleat, noua olla repetitū, vino odorato perfundatur: eadem quæ prius fiant, dum omne virus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionū earū causa, quibus sal aduersari solet, sed ita paratū nō magnopere albescit. Eodem modo pardorum ac leonum pingua curari oportet. Taurinum autem et vitulinum pingue, necnon ceruinum, atque etiam huius animalis medulla, odoramētis imbuatur, hac ratione: Pingue, quod odoratum reddi debet, demptis, quæ diximus modo, membranis, elotum & vino quā odoratissimo, nulla maris aqua diluto, feruefactum, pernoctare finitur: alterū id genus vinum eadem mēsurā infunditur, colliquatur, et exquisiti colatur: nouēque eius heminis, iunci Arabici septē drachmæ adiciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri voles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & casie modis adduntur: & xylobalsami, assalathi singulæ drachmæ: cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ vnciæ: omnia exactius tunduntur, & affuso vino odorato, in vase aperto, quod supra carbonēs firmiter collocatum sit, ter efferuescunt, & semoto ab igne vase inibi pernoctant:



Etiam: poſtridie vinum effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur. Ter ſimili modo bene cōferueſcat. Deinde, matutinis exempto adipe vinū effundatur, & alluto vaſe, ſi quid imo ſul ſidēs haſit, detergatur. Poſtremo eliquatū pingue & excolatum, ad uſus reconditur. Hec autē modo odoramentis imbuitur, quod antea curatum eſt. Verūm antē dicta prius inſpiſſari ſolent, quō facilius ſibi odoramētorum vires adſciſcāt. Itaque aſſumens quodcūq; horū voles, cum vino ferueſcito, impoſitis vnā myrti ramulis, ſerpyllo, cype-ro, itē aſpalatho plenius tuſo. Aliqui tamen ad hūc uſum, vno duntaxat horū contēti ſunt. Cum autē ter efferbuit, exemptū leniter, & linteo colatū, aromatis, vti expoſitū eſt, imbuitur. Adipibus ſpiſſamēta ſic ſiunt (quēcunq; acceperis, oportet vt recens tundatur) Syncerus & ſanguinis expers adeps, reliquas habens notas, quas ſepe retulimus, in ollam nouā demittitur, inſuſo vino albo, vetere, odorato, quod ſemipedis altitudinem ſuperet: lento igni ferueſcat, dum vernaculus odor aboleatur, planēq; vinum redoleat. At vbi depoſito vaſe refrigit, dux adipis minæ in ollam mittuntur, & duo vini eiusdem ſextarij, & ſeminis loti, eius, inquā, cuius è ligno ludicra tilie faciuntur, tuſi minæ quatuor adijciuntur: lento igni ſul inde miſcendo decoquuntur: cūmq; odoris virus euauerit, excolatū ſque adeps refrixerit, vna contuſi aſpalathi minæ, cum amaracini flo



ni floris minis quatuor, et vetere vino subigitur. Nocte una hæc odorem rapiunt, combibunt ve. Postridie in fictilem ollam tricongialē ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus vini, una feruescunt, quousq; & vim & odorē spissamentorum adeps ipse contraxerit: qui eliquesces colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quàm pinguisima myrrhæ vino macerate, quod multos in annos asseruatū est, misceto. Gallinaceus anserinusq; sic odoribus imbuuntur: Cuiusvis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur: erysiceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, et calami planè contusi, singulorum fescuncia admiscetur: vini Lesbij veteris cyathus unus adijcitur: ea ter effervescent prunis, mox vase sublato ab igne, die noctūq; refrigerantur: postridie liquata per linteū crassum, mundum in vas excolantur. Vbi verò adeps coierit, cō. ha excipitur, fictiliq; nouo densius operto per frigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet: æstare siquidē pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrenicæ cere momentum adijciant, quod facilius in vnum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & vrsinus, ceteriq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verū sampsuchi odorē adeps ipse representabit hoc modo: Curati quàm optimè adipis, præsertim taurini, mina una, tēpestiniq; sampsuchi exquisitè cōfracti, sesquimina miscen



scetur, & inspersor largiore vino digeruntur in offas, que in vase cooperto nocte quiescunt: matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua, leuiter coquuntur: dumq; suum adeps odorem exuerit, defecatus ac bene opertus, nocte tota permanet: postero die deterfa sorde, que pessum ierat, sampsiuchi, vt dictum est, contusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogitur: alijs que diximus peractis, decoquitur & colatur: & si qua fundo hasit, spurcitia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut vitulinum, a putredine tueri velit, ita faciendum est. Quemuis adipem diligenter elothum & siccatum in umbra super cribrum, per lintea munda manibus vehementer exprimatur, linumq; consutum umbroso in loco suspendatur, & post multos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondatur. Pinguia autem indito melle vindicantur a putredinis vitio. Vis omnium est exalfacere, mollire, rarefacere. Taurinus adeps, tubulus, & vitulinus aliquantum adstringunt: earundem virium copos leoninus: nam resistere eum aiunt ijs, qui insidias moliuntur. Cernuino, elephantinoq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstringentior est caprinus: qua ex causa decoctus cum polenta, rhoem, & caseo, dysentericis datur, & cum ptisanæ succo infunditur. Ius decocti phthisicis in sorbitionibus prodest. Datur quoq; utiliter ijs qui catharidum venena hauserunt hircinus,



ut qui validissimè discutiatur: podagricis auxiliatur, cū fimo caprae & croco impositus: huic proportionē respondet ouillus. Suillus verò cōtra vulnē & sedis vitia idoneus est: ambustus igni medetur. Esue vetustissimus quisq; sole conditus excalscit, & emollit: elotus vino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corporis cōcolores reddere. Anserinus gallinae cūsq; cōueniunt mulieribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangoniā & andā faciam, & contra aurium dolores. Vrsinum constat raptos vitio alopeciae capillos restituere, pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluviale piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. Viperae adeps contra oculorum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari oleo vetere, pilos alis euulsos perunctis radicibus recens & per se illitus obliterat atque renasci non patitur.

## Medulla. CAP. LXIX.

**L**audatissima est ceruina, mox vitulina, post hanc taurina, deīn caprina, & ouilla. Colliguntur aestatis exitu, cū appetit autumnus: quippe cū alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & veluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, nā quā eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medullae molliuntur, calse



calfaciunt, rarefaciunt: vlcera explent, ceruina  
perunctos venenata fugiunt. Curantur recentes,  
adipis modo, aquæ respersu subactæ, selectisq; ossi-  
bus tantisper elotæ, & in linteum expresse, do-  
nec aqua syncera emanet: & deterfa sorde pēna,  
si qua innatet, liquatæ in duplicato, vase in pilā  
exprimuntur: & ubi coiere, omni fece, quæ ad ima  
sudit, derafa, fictili nouo reponuntur. Quod si libet  
incuratas reponere, facito omnia quæ de anseris  
& gallinarum adipe demonstrauimus.

Fel.

CAP. LXX.

**F**El omne curatur hoc modo: Recens prali-  
gato ore folliculi lino tādū dimissum in fer-  
uentem aquam, dum quis spatium triū stadiorū  
percurfaret, mox exēptum siccatur vmbroso lo-  
co, asperginem non redolente. Sed quod ad oculo-  
rum medicamenta adijci solet, ligatum lino in  
vitreum vas, quod mel habeat, immittitur: cir-  
cūuoluto ad os vasis lini principio, & operto va-  
se recorditur. Est enim vis omnium acris & ex-  
calfaciēs intensis tamē & remissis viribus diffe-  
runt: siquidem præstantius in effectu esse vide-  
tur fel marini scorpionis, & piscis qui calliony-  
mus appellatur, marine testudinis, hienæq; item  
perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris  
capræ: quod priuatim prodest contra suffusiones  
incipientes, & oculorum caligines, argemas, &  
genarū scabritias. Ouillo, siuillo, hircino, atq; vr-  
fino, taurinum multò efficacius. Felle omni perfa-



cile, præsertim infantibus, deiectione quis molietur, si intinctum eo tomentis aut fimbria sedis subiiciat: Priuatim taurino anginae cum melle perunguntur: sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usque perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte aut caprino instillatum, medetur: & sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insuevit vulnerarijs emplastris & circumlinationibus, quæ contra venenata parantur. Phagedænicis ulceribus, colis & scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quam optimè purgat. Ouillum & ursinum contra eadē pollent, verum inefficacius hæc præstāt. Ursinum eclemate comitiales adiuuat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest: naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosis sanantur. Hircinum idem obit munus, thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autem contra aurium ulcera, reliquaque omnia, magno usu assumitur.

Sanguis. CAP. LXXI.

**S**anguis anseris, anatis & hœdi, utilissimè in antidota miscentur. Palumbæ autem, turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosisque illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruore membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capre, cervi & leporis sanguis inassatus sartagine,



ne, dysenterias & caliacorum profluvia sistit: in vino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita vt tepet illitus, vitia cutis in facie, lē tiginēsq; emaculat. Caninus commodē ad his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradūt prodesse comitialibus. Marine autem testudinis cum vino & leporis coagulo cuminóque cōtra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritiis discutit, emollitque. Sanguis equarū, quæ admissuram expertæ sunt, in medicamēta additur, quæ erodunt, septica vocant. Sanguine chameleonis genarū palpebras euelli creditum est. Hoc enim viridium ranarum sanguine præstatur. Mēstruus sanguis fœminarum, circumlitus conceptum inhibere existimatur, aut si omnino mulier mēstrua supergrediatur: leuat podagræ dolores & ignem sacrum illitus.

Fimum.

CAP. LXXII.

**A**Rmentariæ bouis fimū, si recens admoveatur, vulnerum inflammationes mitigat: folijs autē inuoluitur, & calfactū cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus fotu compescit: illitum ex aceto duritias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod à masculo boue redditum est, procidentes vuluæ reprimuntur: accensi nidore culices abiguntur.



*Fimum caprarum, præsertim in montibus de-*  
*gentium, potum in vino, regium morbum emen-*  
*dat: menses cit cum odoramentis haustum, &*  
*partus euocat: tritum in farinam, & impositum*  
*lanis cum thure, fæminarum profluvia sistit, cæ-*  
*terosq; sanguinis impetus ex aceto cohibet: me-*  
*detur alopecijs exustum, & cum aceto aut oxy-*  
*melite illitum: cum axungia verò impositum, his,*  
*qui pcdagra tentantur, auxilio est. Caprillum*  
*in aceto decoctum imponitur serpentium morfi-*  
*bus, vlceribus quæ serpunt, igni sacro, & paro-*  
*tidibus. Utilem ischiadici vstionem hunc in mo-*  
*dum accipiunt: In eo interstitio vbi pollex bra-*  
*chiali committitur, caua veluti lacuna subsidet,*  
*in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde si-*  
*gillatim feruêtes stercoris caprini pilulæ imponû-*  
*tur, dum vapor per brachium ad coxâ sentiatur*  
*peruenire, & coxendicis dolorem mitigare: adu-*  
*stio id genus Arabica appellatur. Ouillum ex*  
*aceto illitum sanat epinyctidas, clauos, pensiles*  
*verruccas, thymos, & ambusta igni, rosaceo cera-*  
*to exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in*  
*aqua aut vino potum, reiectiones sanguinis sistit:*  
*vetustum lateris dolorem mulcet, adrupta & con-*  
*uulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato rosaceo*  
*medetur. Tam asinorum quàm equorum fimum*  
*sive crudum sive crematum, addito aceto, sangui-*  
*nis eruptiones cohibet. Armentarij, qui herba*  
*pascitur, siccum fimum liquatum in vino, mox*  
*potum,*



potum, contra scorpionū istus magnofere auxiliatur. Columbinum vehementius & excalfacit & vrit, cum lordeacea farina mistum strumas ex aceto discutit: carbūculos emarginat, tritum cum melle, lini semine & oleo: ambustis igni medetur. Gallinaceum verò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen contra venena fungorum, & coli cruciatus ex aceto aut vino libitur. Ciconie fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, ad opecijs medetur: cum thure & mulso calculos expellit: subdita infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum vino aut aqua potū, sistit aluum. Humanum stercus illitum, vulnera ab inflammatione vindicat, & oliter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat, sicco ex melle anginae perungi commodissimè traduntur. Terrestris crocodili fimum, crocodileam vocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, niterémq; seruat. Optima est candidissima & friabilis, amyli modo, minimè pōderosa, in humore statim eliquefcens: quæ cū teritur, fermenti acorem quadāmtenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt, ipsūmq; non dissimile vendūt. Alij amyllum aut cin. oliam miscent, & adscito anchusæ colore per rarū cribrum paula-



tim exprimunt, vt se contrahat in vermiculorū speciem: qui siccati pro crocodilea veneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus canē nūmq̃ gutturi impositum, anginis auxiliari.

Vrina. CAP. LXXIII.

**H**umanam vrinam suam cuiq; bibere, cōtra viperæ morsus, ac venena, incipientēmq̃ aquam inter cutē proderit: scorpionis, viperæ marinorum, draconisq̃ morsus ea cōuenientissimē fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est. pruritus & lepras nitro addito expurgat, sed vetus vlcera capitis manātia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit: nomas, & præcipuē genitalium, cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decoctāq; in calyce mali punici, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta vrina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in aëreo vase cum melle emēdat cicatrices, argema, caliginēsq̃, ex ea & cupro idoneum auri ferrumen cōficiūt. Quod in vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat: feruefactū cum ciprino, inditūmq̃, vulue dolores mulcet: strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prædita est: priuatim comminuit vesica calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subiit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, vrināmq̃ per aluū  
extrah



extrahit, aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renū vitij mederi. Lyncis urinam, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari coiréve in calculi duritiam, vulgò creditum est: quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quòd pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluòq; fluxione laboranti conuenit. Asininae urinae potu renum vitia sanari traduntur.

Mel. CAP. LXXIIII.

**P**Rincipem locum obtinet mel, quod Atticae regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hybleum. Magis probatur dulcius & acre, odoratus, subflauum, nec humectum, graue, & minime fluxum, quod obsequacem lentitiam non facile abrumpitur. tractumque resilit in digitos. Mellis probatio qualis.

Mel abstergendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida ulcera sinusque commodissimè infunditur. Decoctum atque impositum, abscedentem carnem glutinat, medetur impetigini coctum cum liquido alumine & illitum, item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lentes & fæda capitis animalia illitum necat, nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circumcisione aperta non est, si melle præputium à balineo triginta diebus emolietur: oculorum cali-



ginem discutit, faucibus, tussillis, anginae collu-  
tum gargarizatumve medetur: urinā ciet, au-  
xiliatur tussi, & à serpente percussis: cōtra hau-  
stum meconium, cum rosaceo calidū assumitur:  
aduersus venena fungorū, & rabiosi canis mor-  
sus linctum aut potum proficit: crudum tamen  
alū inflat, tussim laceffit, & ea de re despuma-  
ti vsus aptior est. Primatum tenet in mellis gene-  
re verum, dēinde aestiuum: hybernū verò, ut-  
pote quod crassius cōstet, deterrimū reputatur,

*Mel sar- ceraginis halitum expirat. Quod in Sardinia gi-*  
*doum a-* gnitur mel, amarum est: quoniā apes inibi absyn-  
*marum.* thio vescantur quo vitia culis in facie & macu-  
le aptissimè perunguntur. Heracliae in Ponto

quibusdā anni tēporibus, propria quorundā flo-  
rum dote, mel conflatur: quod qui edēre, mente  
ab alienantur, ac sudore diffluūt. Remedio sunt,  
esitata ruta, et salsamenta, aut epotum mulsum,  
resumpta, quoties vomitione reijciūtur. acre au-  
tem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod  
cum cōsto illitum, facinarum cutem emendat,  
& cum sale sugillationes rapit. Est & aliud cō-  
creti mellis genus, quod saccharon nominatur.

*Saccha-*  
*rum.*

In India verò, & felici Arabia in arundinibus  
inuenitur: salis modo coactum est, dētibus, ut sal,  
fragile, aluo idoneum, & stomacho vtile, si aqua  
dilutum bilatur: vexata vesicae renibúsque auxi-  
liatur, illitum ea discutit, quae tenebras oculorum  
pupillis offundunt.

*Cera,*



Cera. CAP. LXXV.

**C**Era optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, & halitum quadamtenus melleum referens, natione Pontica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radunt album syncerumque, atque transfundunt in vas, quod satis habeat marinæ ex alto petitiæ, infersoque nitri momēto, decoquunt: cumq; iterū tertiove inferbuit, separatum vas refrigerāt, ac ceræ pastillum eximūt, deterfa sorde, si qua fortē adhæsit: tum denuò indita noua maris aqua feruet: uti retulimus: & vase dempto ex igne, fundū ollulæ nucæ aqua frigida madefactū, in cerā summam suspensa manu intingunt, quò celerius cōcrescat, & quā minima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orliculo, iterū vasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiatur. Orliculi lino cōsuti, interuacāte spatio. suspēdūtur, & interdū, cōtinuò sub sole, noctu sub luna asperguntur, vsq; dū perfectè albescant. Verūm si eximius ille candor desideretur, eadem factitari, & identidē recoqui operapretiū est. Nec desunt, qui pro marina, in muria quā acerrima semel aut iterū excoquāt: dein laguncula tenui, rotūda, ansam habēte, extrahūt postea orbiculis, substrato affatim cespite herbofo, insolant, donec candorē summum contraxerint. Precipiūt hoc obeundum munus vere,  
cūm



cum sol remissa vehementia humorē pariat, ut  
nō facile liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, mo-  
dicè explet corpora: datur in sorbitione dysente-  
ricis, ac milij magnitudine decē grana cere hau-  
sta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

Propolis. CAP. LXXVI.

**P**ropolis eligi debet flava, odorata, styracem  
referens, in vehementi ariditate mollis, &  
mastiches more ductilis. Magnopere calfacit,  
& euocat: aculeos, & omnia infixā corpori ex-  
trahit, in vetere tussi suffita proficit, impetigines  
admota tollit: ea in alueariorum foribus, cerose  
naturæ inuenitur.

Triticum. CAP. LXXVII.

**O**ptima è tritici generibus ad secundæ vale-  
tudinis vsus habentur, quæ recentia, et iam  
perfectè adulta, colorem luteum referūt: dein se-  
quuntur trimestria, quæ nonnullis sitania nominā-  
tur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignūt,  
canum morsibus prosunt, mansa & imposita: con-  
fectus eorum similagine panis, plus alit, quàm ci-  
barius, è trimestriū farina panis leuiorē cibum  
præbet, & qui facile in mēbra demandetur. Fa-  
rina eorum cū hyoscyami succo illinitur aduer-  
sus nervorum fluxiones, quas Greci rheumatis-  
mos vocant. Itē cōtra interaneorum inflationes,  
lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autē in  
acri aceto decocti, turgētes mammas sedant: vi-  
perarum ictibus auxiliantur, & torminosis pro-  
sunt



sunt. Farinaceum fermentum calfaciēdi, extra-  
hendiq; vim habet. priuatim callos pedū, clauosq;  
extenuat, & cetera tubercula furunculōsq; ex sa-  
le concoquit, & aperit. Sitaniorum farina, cōtra  
venenatos iētus cum aceto aut vino cōmodissimē  
illinitur: eadē si decocta in glutini modum delin-  
gatur, cruentis excreationibus proderit: contra  
tussim, & exasperatas arterias, cum mentha &  
butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex a-  
qua mulsa, aut hydreleo decoquatur, omnem di-  
scutit inflammationem. Panis & crudus, & co-  
ctus cū aqua mulsa inflāmationes omneis illitu  
mulcet, cū emolliat, & quadāmtenus refrigeret:  
sed herbis succis ve huic rei accommodatis admi-  
sceatur. Vetus panis aridus, adiectis convenienti-  
bus, citam aluū cohibet. Recens muria macera-  
tus, illitu vetustas impetigines sanat. Glutinum  
ex similagine, & polline, quo chartæ glutinātur,  
sanguinem excreantibus prodest, si liquidus ac  
sepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

Hordeum. CAP. LXXVII.

**H**ordeum optimum est candidum purūmq;:  
id minus quā triticū alit. Ptisana tamē  
ob cremorem in decoctione redditū, plus alimenti  
præbet, quā polenta ex ordeo facta. Contra  
acrimonias atque gutturis scabritias, exulcera-  
tionēsq; pollet: quibus etiam triticea ptisana præ-  
sidio est: sed plus alit, magisq; vrinā mouet. Lac  
abundē suppeditat, si cum fœniculi semine deco-  
cta



Et sorbeatur. Hordeum absterget, urinam ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur, tumore concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsâ aqua cū fico, ut inflammationes collectionesque discutiât: duritias cum resina, & fimo columbarum concoquit: cum melioto autem, & papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intestinorum inflationes cum lini semine, fenogreci, & ruta, illini iuuat: strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut vino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: podagricis inflammationibus, cum cotoneis aut aceto prodest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor verò farinæ ex aqua, atque cum pice, & oleo decoctus, puri mouendo est: cum aceto subactus itidem, & cum pice, contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesque mitigat.

Zythum. CAP. LXXIX

**E**X hordeo potus fit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit, renes & nervos tentat, membranis, præsertim cerebrum vestientibus, officit: inflationem parit, vitiosum succum creat, elephantiasin gignit: perfusum Zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

Curmi. CAP. LXXX.

**F**it & ex hordeo potus, quæ curmi nominant,  
 eo q̃



eoque saepe potu pro vino vtuntur: verum dolorē capitis mouet, malum succū gignit, nervis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quæ occidentem spectat, & Britannia.

Zea seu fermen. CAP. LXXXI.

**Z**Ea duorum generum est: vna simplex, altera in geminis putaminibus grana lina iuncta gerit, ob id dicoccos appellatur. Plus quam hordeum alit, ori grata: digeritur in panificia, minus quam triticum alens.

Vulgā  
Spelta.

Craſsior farina. CAP. LXXXII.

**C**rimnon craſsior est ex Zea triticoque farina, ex qua pultem faciunt. Abundē alit, facile conficitur, aluum vehementius adstringit, si Zea, ex qua fit, prius torreadur,

Siligo. CAP. LXXXIII.

**E**Idem generi siligo adscribitur, sed minus aliquantū nutrit: in panes, vt Zea cogitur. Fit quoque è siligine craſsior farina, quam Greci crimnom vocitant.

Athera. CAP. LXXXIII.

**A**thera ex Zea fit tenuissimē molita: est autem sorbitio, quasi liquida pulticula, infantibus cōueniens, & cataplasmatibus efficax.

Tragos. CAP. LXXXV.

**T**Ragos quandam halice frugis figuram gerit: multo minus, quam Zea nutrit, quod multum aceris habeat: quare egrius conficitur, aluumq



aluūmq; magis emollit.

Auena. CAP. LXXXVI.

**A**Vena, genicula quēdā habet, folio & stipula triticum imitatur, & in cacumini-  
bus dependentes paruulas veluti locustarū bipedes  
gerit, in quibus semē cōtinetur, vtile ad catapla-  
smata, vti hordeum. Pulte huius aluus sistitur,  
prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza. CAP. LXXXVII.

**O**Ryza frugum generis est in plaustris ri-  
guisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum  
supprimit.

Halica. CAP. LXXXVIII.

**H**alica fit ex Zea, quam dicoccon appel-  
lauimus: plus alit, quā oryza: aluum  
magis cohibet, stomacho longē vtilior, decocta in  
aceto illitaque lepram tollit, vnguium scabritias  
extricat, incipientibus agilopys medetur. Deco-  
ctū dysentericis, quos excruciat dolor, infusum,  
idoneum est.

Milium. CAP. LXXXIX.

**M**ilium in panes coactū, minus ceteris fru-  
gibus alit, sistit pulte sua aluum, vrinā  
cit. Torretur milium, feruēsq; in sacco ponitur,  
vt torminibus, reliquisq; doloribus, si foveatur,  
auxilio sit.

Panicum. CAP. XC.

**P**Anicum, frumentaceis seminibus annume-  
ratur, milio simile, eodēque modo in panes  
subig



subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & nutrit, & stringit.

Sesama.

CAP. XCI.

**S**esama stomacho inutilis cibis, halitus grauitatem facit, quoties inter mādendum commissuris dentium inhaesit: neruorum crassitiem illitu discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerasæ morfib: capitis dolores, qui estuuatione cōcitātur, ex rosacea lenit: eadē efficit herba decocta in vino, praesertim inflammationibus oculorū dolorib; q; prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

Lolium.

CAP. XCII.

**L**olium, quod inter segetes nascitur, molitū, illitu nomas, putrescentia vlcera, gangrenasq; emarginat: sanat cum raphanis, sale & aceto feros lichenas, & ex aceto, & sulphure vino, lepras: strumas quoque discutit, cum fimo columbino, & lini semine decoctum in vino: rum-pit, quae egrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa, vtilissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

Amylum.

CAP. XCIII.

**A**mylum ex eo appellatum est, quod sine mola fiat. Optimū ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciūdi amyli haec est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, &, si fieri potest, nocte: cūm

¶



emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor utilis vnà excludatur, vbi mollissimū esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teri: tum demū enatantes ibi furfures incerniculo eximēdi, reliquūmq; quallo sportisq; siccātū tegulis novis cōfestim torreatur flagrantissimo in sole: nāq; si paulisper vñdum maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cana q; vlcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit, lacti atq; olsonijs admiscetur. Fit etiam amyllum ex Zea, quæ maeeratur, ac eluitur vno aut alio die, & subacta farine modo manibus subigitur: pressaq; feruētissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur: nullius in medicina vsus, ad alia tamen conueniens.

Fœnumgræcum. CAP. XCIII.

**F**œnigræci farina vim habet emolliēdi discutiendiq;: in aqua mulsā decocta aduersus tam internas, quàm externas inflammationes, efficaciter illinitur: lienē cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarū malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouētur, & insident. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manātia capitis vlcera purgat: locus dilatat, & emollit; si cū anserino adipe pessi vice subijciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tenesm



tenesmos, fixtidámq; dysentericorum proluuiem. Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos & genitalium cicatrices absterget.

Linum. CAP. XCV.

**L**inum vulgò notum est, cuius semē easdem, quas fœnumgracū, vires habet. Discutit, & emollit omnē intus forisq; inflammationem, cū melle, oleo, exiguaq; aqua decoctū, aut melle cocto exceptū: vitia cutis in facie varosq; crudis tollit, illitū cum nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiasq; discutit: vlcera, quæ serpunt, fauosque, cum vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis: vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substituat: tussim lenit, venerem stimulat: si farina piperis, & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum inter aneorum vuluaq; erosionibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vulua inflammationes in desessionibus perquam vtile.

Cicer. CAP. XCVI.

**C**icer satium aluo idoneum est, vrinā ciet, inflationem parit, colorem cōmendat, menses ac partus expellit, lac auget, cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testiu, verrucosas in formationes, ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginésq;: cōtra carcinomata, et vlcera, quæ cacoethe vccantur, cum melle et hor Cicer a-  
deo prodest. Alterum genus arietinum nomina. rietinu.



tur: vtrunque cit vrinas, dato cum rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Lædunt ea exulceratam vesicam, & renes. In verrucarū formicantium pensiliūmq; genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eāq; grana linteolo deligata abiici post se præcipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, folijs satiuo simile est, odore acri, sed semine discrepat: idem quod satium præstat.

Faba.

CAP. XCVII.

**F**aba inflationem excitat, agrè cōcoquitur, tumultuosa somnia facit, tussi confert, carnē gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias, & cæliacorum profluvia sistit: cōtra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior cōtrahitur, si aqua prior inter coquendum abiiciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per se, & cum polenta illitū, inflammationes, quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices cōcolores facit, targētes grumoso lacte mammas, etiā si inflammatione tentētur, adiuuat: lac restinguit, furunculos, sugillata, parotidasq; cum fenigraci farina & melle discutit: cum rosa autem, ihure & ouicandido, procidentes oculos, tumores, viasq; reprimat: subactum vino, suffusiones & ictus oculorū recreat. Māducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in

vino



vino testiu collectiones sanat: quò tardius pubes erumpat, pueris imò ventri illinitur: vitiliginem purgat. Fabarū cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilesunt, & minus alimenti capeffunt: cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas discutiunt: decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: nanque eas supprimit, si semisecta apprimatur.

Faba Aegyptia. CAP. XCVIII.

**A**egyptia faba, quā aliqui Ponticā vocant, in Aegypto\* plerunq; prouenit: in Asia etiam Ciliciæq; lacubus, inuenitur. Folia habet ampla\* etiam si ad arborum frondes comparentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine: florē roseū, dupla papaueris amplitudine: & ubi flore exiit, fert folliculos vesparum fauis similes, in quibus faba supra operculū, bullantis ampullæ modo, prominet. Ciborion aut Cibotion idē nomināt, id est arculam, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ mandata, & ita in aquā demissa. Radice firmatur harūidine crassiore, quæ cruda coctāve estur: ei colocasia nomen est. Faba virens mādatur, & exiccata nigrescit, vulgare māgnitudine superat. Adstringendi facultatē obtinet, & stomacho vtilē: dysentericis, cælicisq; prodest, in sparsa, polentæ vice, lomento: datur

\* πλ. εἰ-  
s & id  
est, plurē  
ma.  
\* Sic Plī  
ni. li. 21.  
cap. 15.  
Græcus  
habet, ὠς  
πέρτα-  
σος, id  
est instar  
galeri.



quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens.

CAP. XCIX.

**L**ens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, agrè coquitur, stomachum malè habet, eumque & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. Prestat in cibo, quæ facillimè coquitur, nihil atri in maceratione reddēs. Vim habet adstringendi: quæ ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primamque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit.) Somnia tumultuosa excitat, capiti, nervis, ac pulmone inutilis: melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis sorbisve, pyris Thebanis, aut malis coloncis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris: quæ post decoctionem abijciuntur, vel vuarum rhois, quæ obsoniis insparguntur: verum acetum cum eo diligenter percoqui debet, alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lētis delibrata denorari proderit: decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, ulcera purgat, decocta in aceto



aceto duritias & strumas discutit, cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisque, addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, que maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis que in gangrenam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, et his que serpunt, igni sacro, pernionibusque, ut antea dictum est: contra mamas, in quibus lac in grumos coit, & pre nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illata auxiliatur.

Phasioli.

CAP. C.

**P**hasioli inflant, spiritus cient, egrè coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

Eruum.

CAP. CI.

**E**Ruum parvus frutex omnibus cognitus, Officinarum angusto folio, tenuis, semina in valvulis hanc habens, è quibus farina fit, nomine eruina, ad medicibus, grædi vsus conueniens. Eruum capiti onerosum est, aluum cauescit, esu turbat, sanguinem per urinam extrahit, elixio latius uolubones saginatur. Parande farine ratio hæc est: catur. Vberiora grana candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua respergunt, donec sufficienter combibant: postea torrentur, usque dum hians cortex disrumpatur, molitaq; farinario cribro incernuntur, postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est, urinam cient, meliorem colorem efficit, sanguinem per vesicam aut aluum cum torminibus eli-



cit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera cum melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie, & maculas totumque corpus emendat: namas, gangrenas, duritiásque, serpere non patitur: mammarum duritiás emollit, atra vlcera, que theriomata vocant, fauósque emarginat, carbunculos rumpit: cū vino subacta illitu moribus viperarum, canum, hominúmq; medetur: vrine difficultates tenesmósque, ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum nō sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum, sumptumque, conuenit. Eius cremor per niones, et pruritus in toto corpore, sanat fouēdo.

Lupini.

CAP. CII.

**S**atius lupinus notus est: cuius farina cum melle delinctu, aut potu, ventris animalia expellit. Ipsi quoq; macerati, & cum sua amaritudine esiti, eadē efficiunt. Decoctum eorū idem munus prestat, cum ruta et pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem vlcera tetra, que theriomata vocant, gangrenas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, vlcera in capite manantia, vitiligines, maculasq; fouere vtilissimum. Menses, et partus extrahit, cū myrrha & melle subditū in vellere. Eorum farina cutē liuorésq; corrigit, inflammationes cum polenta & aqua mitigat, tubercula & coxendicum cruciatus ex aceto lenit, strumas in aceto cocta illitq; dissipat, carbunculos rumpit. Decocti celesti aqua, donec



donec in cremorem lentescant, faciem abster-  
gunt: medentur pecorum scabiei, cum radice  
nigri chamaeleontis, ita ut tepēte decocto abluan-  
tur. Cit urinam radix cum aqua cocta. Lupini  
triti, ubi macerati dulcescere cœperint, cum ace-  
to poti, fastidium detrahunt, & cibi avidita-  
tem faciunt. Gignuntur & sylvestres lupini,  
satiuis similes, sed omnino minores, qui eadem,  
que sativi possunt.

Rapum.

CAP. CIII.

**D**Ecocta rapi radix alit, inflationem parit,  
humorem ac fluxam carnem creat, vene-  
rem stimulat: decocto podagrae, pernionesq; fove-  
tur, contritusq; rapo atq; imposito iuuantur: si ex-  
cavatae radici rosaceum ceratum adigatur, &  
feruēti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus  
proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, et uri-  
nam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præser-  
tim quæ sensum doloris auferūt, anodina vocāt,  
idoneum est: potum contra venena salutare est,  
venerem concitat. Rapum muria conditum, mi-  
nus alimentisufficit: sed multò magis appeten-  
tiâ recreat. Sylvestre rapum in arvis nascitur,\*  
fruticosum in cubili altitudinē assurgens, ramo-  
sum, leue: in cacumine folia fert leuia, digitali  
latitudine, aut maiora: & fructū in siliquis caly-  
culatis: cūq; eorum invelucra aperiūtur, alia in-  
tus siliqua spectatur, quæ quādam capitis speciē  
præbet, in qua semina paruula cōcipiuntur, fo-

\* Vox  
ex Pli-  
nio adie-  
cta.



ris nigra, intus alba. Additur in medicamēta, quibus ad detergendam cutem in facie, totoque corpore, utimur: præsertim quæ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

Napus.

CAP. CIIII.

**C**Octa napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur, conditur sale radix.

Radix.

CAP. CV.

**R**Adix (quæ Grecis raphanus dicitur) ex calfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersatur, ructus ciet, urinam pellit, aluo aptior: summo tamen cibo sumi debet, quod magis eius distributionē adiuvet. quā autē præsumitur, cibum suspendit: quare vomituris commodissimè datur ante cibum. Sensuum acie excitat: decocta contra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet: hydropicis commodissimè illinitur, lienosis utilis, sugillata cum melle rapit, & nomas amolitur: contra viperarum ictus auxiliatur, alopecias ad pilum reducit, lentigines cū loliacea farina emendat, his qui fungis strangulantur, tam cibo quàm potu salutaris est. Semen vomitiones facit, urinā mouet, menses cit, lienē extenuat, cū aceto illitum gangrenas validissimè emarginat: coctum cum aceto mulso anginis perquā utiliter gargarizatur, cōtra cerastis morsus, potum ex vino, auxilio



lio est. Sylvestris raphani, quam Romani armo-  
raciā vocant, folia satiuo similia, sed magis lam-  
psanā imitantur: radix gracilis, \* tenera, suba-  
cris. Tam folium quā radix in oler. recipitur:  
sed hec excalfacit, vrinam concitat, estuosa est.

\* μαλα-  
κή, id est  
molis.

Siler.

CAP. CVI.

**S**iler vulgò cognitum, cuius radix decocta  
ori grata est, et stomacho utilis: vrinam ciet,  
& appetentiam inuitat.

Lapathum, siue rumex. CAP. CVII.

**E**X generibus rumicis, oxylapathum vocāt, Offici-  
quod in acutum tendit, dura habens extre- nis lapa-  
ma, in palustribus nascens. Alius est satiuus, illi tium.  
dissimilis. Tertium genus sylvestre, parū, plan-  
tagini proximum, humile & molle. Quartum est  
quod alij \* oxalida, alij anaxyrida, aut lapa- \* Ace-  
thon vocāt. Folia eius sylvestri ac exiguo rumici tosa.  
similia, caule non magno, semine subacuto, ru-  
bente, acri, in caule & agnatis appēdicibus, emi-  
cante. Omnium decocto oler. alius emollitur. Cru-  
di illitu, melicerides, rosaceo aut croco adiecto, di-  
scutiuntur. Sylvestris & oxylapathi, & eius, quā  
oxalida nomināt, semen ex aqua aut vino vti-  
liter bibitur, contra dysenterias, & celiacorum  
affectus, stomachi fastidia, scorpionū ictus. Quod  
si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu pa-  
tietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ crudæ, le-  
pras, impetigines, et scabrosos vngues persanāt:  
sed antea locus aceto & nitro in sole perfrican-  
dus



duſ eſt. Pruritus corporis, decoctum earū ſedat,  
ſi foveatur, aut in ſolijs balnearum conficitur.  
Coctæ in vino & inſtillatæ, aurium dentiūmq;  
dolorem mulcent, ſtrumas parotidāsque diſcu-  
tiunt, lienem cum aceto extenuant. Aliqui a-  
moliendis ſtrumis radicum geſtamine vtuntur,  
eas collo appendentes. Tritæ & admotæ fœmi-  
narum profluvia ſiſtunt: cum vino autem potæ  
regio morbo medentur, calculos veſicæ commi-  
nuunt, menſes cient, ſcorpionum iētibus auxi-  
liantur. Hippolapathon olus eſt magnum, in pa-  
ludibus naſcens: eaſdem habet vires, quas ſupra-  
dicta rumicis genera.

Lampſana.

CAP. CVIII.

**L** Ampſana ſylueſtre olus eſt: plus alit quā  
rumex, et ſtomacho vtilius. Cuius folia cau-  
lēsque coquuntur in cibo.

Blitum.

CAP. CIX.

**B** litum eſt ur oleris modo, alio vtile eſt, nul-  
lius in medicina vſus.

Malua.

CAP. CX.

**M** alua ſatīua, eſui longè aptior ſylueſtri:  
ſtomacho aduerſatur, aluum iuuat, ſed  
multò magis caules: interaneis & veſicæ vtilis.  
Cruda folia cū ſalis exiguo manducata, egyp-  
tas ex melle ſanāt: verū cū cicatricē trahere  
cœperint, ea demū citra ſalem vti dūm eſt. Con-  
tra aculeatos apium veſparisq; iētus illita effi-  
cax eſt: eadem cruda cum oleo trita peruncti, nō  
fer



feriuntur. Vlcera manātia in capite, fursurēsque cum vrina sanat. Sacris ignibus et ambustis decocta folia, tritaque, vtilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluæ in fessione mollit: prodest erosionibus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, sedisque, clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua, cōtra omnia venena auxiliatur, si cōtinuò à bibētibus reuomatur. Contra phalangiorū morsus remedio est, lac euocat. Semē in vino potū addito loti syluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.

Atriplex.

CAP. CXI.

**A** Triplicem aliqui chrysolachianon vocāt, cognitum olus est. Duo eius genera, syluestre & satiuum. Coctum estur, vt olus. Aliū mollit, panos discutit, siue crudum, siue coctum illinatur. Semē cum aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

Brassica.

CAP. CXII.

**B** Brassica satina aluo est idonea, si modò leuiter feruesacta edatur (nā percocta aluum sistit, sed multò magis his cocta, aut que in lixivio coquitur) stomachū autē malè habet: acrior est æstina. In Aegypto propter amaritudinē nō estur. Cacutientibus, & tremulis esse prodest: summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum vrinā validier. Ea cōdita stomacho inimica est, aluum conturbat. Crudus succus cum nitro et iri denoratus aluū emol-

lit:



lit: cum vino quoq; epotus viperarum moribus auxiliatur: cum fienigreci farina podagris & articulorum vitis illinitur: prodest & sordidis vlceribus & vetustis illitus: caput purgat nari- bus infusus: menses extrahit cum loliacea fari- na inditus. Folia per sese illita, aut cum polentæ trita, conferunt inflammationibus, tumoribusq;: epinyctidas, ignem sacrum, lepræq; sanant, car- bunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos reti- nent: cocta, addito melle, aduersus depascentia vlcera, gangrænasq; valent, lienosisq; ex aceto cruda profunt. Mansa, deuerato succo, retusam vocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post conceptionem in pessô subditus, partum abortu vitiât. Semen eius, præ- sertim que in Aegypto nascitur, potum tineas repellit: in antidota theriaca additur. faciei cu- tem lentiginēsq; expurgat. Virentes cauliculi cū radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

Brassica sylvestris. CAP. CXIII.

**S**ylvestris brassica, maritimis præruptisq; lo- cis, magna ex parte gignitur: satius simili- lis, sed candidior, hirsutiorq;, amara: cuius cy- ma in lixiua cocta, ori non insuavis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflammationes tumo- resque discutiunt.

ANNOTATIO.

Contendunt doctissimi quique eam esse  
herb.



herbam, quam vulgò Soldanam, aut Solda nellam vocitant: quæ certè aristolochiã rotundã, vt à Dioscoride hic depingitur brassica marina, folijs adamussim repræsentat. Quòd autem in descriptione prælonga quoque adijciatur, mendosum planè suspicamur, ac fortè pro *μακρὰ*, vt Græci codices habent, legendum *μικρὰ*, id est, parua: quod & ipsum Soldanæ nostræ pulchrè respondet. Quomodo enim folia brassicæ marinæ prælonga rectè dixeris, si aristolochiæ rotundæ folijs similia? quæ cùm ex eius descriptione, tum oculata fide non in longitudinem protensa, sed circinata ferè esse rotunditatis, sæpe comperimus. Suum tamen cuique in hac re esto iudicium.

Brassica marina. CAP. CXIIII.

**M**arina brassica à satina prorsus athorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, vt hedera, pediculo albo succo prædita est, sed paucò, salso gustu, & aliquantulum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris, vehementissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Beta.

CAP. CXV.

**B**eta duorū generū est, è quibus nigra coquitur cū lenticula, vt ventrē sistat: quod magis



\* Anti-  
qui hoc  
genus be-  
te, vt au-  
thor est  
Theo-  
phrast<sup>9</sup>,  
Siculum  
vocarūt  
quorum  
exemplo  
gis radice eius præstat<sup>r</sup>. \* Candida aluo utilis  
est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem,  
quem habet in se, noxi succi est. Vnde succus ea-  
rum, cum melle naribus inditus, caput purgat,  
aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radi-  
cis & foliorum, furfures lendēsq; deterget, per-  
niones fotu mitigat. Crudis folijs vitiliginēs, ni-  
tro antea perfrictas, alopeciarū inanitates, scal-  
pello prius exasperatas, atq; depascentia vlcera,  
illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sa-  
cro, ambustisq;, cocta medetur.

## Portulaca.

## CAP. CXVI.

extrita  
vna tan-  
tum lite-  
ra Sicla  
hodie di-  
citur.  
**P**ortulacæ vis adstringit: capitis doloribus,  
inflammationibus oculorum, cæterisq; cum  
polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro  
igne, vesicæ doloribus, auxilio est: cōmanducata  
dentium stupores sedat: stomachi & intestino-  
rum æstuationem, fluxionēsq; mulcet: renes &  
vesicā adiuuat, etiam si erosionē sentiāt: veneris  
impetus exoluit. succus epotus simili effectu pro-  
dest, in febribus valens. Contra teretes ventris ti-  
neas cruentā excreationem, dysenteria, hæmor-  
rhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax  
est. Item contra sepius morsus. Ocularibus medi-  
camentis utilissimè commiscetur, interaneis flu-  
xione laborantibus, atq; vuluarum erosionibus,  
infunditur: contra dolores, quos æstus excitauit,  
caput ex rosaceo & oleo fouetur: eruptiones pa-  
pularum in capite, cū vino emendat: vulneribus  
que



quæ ad syderationē spectant, ex polēta, illinitur.

Asparagi. CAP. CXVII.

**C**orruda, siue syluestris asparagus, vulgaris Offici-  
nis spa-  
ragus.  
est notitiæ. Huius cauliculi in cibo coeli  
ventrem emolliunt, vrinam cient. Radicis deco-

Etum contra vrinæ difficultatem, regium mor-  
bum, renum vitia, & coxendicum cruciatus, in  
potu proficit: cum vino autem, phalangiorū mor-  
sibus auxiliatur. Si decocti succus super dēte cō-  
tineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad  
eandem valet Canes, vt aiunt, si decoctum bibāt,  
emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodide-  
runt, arietis cornibus contusis, atq; defossis: quod,  
quantum equidē sentio, planē à veritate abhor-

\*In gre-  
co codice  
hæc ad  
tunda, grandi, spongium habente.  
ret.\* Altilis autem asparagus multis ramis fru-  
tica, folij fœniculi, longis, numerosis: radice ro-  
tunda, grandi, spongium habente. Huius teneri syluestrē  
cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedāt. quoque  
Assus autem coctusve, vrinæ stillicidiū, difficul-  
tatēq; ac dysenterias, mitigat. Radix cū vino gum re-  
aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta ferūtur,  
cum ficis aut ciceribus sumpta, regium morbū sa-  
nat: coxendicis cruciatus stranguriāq; leuat. tilis men-  
Alligata radix, aut haustulum eius decoctum, cō-  
tio.

ceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Marcel

Plantago. CAP. CXVIII.

lo autē

**D**vo plantaginis genera: minor folia habet videtur  
angustiora, minora, molliora, leuiora, & adulteri  
tenuiora: cauliculo anguloso in terram inclinato: na-



floribus pallidis: semine summis caulibus emicāte. Altera maior, letior, virētiórq; , latis cōstans

\* Oleris folijs, \* cleracei generis: cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, subruber, à medio ad vērper anto tice tenui semine circumdatus: radicibus nititur nomasiā teneris, hirsutis, cādidis, digitum crassitudine e- Brassicā quātibz. Nasctur in lacunosis, sepibus, & locis intellige humidis. Multò vtilior magna est. Vim habēt fo

Nec e lia exiccatoriam, constringentem: quare omnibus nim sim malignis vlceribus, & fluxioni opportunis atq; pliciter elephantinis, sordidisq; illita presunt: profluuia ad queli sanguinis, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbet ole- bunculos, nomasq; cohibent: vetera vlcera & in- ra, quo- equalia cicatrice obducūt, chironia sanant, sinus rū diuer cōglutinant: morsibus canis, ambustis igni, inflāsa admo matienibus, panis, parotidibz, strumis, egyplopijs, dum fa- illita cum sale presunt. Coctum cū aceto & sale cies, fo- olus, dysentericis, coliacisq; sumptum subuenit. lia plan Datur & in locum heta cum lenticula coctum- taginis Et ad aquam inter cutem, cui leucophlegmatia referri nomē est, datur & herba decocta post aridus epu possunt. las, sic vt media antecedit: comitialibus & sū-

spiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta sut inde oris vlcera, purgat: cum cimelia aut cerusa ignisacro medetur: fistulis infusus predest, lipitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoq; in oculorum collyria. Gingiuis cruce suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu cōfert: clystere dysentericis infunditur,



contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vulue in vellere subicitur, etiã si vulua fluxione laboret. Semẽ ex vino potũ, alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & māducatu, & collutione, dentiũ dolores sedat: eadem cum folijs, vlceribus renum & vesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum trilus vini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radices gestamine, scutiendis strumis vtantur.

Lauer seu Sium.

CAP. CXIX.

Offici-

**S**Ion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, nis Be-  
 folijs latis, olusatrosimilibus, sed minoribus, rula.  
 & odoratis. Que cruda coctaque esu, calculos rumpunt, atq; excernunt: vrinas ciẽt, menses & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliatur. De sio Crateuas tradit, herbã esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quàm mēthe, nigra, & ad erucam accedentia.

Sisymbrium.

CAP. CXX.

Offici-

**S**isymbrium (alijs serpyllũ sylvestre vocant) in nis Bal-  
 solo inculto nascitur, menthe hortensis simi- samita.  
 litudine, odoratius, latiore folio. Inseritur coronis. Calfaciẽdi vim habet: cõtra stillicidia vrine, calculosque, semẽ ex vino bibitur: tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut Vulgo  
 temporibus illinuntur: idem contra vesparum a- nastur-  
 piũmque ictus. Vomitiones potu cohibet. Alte- tiũ aqua  
 rum sisymbrij genus, quod aliqui cardaminam, ticum.



alijs sion appellat. Et herba riguis gaudet, & eis-  
dē in locis, quibus sion, prouenit: quæ idē nōnul-  
lis cardamina nominatur, quod gustu cardamū,  
id est nasturtium, representet. Folia primūm ro-  
tunda prodeunt, adulta eruce modo finduntur.  
Id excalfacit, urinas mouet, crudum estur, pur-  
gat lentigines: cutisq; vitia in facie, noctibus im-  
positum, matutinisq; detractum.

## Crithmum. CAP. CXXI.

**C** Rithmum, seu potius, vt aliqui, crithamon,  
fruticosa & vndique foliosa herbula est, cu-  
biti altitudinem ferē petens. Nascitur in mariti-  
nis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albi-  
cantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longio-  
ribus, salso gustu, flores candidi sunt, & semē, ce-  
roris marini, odoratum, molle, rotundū, quod sicca-  
tum rumpitur: habet intus tritici modo nucleū:  
radices digiticraſitudine, tres aut quatuor, gra-  
te odoris & iucūdi. Radix, semē, & folia in cocta  
vino, potu vrine difficultati & regio morbo au-  
Fuchſio xiliatur: menses cient, estur crudum coctūm ve  
Cornu in olere, ſeruatur etiam in muri.

## Coronopus. CAP. CXXII.

**C** Oronopus oblonga herbula est, per terram  
vulgò di-  
ctum. \*repens, ſiſſis folijs: coquitur in olere: radicē  
\*ἰσχυμῆς habet tenuem, adstringentem, quæ in cilo cælia-  
vop. id est cis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incul-  
strata. tis, & ſecus vias.

Sorrh



Sonchus.

CAP. CXXIII.

**S**onchi duo genera: syluestrior quidā est, & magis spinis horret: \* alter teneritate quadā mellefcit, cibus expetitus, anguloso caule\*, inani, interdū rubente: folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtriusq; vis refrigerat, modicē adstringit: vnde aestuanti stomacho & inflammationibus illiti profunt. Succus eorum stomachi rosiones sorbitione mitigat, lac elicit, in vellere appositus sedis ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba quā radix illita vibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs: caulem in ramos exeuntem folia distinguunt, sed ad eadem pollet.

\* Vulgò  
rostrum  
pocinū.

\* Vox  
ex Pli-  
nio repo-  
sita.

## ANNOTATIO.

Non video, quanuis & Græcus codex sic habeat, quomodo Seris satiua hortensi, quod planè est idem, stomacho vtilior dicatur: vt subesse errorem non parum suspicemur. Marcellus, qui aut integriore vsus fuit exemplari, aut locum, quem & ipse corruptum iudicabat, restituere conatus est, sic vertit: Latoribus foliis altera, satiua & in cibus gratior.

Seris siue intybus. CAP. CXXIIII.

**S**eris duūm generū est: altera syluestris, quæ picris et cichorion vocatur: \* altera satiua, latoribus folijs constat, stomacho quā hortensis vtilior. Quæ iterum in duas species digeritur:

\* Offici-  
nis sca-  
riola.



una folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, et gustu amara. Viraq; refrigerat, & adstringit, stomacho vtilissima: aluum sistit cocta si cum aceto adsumatur. Syluestres stomacho meliores: quandoquidem aestuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis, per se, aut cum polenta, vtiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à Icorpione subuenit, igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerusa, & aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

Chondrilla. CAP. CXXV.

**C**hondrilla, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia: qua ex causa nonnulli syluestris intubi specie esse pronuntiarunt, verum tenuior tota est in cuius ramulis, gummi mastiches simillimum\* tuberculo fabæ inueniri solet: quod cum myrræ\* rux- rha tritum, & luteo appesum, in tar oliuæ, fœlix id minarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui nitroguitudi- admisti vitiliginem emaculât. Gummi inordinatos pilos replicat: quod in tenera radix efficit, si intincta succo acus, plus admoneatur. Contra vi peras in vino pota proficit. Succus decoctus, in vino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur chondrille genus, folium ferens, oblongum, circumrosum, humi sparsum, caulem succo madentem lacteo:



*Eleo: radice tenui, rotūda, leui, vegeta, flauescen-  
te, succosa. Cuius & caulis, & folia concoquendi  
vim habent. Succus incōmodos palpebrarum pi-  
los reflecti. Nascitur in latis, & culis.*

## Cucurbita. CAP. CXXVI.

**C**ucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumo-  
res, & abscessus mitigat. Ramenta eius in  
fantibus contra capitis ardorem, quā syriasim vo-  
cant, in sincipite illinūtur: oculorum inflamma-  
tiones podagrāsque refrigerant. Succus è ramentis  
tusis per se, aut cū resaceo infusus, auris dolori-  
bus auxiliatur: aduersiones cutis in ardenti febre  
illitu adiuuat: totius feruefactæ, & expressæ suc-  
cus, cum melle exiguo, & nitro potus, aluū leni-  
ter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem ex-  
cauatam infusum, si mistus sub diu teneatur,  
potu aluum leuigabit.

## Cucumer satiuus. CAP. CXXVII.

**S**atiuus cucumis aluo & stomacho perquam  
utilis habetur: refrigerat, corruptionem non  
sentit, vesicæ prodest, olfactu reuocat, quos ani-  
mus liquerit. Semen modicè vrinam mouet: cum  
lacte aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit.  
Illita cum vino folia, morsus canū sanant. & epi-  
nyctidis, cum melle. Peponis caro in cibis, vri-  
nam cit: inflammationes oculorum illita sedat.  
Ramenta eius contra aduersionem infantiū, quā  
syriasim vocant, sincipiti imponuntur: fronti ad-  
mota, oculorum fluxiones auertunt. Succus cum



semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgat, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, drachmæ pōdcre, vomitionē mouet. Si quisquā moderatè secundum cœnā vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illita cum melle vlcera concreta in modū faui, quæ ceria vocant.

Lactucæ. CAP. CXXVIII.

**L**actuce sativæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habetur: somnū conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: verū decoctæ magis alunt: stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, compescit, & veneri refragatur. Ipse verò frequentiores in cibo, claritati oculorum officium: inflammationibus, & ignibus sacris opitulantur, muria condiuntur. Cū in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur, succo aut lacti sylvestris lactucæ similem.

Lactuca sylvestris. CAP. CXXIX.

**S**ylvestris lactuca sativæ similis est, sed longior caulis & candidiora folia, graciliora, & asperiora: amaro gustu est, & viribus aliquantum papaveri similis: vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluū elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema caliginēq; repurgat, contra adustiones efficaciter illinitur, cū lacte mulierū. In summa, somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses



ses trahit, contra scorpionū, & phalangiorum ictus bibitur. Semen, nō aliter, quā satinae, libi dinū imaginationes in somno amolitur, ac vene rē arcet. Succus ad eadē valet, sed viribus infir mior. Reponitur in fictili novo lac eius, antea, vt in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

Gingidium. CAP. CXXX.

**G**ingidium, aliqui lepidion, in Syria, & Cili cia\* plerunque nascitur: herbula syluestri pastinace similis, tenuior, & \* amarior: radice parua, candicante, subamara. Oulus hoc crudum, coctum, conditūmve estur magna stomachi vti litate: vrinam cit. Decoctum ex vino potum ve sicæ prodest.

Nostrū  
Cerefo-  
lium.  
\* πλῆ-  
σος id  
est, plur-  
imum.

Scandix. CAP. CXXXI.

**S**cādix, sylvestre olus est, amarum, subacre: quod crudum coctūmve manditur, stoma- cho & ventri vtile. Decoctum in potu, vesicæ, renibus, & iocineri confert.

\* πικρό-  
τερος,  
non πύ-  
κνός τερος  
Scādix,

Caucalis. CAP. CXXXII.

**C**aucalis, quā alijs sylvestre daucum vocāt, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhir- thro, a- suto: folijs apio similibus, feniculi modo per extre greste o- ma multifidis, hispidis que: candida in cacumine lus est, vmbella, suauiter olente. Crudum, coctūmve ole- gingidii rum modo estur: vrinam mouet.

Aëtio li  
br. I. au-  
thore, a-  
greste o-  
lus est,  
gingidii  
simile, a-

Eruca. CAP. CXXXIII.

**C**Ruda eruca venerem largiore cibo cōcitāt. subama Semen eodem effectu prodest: vrinam cit, rum.

cre &  
rum.



concoctioni prodest, aluo perquam commodata. Semine ad condimenta vtuntur: quod, vti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Ginitur etiamnum syluestris eruca, maxime in Iberia, quæ occidentem spectat: cuius semine pro sinapi incole vtuntur. Vrinam vehementius pellit, multo satius acrior.

## Ocimum. CAP. CXXXIII.

Officinis Basilicon. **O**cimum vulgo cognitum. Id copiosius cibo oculorum aciem hebetat, aluum mollit, spiritum mouet, urinam pellit, lac euocat: ægrè tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit, destillationes exiccet. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili vrine, inflatisque maribus haustum, subinde mouet sternutamenta: quod idem herba efficit, sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem mädacatum, & in sole positum, vermiculos erat. Aphri autem adiciunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

## Orobanche. CAP. CXXXV.

**O**robanche cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum verg



vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccet: ut caulis, fistulosa. Hęc inter quedam legumina nasci constat, & ea strangulare: unde crobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

Barbula hirci. CAP. CXXXVI.

**B**arbula hirci, quę ab alijs come vocatur, breui est caule, folijs croci, radice longa, dulci, supina, magno super caulem calyce, ę cuius summo semen nigrum dependet, unde nomē inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum. CAP. CXXXVII.

**O**rnithogalū cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mellitis agnatis: a quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum liantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectū cachryos modo, capitulū emicat. Coquitur cum pane, vt melanthiū. Radix bulbosa, cruda et cocta mādatur.

Tubera. CAP. CXXXVIII.

**T**ubera rotundę radices sunt, sine caule, sine folijs flauescetes: vere fodiuntur, cruda et cocta eduntur.

Smilax hortensis. CAP. CXXXIX.

**H**ortensis smilax, frutex, cuius semē a nonnullis lobia vocatur: folia habet hedere, melliora tamē: tenues caules, et capreolos, vicinis  
frut



\* Græcè *fruticibus circumuolutos: qui tantum a dolescunt:*  
 est *in me* ut topiarias scenas representare videantur: sili-  
 p<sup>85</sup> *de* quas fœnigræci profert longiores et torosiores, in  
*πορυ* quibus semina renum similia, sed inequali colore  
*σιζογλα*, recluduntur, \* quæ quadã ex parte fuluescunt.  
 quod re *Siliqua cocta, cum semine in oleribus, asparagi*  
 & ius for *modo, estur. Urinam ciet, & tumultuosa somnia*  
 fitan red *facit.*  
 dideris: *facit.*

quæ ma

Medica.

CAP. CXL.

gna ta-

men ex

parte ful

uescunt ut

intelliga

mus fmi

laca hæc

diuersi

quidẽ co

loris se-

mina ma

gna ta-

men ex

parte ful

uescuntia

procrea-

re. Est

quã rura

Viciã syl

uestrem

vocitãt.

**M**edica, cum recēter prodit, folijs & cau-  
 le trifolio pratensi similis est: procedens  
 verò folia contrahit, caules edens trifolij, & sili-  
 quas corniculorum modo intortas, in quibus se-  
 men lentis magnitudine dependet. Id siccatum,  
 iucundi soporis gratia, conditaneo sali admisce-  
 tur. Viride, quibus refrigeratione opus est, illitu  
 suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur,  
 qui pecora allunt.

Aphaca.

CAP. CXLI.

gna ta-

men ex

parte ful

uescuntia

procrea-

re. Est

quã rura

Viciã syl

uestrem

vocitãt.

**A**phaca in aruis nascitur, altior lēte, te-  
 nuibus folijs: siliquis lenticula maiores  
 fert, in quibus terna quaternãve semina nigra,  
 lēte minora, cōtinētur: quæ adstringēdi vim ha-  
 bent: quare torrefacta, stomachi aluiq; fluxio-  
 nes sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

Porrum capitatum.

CAP. CXLII.

**C**apitatum porrum inflationem facit, no-  
 xium succum creat: tumultuosum somnum  
 parit, urinam ciet: aluo accommodatur, extenuat,  
 oculo



oculorum aciem lebetat, menses pellit: sed ledit  
 exulceratam vesicam, renésque: cū ptisana verò  
 coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in  
 aqua maris, & aceto cocta, in desensionibus, ad  
 præclusiones vuluæ, & duritias, utilis habetur.  
 Porrum bis aqua mutata coctū, tum frigida ma-  
 ceratū, dulcescit, & multò minus inflat. Semen  
 acrius est, & quādam adstrictoriam vim habet  
 quare succus cū aceto, addito thure aut māna,  
 sanguinis profluvia sistit, maximè si naribus erū-  
 pat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis vi-  
 tiat tabemq; pro delinctu efficax est: arteriā esu  
 purgat, sed si assidue estur, visus obscuritatē in-  
 ducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle po-  
 tus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio  
 est: ipsum quoque cū aceto aut thuris polline, la-  
 cte aut rosaceo, utiliter aurium doloribus, & so-  
 nitui instillatur. Varos tollūt filia illita cum vua-  
 rhois, qua ad obsonia vtuntur: epinyctidi meden-  
 tur: crustus ex sale illita rumpūt, veteres sangui-  
 nis reiectiones cohibēt, si binis drachmis & aqua  
 li haccarum myrti pōdere bibētur. Ampelopra-  
 sum stomacho magis aduersatur, & plus porro  
 excalfacit: vrinam & menses vehementius ciet.  
 Id contra serpentium morsus esse conuenit.

Cæpa. CAP. CXLIII.

Cæpa longa acrior est, quā rotunda, item  
 flaua quā candida, & sicca, quā viridis,  
 & cruda quā cocta, aut sale cōdita. Omnes ta-  
 men



men mordent, flatus gignunt, appetentiam inui-  
 tant, sitim mouent, & extenuant: fastidiū pa-  
 riunt, & expurgant: aluo vtilis sunt. Ea detra-  
 ctis purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoi-  
 das, reliquosq; excretionū exitus reserant, sub-  
 ditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculo-  
 rum hebetudinibus, argemīs, nubeculis, & inci-  
 pientibus suffusionibus auxiliatur: angina eodē  
 perunguntur: suppressos menses pellit, caput pur-  
 gat naribus infusus: canis morsibus cū aceto, ru-  
 ta, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas  
 in Sole, vitilignes sanat: & cū pari spondio, sca-  
 bras lippitudines sedat: varos eum sale reprimat:  
 contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo  
 adipe vtilis est: cite aluo prodest: in auribus soni-  
 tum, ac gravitatem emendat: ad purulentas au-  
 reis, & eliciendum e. arundē aquam, valet: alope-  
 ciae earum succo perfricantur, qui celerius, quā  
 alcyonium pilos euocat: largiore cibo capæ capitis  
 dolores ciet, coctāq; vehementius vrinam pellit:  
 eos lethargicos efficit, qui valetudinibus aduer-  
 sis, ea etiā cocta, plus equo vescantur: elixa, & cū  
 passis vuis, & fico illita, tubercula concoquit, &  
 celerrimè rumpit.

Allium. CAP. CXLIIII.

**A**llium quoddā satrium atq; hortense ha-  
 betur, quod in Aegypto, singulari, vt  
 porrū, capite cōstat, dulce, in purpureū vergens,  
 parū: reliqua verò magna, & candida, ex plu-  
 ribus



rilus coagmentantur nucleis, quos aglitus, id est  
 spicas, Græci nominant. Aliud est sylvestre, quod  
 Ophioscorodon, id est anguinum, vocant. Vis allij  
 acris est: excalfacit, mordet, excernit, aluum tur-  
 bat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gi-  
 gnit, flatū permouet, summā corporis cutē exul-  
 cerat, aciam oculorum esu lebetat. Eosdem effe-  
 ctus præbet anguinum, quod & elaphoscorodō di-  
 citur: latus ventris tinea in cibo sumptū abigit,  
vrinas detrahit: contra viperarum ictus, & pri-  
 uatim hæmorrhæi, prodest, ita ut nō aliud magis,  
 si cum vino iugiter assumatur, aut tritum in eo-  
 dem ebibatur: contra rabiosorum morsus & illi-  
 tu, & cibo valet. Magnæ & allio vtilitates con-  
 tra aquarū mutationes: vocē clarificat, veterem  
 tussim crudum coctūmve lenit: potum autē cum  
 origani decocto, pediculos, & lentes enecat: cre-  
 mati cinis illitus sugillationibus cū melle, & alo-  
 pecijs cū nardino vngvine, medetur: eruptiones  
 papularum cum oleo & sale sanat: vitiligines,  
 lichenas, lentigines, vlcera capitis manantia, le-  
 pras, & fursures, cum melle eximit: cum ihure,  
 & teda decoctum, dētium dolorem leuat, si in ore  
 continueatur: cōtra venenatos muris aranei mor-  
 sus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur.  
 Feruefacta comæius, feminarum desensionibus  
 additum, menses & secundos partus extrahit.  
 Allium eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo,  
 & nigra olina intritum, quod myttoton vocant,

esit



esu cit vrinam, ora venarū patefacit, hydropicis  
vtilē. Scorodoprasum magnitudine porri equat,  
qualitatum porri, & allij particeps: vnde pro-  
miscuas sibi vires ex utroque vendicauit, esse  
et us allij, & porri prębens: inefficacius tamen.  
Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum vi-  
cem transit.

Sinapi. CAP. CXLV.

**S**Inapi hortense, aliqui napi vocāt. Eligi de-  
bet adultū, valde rufum, nō magnopere sic-  
cū, sed quod fractum internē virescat, & veluti  
quodam succo madeat, cęsum colore: siquidem  
recens id genus, tempestiuū habetur. Ad calfa-  
ciendum, extenuandum, extrahendum, efficax  
est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur:  
contra præduros tonsillarum tumores, ac veterē  
callosāq; arterie scabritiē, succus ex aqua, &  
melle, conuenienter gargariatur: sternutamen-  
ta ciet, tritū & naribus admotum: comitialibus  
quoq; auxiliatur. Fæmin. u. vuluę strangulatu  
oppressis excitat: lethargicis, deraſo capite, illini-  
tur cum ficis admistum, donec rubescat locus, &  
ad coxendicum cruciatus impositum, \* ad lienes  
& omne genus dolores cōfert, cū permutandę  
valetudinis causa, ex alio vitia extrahēda sunt.  
Alopecūis illitū medetur, faciem purgat, singilla-  
ta cū melle, adipe, aut cerato rapit. Fere impeti-  
gines & leprę, eo cum aceto perunguntur: con-  
tra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui,

pol

\* 1193  
σ π λ ν υ α ς  
Θ ι κ α θ ο -  
λ ο υ υ ι ς  
π α ρ ρ ο -  
υ ι ο ρ α λ -  
γ ι μ x.



polente modo, inspargitur: extrahentibus em-  
plastris, scabiémq; extenuantibus, vtiliter ad-  
misceri solet: tritum, grauitati aurium & soni-  
tui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebe-  
tudines oculorum et genarum scabritias magna  
vtilitate illinitur. Expressus recenti semine suc-  
cus, in se siccat.

Nasturtium.

CAP. CXLVI.

**N**asturtium optimum constat esse Baby-  
lonicum. Omnium semen est acre: excal-  
facit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas  
excudit, lienem imminuit, partus exanimat,  
menses cit, venerem stimulat, sinapis & erucæ  
simile intelligitur. Lepras & impetigines abster-  
get. Illitum cum melle, lienem extenuat, fauos  
expurgat, pulmonum vitia extrahit, sorbitio-  
nibus incoctum. Serpentium venenis potum re-  
sistit, atq; eas suffitu fugat: capillorum defluuia  
cohibet: carbunculos ad suppurationem perdu-  
cit, & rumpit: coxendicibus cum polenta comode  
ex aceto illinitur, tumores collectionesq; discutit,  
emittit furunculos, illitum cum muria. Herba  
ad omnia eadem effectus, licet minor.

Thlaspi.

CAP. CXLVII.

**T**hlaspi hercula angustis folijs, digitali lon-  
gitudine, in terram versis, suppinguibus,  
in cacumine diuisis: binum dodrantum caulicu-  
lo, tenui, non sine adnascantibus ramis: fructu cir-  
ca ipsum totum, ab extremo in latus se panden-



\* *Alis* - te: semine nasturtij incluso\* lenticule vasis eff-  
*no* *et* *Alis*, figie, nisi quod infringitur, vnde nomē accepit)  
 id est, di- flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fos-  
 sci figu- sisq;. Semen asperi gustus, ex calfaciens: bilem  
 ra.

utrinq; extrahit, potū acetabuli mēsurā: prodest  
 ischiadicis infusum: sanguinē potu educit, inter-  
 nas suppurationes rumpit: menses ciet, sed par-  
 tus enecat. Alterum thlaspi tradit Cratenas,  
 quod aliqui Persicon sinapi vocant, latis folijs,  
 radicibus magnis: vtile ischiadicorum infusioni.

Draba.

CAP. CXLVIII.

*Alij a-*  
*rabis.*

**D**Raba herba ad culiti altitudinē assurgit,  
 tenues spargens\* ramos, & ex utroque  
 \* *pā* *et* latere folia ceu lepidij, sed molliora, et candidio-  
*lis*, id ra: in cacumine verò samluci vml ellam gerit,  
 est, vir- candidos flores habentem. Herba hec cū ptisana  
 gas. coquitur in Cappadocia maximē. Semen aridū  
 pro pipere obsonijs admiscetur.

Iris.

CAP. CXLIX.

**I**Rysimon, Latini irionem vocāt, iuxta vr-  
 bes, rudera, hortosque nascitur, folijs eruce  
 syluestris: cauliculis in leri modum lentis et obse-  
 quiosis: floribus luteis, siliquis in cacumine gra-  
 cilibus, vt fenogracō, cornicularis: semine na-  
 sturtij, exiguo, vrentis gustus. Cōtra thoracis flu-  
 xiones efficax est, & si purulenta extusiuntur:  
 regio morbo, & coxendicibus prodest: contra  
 venena in delinctu cum melle datur: illinitur  
 ex aqua aut melle vtiliter cecis carcinomatib;  
 par



parotidibus, duritijs mammarum, & testiũ inflammationibus. In totũ extenuat, & calfacit. Melius multò ad clysteres fiet, si aqua madescat atque torreatur, vel linteo illigatũ, pinsita, farina oblitum perassetur.

Piper.

CAP. CL.

**P**iper in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia, prælongum fructum, veluti siliquam promit, quod longum piper est: habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper euadit. Id autẽ suis temporibus dehiscens, pãdẽsque sese racemos emittit, grana ferentes qualia videmus. Ea acerba candidũ piper faciũt, aptum ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus, quæ cõtra venenata parantur: theriaca vocãt. Longum verò vehementius mordet: & quoniã prius, quàm ematurescat, decerptum est, subamarũ relinquitur, antidotis & theriacis medicaminibus expetitũ. Nigram verò, vt pote quod tempestiua maturitate collectũ sit, odoratũ esse cõstat, cãdido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad cõdimenta vtilius. Sed cãdidum, & adhuc in acerbum vergẽs, antè dictis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenũ, nigrum, sine multis rugis, recẽs ac minime furosum. Inueniũtur etiamnum in genere nigri femina nutrimento defecta, cassa, inania, minimique ponderis, quod vocãt brasma. Vis omniũ excalfacit, vrinã ciet, cõcoquit, extrahit, discu-



rit, absterget caliginem, quæ oculis obuersatur.

Piper, febrium horroribus circuitu repetentibus, siue potu, siue illitu, subuenit: serpentium morsibus auxiliatur, partus extrahit. conceptum adimere creditur, statim à concubitu suppositum: tussis, omnibusque pectoris vitijs, siue eclegmate, siue potu, succurrit: angina eo & melle conuenienter perunguntur: potum cum recentibus lauri folijs, tormina discutit: cum vva passa manducatum, pituitam à capite elicit: valetudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat, ad intinctus esculentorum additum: strumas cum pice discutit, vitiligines ex nitro emaculat.

\* φκκβ, Fictile nouo, vt \* lenticula, motum torretur. Non  
non φκ- est huius arboris radix gingiber, vt aliqui existi-  
cip. stimauere, sicuti paulo post ostendemus. Namque  
piperis radix costo similis est, ora gustantium accendit, saluam ciet. Hæc lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, maducata cum semine pedicularis herba, quam staphidem agriam vocant.

Gingiberis.

CAP. CLI.

**G**ingiberis sui generis planta est, in Trogodytica Arabia magna ex parte nascens: qua virente, ad multa, perinde atque nos ruta, vtuntur, et primis potibus & edulys admiscunt. Huius radices, cyperi modo, parue sunt, cædicanres, & odoratæ, atque piper sapore imitatur. Eligendi debent quæ teredines non noverunt. A multis tamen



tamen ob id \* condiuntur, quòd celeriter cariem \* τὰ ἐξ-  
sentiant, ac fictilibus in Italiā asportātur. Gin- χίυιτ α  
giberis cibo conueniens est, & cum condimento ὧξ τὸ  
assumitur. Excalsfactoriam vim & excoquentē ἔνσκηπ  
habet: aluum leniter emollit, stomacho utilis est, id est, sa-  
efficax aduersus ea, quæ oculis caliginem offun- le cōsper  
dunt. In antidota addi solet. In summa, piperis guntur,  
viribus respondet. quòd fa

Hydropiper.

CAP. CLII.

cilè pu-  
trescāt.

**H**Ydropiper apud aquas nascitur, quæ sta-  
gnāt, aut pigrolapsu repunt: caulem edit  
geniculatum, \* prædurum, multis alis concavū: \* σφρόδι  
folia menthæ, maiora, molliora, candidiora q̃; gu id est, so-  
stu piperis, acri, citra tamen vllam odoris gra- lidum.  
tiam fructum acrem, in surculis paruis, prope fo-  
lia racematin coherentem Folia cū semine illi-  
ta tumores veterēsque duritias discutiūt, sugilla-  
ta delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro pi-  
pere in obsonijs admiscuntur. Radix parua, nul-  
lius in medicina momenti.

Ptarmica.

CAP. CLIII.

**P**Tarmica exiguus futex est, surculos ha-  
bens paruos, multos, & rotundos, abrotono  
non dissimiles, & circa eos folia oleæ, longa,  
multa, & in cacumine capitulum, vti anthemi-  
dis, paruum, rotundum, quod suo acri odore ster-  
nutamentum excitat: vnde nomē accepit. Folia  
cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores  
sternutamēta efficacissimè mouent. Nascitur in



montibus & petrosis.

Radicula, seu lanaria herba.

CAP. CLIII.

Cēsetur **S** Truthium herba vulgò nota, qua purgandis  
ea quā lanis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix  
vulgosa est acris: vrinam ciet: prodest tussi, iocinerosis,  
ponariā orthopnea ex melle sumpta, cochlearis mensu-  
dicunt. ra: aluum soluit. Eadem cum panace & cap-  
paris radice calculos frangit, & cum vrina ex-  
turbat. duritiam lienis absomit: menses imposi-  
ta trahit, partus efficaciter enecat. Cum polenta  
autem & aceto illita, lepras tollit: tubercula di-  
scutit, cum farina hordeacea, & vino deco-  
cta. Miscetur & malagmatis, & ocularitus  
collyrijs, claritatis causa. Sternutamenta mo-  
uet, per os purgat, trita cum melle, & naribus  
infusa.

Cyclaminus.

CAP. CLV.

**C**yclaminus folia habet hedera, purpurea,  
varia, in quibus suprà infraq; albicant ma-  
cule: caule nudo, quaternos digitos equante: flo-  
ribus in eo \* purpureis, rosarum effigie: radice  
nigra, & aliquātum lata, vt rapum videri pos-  
scētibus. sit. Quæ cum hydromelite pota, pituitā aquāmq;  
detrahit: menses potu appositū ve ciet. Tradunt,  
si pregnans radicem transgrediatur, abortū fie-  
ri. Partum appensa accelerat: contra venena,  
presertim leporis marini, ex vino bibitur: illita  
contra serpentium ictus, remedio est: immista vi

no



no inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum, quiebit, multis vestibus cōtectum, loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiekti autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deiciēda quoq; alui excrementa, in vellere sedi subijcitur: illito vmbilico & imo ventre coxarū tenus, aluum emolli, & abortum efficit: suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortū inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, procidnam sedem restituit. Exprimatur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinē decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat, vulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur, lienem absmit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcuscula, perñionēsque foveri congruum est: ipsaq; in oleo vetere feruesacta, illito oleo, vlcera ad cicatricem perducit. Cavata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdū Tyrrenicæ ceræ momento, vt strigmenti crassitudinem vnguentum contrahat, cū primis vtile perñionibus. Radix, scille modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maxime sub arboribus.



## Altera cyclaminus. CAP. CLVI.

**E**st & altera cyclaminus, quam cissanthemon aut cissophyllon vocant: folijs hederæ, sed minoribus: geniculatis caulibus, crassisq; circa vicinas arbores, capreolorum modo se voluentibus: flore candido, odorato: acinibus hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ unius pondere poti, cum vini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, lienē per urinam & aluum absument. Ad orthopnoeam bibitur. reliquias à partu purgat.

## Dracunculus. CAP. CLVII.

**D**racunculus folio constat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguē planē referat, baculi crassitudine: fructus summo caule racematim coheret, colore primum herbaceo, & cum ematuruit, croceo; gustu feruens, mordaxq;: radice aliquantulum rotunda: bullosa, aro non absimili, tenui obdusta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum absomit: carcinomata illitus sistit: triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt: odorem aiunt posteaquam flaccidi flores emarcuerūt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix excalfacit: orthopnoeis, ruptis, vulsis, tussi, destillatione



lationibus, auxiliatur: humores pectoris excreatu facile reddit, siue cocta tostaq; cum melle aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: urinā pellit, venereum excitat, cū vino pota. phagedenas vlcera, & quæ cacoethe vocantur, trita cum melle & bryonia alba expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eijciendos partus fieri solent: qui radice suas manus persicuerunt, à viperis feriri negantur: illita ex aceto, vitilignes emaculat. Folia recentibus vulneribus, linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino pernionibus apposuisse prodest: caseus folijs inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, albugines, et oculorum caligines conuenit. Radix cruda cocta & ve, ad sanorum vsus, pro olere recipitur: in Gymnesijs insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiuijs placentarum loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq; frustatim conciditur, & lino traiecta, siccatur in umbra, & ita reconditur.

Arum.

CAP. CLVIII.

**A**Ron, apud Syros lupha vocitatū, folia emittit dracunculi, sed longiora, et paucioribus distincta maculis: caulem suppurpureum, dedrantalem, pistilli specie, à quo croceū semen exit radice dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cū minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se decocta maduntur.

Larus  
offici-  
nis.



Radix, semen & folia, dracunculi vires habet.  
 Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illini-  
 tur, et dracunculi more reponitur. In totum, ob  
 mitiore eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Arisarum.

CAP. CLIX.

**A**risarū exiguā herbula est, cuius radix  
 elea magnitudinē implet, lōgē maioris  
 quā aron acrimonie: vnde illitu nomas sistit.  
 Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu  
 radice, genitale animalis cuiuscunque in per-  
 niciem agitur.

Hastula regia.

CAP. CLX.

Offici-  
 nis  
 Aphro-  
 dilos.

**H**astula regia vulgaris notitie est, folijs  
 maioris porri: caule leui, ferente in cacu-  
 mine florē, quē anthericon appellāt: radices sub-  
 iacent oblonge, rotunde, glādijs similes, gustu  
 acres, quē ex calfaciūt: vrinas & menses epote  
 ciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussi-  
 bus, dragma pondere potē ex vino, medentur,  
 Ea verō vomitiōes adiuvat, ludicri tali magni-  
 tudine commanducata: à serpēte demorsis datur  
 aptissimē, verūm trium drachmarum pondere,  
 folijsq; floribus & radice ex vino, morsus illinire  
 oportet. Item vlcera sordida, & depascētia, mā-  
 marum quoq; & testiu inflammationes, tuber-  
 cula, furunculōq; que, decoctis in face vini bulbis,  
 recētibus inflāmationibus ex polēta auxiliatur.  
 Radicis succus adiecto vetere vino dulci, myr-  
 rha & croco decoquitur, sitq; perquā vtile ocu-  
 lis



lis medicamentum: ad purulentas aureis per se, & cum thure, melle, vino et myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem infusus, \* dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excavatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus et ambustis igni, conducit: & surditati, instillatum in aure, auxiliatur. Candidam vitiliginem, \* linteo ante perfricta in sole, illita radix emendat. Semen floresq; in vino poti, scolopēdra et scorpionū venenis, mirū in modum resistunt: aluum purgāt.

Bulbus esculentus. CAP. CLXI.

**E**sculentus bulbus vulgo cognitus, à nobis estur: stomacho & aluo utilis rufus, et qui ex Aphrica defertur. Amarus verò et scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat. Bulbi omnes acrimoniam habent, excalfaciunt: venerem stimulant, linguam tonsillasq; exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, inflationem pariunt: luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrenas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent, sudores compeſcunt: stomachi dolores mitigant: furfures & ulcera, quæ in capite manant, cū tosto nitro abstergunt. sugillata varosq; per se, aut ex oui luteo, et lentigines cū melle vel aceto, emendant: fractis auriculis vnguib; q; ex polenta medentur: idē calidis



calidis cineribus torrefacti, tollunt fici: itē cum cinere ē menarum capitibus, impositi: cremati verò, & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrasq; cicatrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

Bulbus vomitorius. CAP. CLXII.

*\* Βόλ-  
φα.* **B**ulbus, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò & longiora quàm bulbus esculentus: radicem similem, \* cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur: vomitiones mouet.

Scilla. CAP. CLXIII.

*Offici-  
is squil-  
a, Var-  
onis mo-  
e.* **S**cilla vim acrem atq; feruentem habet: assata tam ad multa vtiliorē esse constat. Pollinea, Varad crustam subacta, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficiēter intosta fuerit: qua exempta, si nō emollescat, altero polline simili, aut luto circūlinitur, & eadem quæ prius sunt: nam quæ ita nō assatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnū demittatur. Sumi etiam solet quod maximè est mediū, direptis viuo tenus tunicis, quod frustatim cōsectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinē nec acrimoniā habeat: traiectaq; lino frusta siccantur in vmlra, ita vt ne vlla quidē parte se contingāt: his scille segminibus



nibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinū vti-  
mur. Ad rimas pedum, interna pars crude scille  
in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta im-  
ponitur: decocta in aceto de morsu à vipera, cata-  
plasma est. Ad singulas assæ parteis adiectis octo-  
nis tostæ salis, cochlear vnum aut alterū damus  
ieiunis, ad emolliendam aluum: in potu autē &  
odoratis medicaminibus, & quibus urinā ciere  
volumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus  
innatat cibus, regio morbo, torminibus, in tussi  
vetere, suspiriosis, et ore reijciētibus tres obolos,  
in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur  
cum melle, & estur eorundem gratia, maximè  
vt cōcoctionem adiuvet. Strigmenta per aluum  
extrahit. Cocta & simili sumpta modo, eosdem  
præbet effectus: sed cauendus scillæ vsus his, qui  
intestinum sentiūt vlcus. Ad pensiles verrucas,  
& perniones, tostæ efficaciter illinitur. Tertium  
semen, & in carica aut melle deuoratum, aluum  
emollit. Scilla tota in limine iannæ suspēsa, malū  
medicamenti noxam arcet.

## De Pancratio. CAP. CLXXIII.

**P**ancratium, quod aliqui scillam appellant,  
radice est magni bulbi, subrufo colore, aut  
suppurpureo, gustu amaro ac feruēte: folijs lilij,  
sed longioribus. Scillæ vires & preparationem  
habet, eodēq; pondere in morbis efficaciter assu-  
mitur: cui tamen mitior quàm scillæ facultas in-  
est. Radicis succus cum erui farina digeritur  
in past



in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydro melite, commodissimè dantur.

Capparis. CAP. CLXV.

**C**apparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructu oleæ similem, qui cum delascens panditur, florem candidum promittit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis punicoriorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices lignosas spargit, grandes, numerosasque. Tenui plerumque solo, asserisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. Caulis & fructus cibi gratia conduntur: alium turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamè stomacho quam cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem absunit, & urinam cruentamq; excrementum emittit: bibitur utilissimè in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, inter ruptis & convulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radice cortex ad eadem proficit ulcera omnia vetera, & sordida, & que cecalluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei illimitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum aceto trita, vitiliginis albas absterget. Radix foliaq; intrita, strumas ac duritias discutiunt. Aurium vermiculos infusus succus enecat. *Aplurima,*



ca, & praesertim Marmarica capparis, vehemēter inflat. Apula vomitus facit, & quae à Lilyco, & quae Rubro mari defertur, mirum in modum acris est: siquidem in ore pustulas excitat, gingivāsque osse tenus exest: quare in citis non abredamnatur.

Lepidium.

CAP. CLXVI.

**L**epidium aliqui gingidiū vocant, herbula Censetur vulgò ncta: muria cum lacte servatur. Vis piperis foliorum acris & exulcerans: quapropter ischia olitorū. dicis trita, praesentissimum est auxilium, si cū heleny radice, quarta parte horae, illinatur: liencsis simili modo prodest. lepras eximit. Radix appesa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Ranunculum.

CAP. CLXVII.

**C**omplura ranunculi genera: vis tamen omnibus vna, acris, & vehementer exulcerans. Nam vnum coriandri folijs constat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cultum alto: radice alta, exigua, amarāque, multis capillamentis, hellibori modo, fibrata: nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, \*plerunque in Sar- \* *ωλιδία* dinia proueniēs, quā acerrimū, quod syluestre *sop*, id apium appellant. Tertium minimū, odore graui, est, copio flore aureo. Quartum huic simile flore lacteo. *sum*. Folia, flores, & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare

*vng*



ungues scabros extricant, scabiem eximunt, sti-  
gmata delent: formicantes verrucas, & pensi-  
les, alopeciâsque paulisper illita tollunt. Tepente  
decocto pernioles fouentur. Sicca radix, tritaq;  
sternutamenta ciēt, naribus admota: dentium  
dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Anemone.

CAP. CLXVIII.

**D**vo anemones genera, vnum syluestre, alte-  
rum in cultis nascēs. Cuius multæ species:  
vna phœniceum florem profert: altera candican-  
tem, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia  
coriandro similia, ceterum scissa tenuius in ter-  
ram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in  
quibus flores, vt papaueris, & in medio capitula  
nigra, aut cœrulea: radix oleæ magnitudine,  
aut amplius paulo grādescit: ac veluti geniculis  
quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo pror-  
sus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius  
caput: flore puniceo, tenuibus, & multis radicū  
capillamentis. Acrior est, quæ nigra habet folia.  
Vis vtriusq; acris: ea de causa succus naribus in-  
fusus, purgat caput. Commanducata radix pi-  
tuitam trahit: decocta in passo & illita, medetur  
oculorum inflammationibus: cicatrices eorun-  
dem & hebetudines emendat, sordida vlcera  
abstergit. Folia, & caules, si cum ptisana deco-  
cti edantur, copiam lactis præbent: mens̄trua  
ciunt, vellere apposita. Illita quoque lepras exi-  
munt. Sunt qui errore ducti, argemonem nomina-

ti cupi-



ri eupatorium putent: quoniã à syluestri anemone, argemone & papauer, quod rhœada appellant (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorũ cognitionẽ in floribus, distinguere nõ possunt. Verũ papauer & argemone colore minus saturato spectatur, & vtraq; tardius floret. Quinetiam argemone croceum succũ, gustu admodũ acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrẽ. Insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculum, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

## Argemone. CAP. CLXIX.

**A**Rgemone in totum syluestri papaueri similis est: folia habet anemones, diuisa: floren puniceum: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latũ: radicem rotundã: succum croci colore, acrẽ dimittit. Argema & uribeculus expurgat. Folia illius inflammationes compescunt.

## Anagallis. CAP. CLXX.

**D**uo anagallidis genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cœruleo flore est, femina dicitur: mas, quæ phaniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes, foliis in quadrangulo cauliculo pusillis, subrotundis, ad helxina folia accedentibus: semine rotundo. Viraque mitigandũ



vim habet: inflammationē arcet, ad aēctos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat: & naribus infusus, dolorē dentium lenit, si in aduersam narē inūciatur: argema cum melle Attico emendat: retusa oculorū aciei auxiliatur: contra viperarum morsus, iocineris & renum vitia, ~~sa~~ vino bibatur, prodest. Tradunt eam, quae caeruleum edidit florem, proci-  
duam sedem reprimere: quae verò phœniceum, il-  
litu euocare.

## Hedera: CAP. CLXXI.

**H**edera differentias multas in specie sorti-  
tur. summas autē genere treis. Nam quae-  
dam candida est, altera nigra, tertia helix. Cādi-  
da, fructum fert candidū: nigra, nigrū, aut cro-  
ci emulum, quā vulgus Dionysia vocat: helix  
fructū non gignit, sed albas habet viticulas, &  
\* *ἰσχυρὰ* folia parua angulosa, & \* *concinnicra*. Hedera  
\* *ἰσχυρὰ* omnis acris est, & adstringens: nervos tentat.  
\* *ἰσχυρὰ*. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysenteri-  
cos, in vino bis die potus: ambustis cū cerato tri-  
tus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut  
cruda cum pane detrita, lienes sanāt. Foliorum  
& corymborum succus, cū irino vnguento, melle  
aut nitro, naribus infunditur, & cōtra veteres  
\* *ἀσθενέας* capitis dolores \* capiteo cum aceto, & rosaceo  
\* *ἰσχυρὰ*, perfundi vtile est: purulentis auribus, aut dolētibus,  
cum oleo medetur. Nigrae hederæ succus, aut  
poti corymbi, corpus infirmant, mentēque tur-  
bant.



bant largius sumpti. Acini quinque triti, calfa-  
 etiq; in punici mali cortice cum rosaceo, si instillē  
 tur à contraria aure, dolorem dentium mitigāt.  
 Denigrāt capillum, illiti corymbi. Folia in vino  
 decocta, illinuntur omnium vlcerum generi, etiā  
 si cacœthe sint: vitia cutis in facie, & ambusta sa-  
 nant, vti antea diximus, decocta. Mouent menses  
 triti & subditi corymbi: ydem poti, post purgatio-  
 nes foeminarum, drachmæ pondere, concipiendi  
 spem adimunt. Pediculus foliorū melle irrigatus  
 ac vuluæ inditus, mens̄trua & partus extrahit.  
 Instillatus succus putrida tedia nariū, graueolē-  
 tiāq; emendat, & sanitati restituit. Lacryma  
 hederæ psilothrū est: illitu pediculos enecat. Suc-  
 cus radicū in aceto potus, cōtra phalāgia prodest.

Chelidonium. CAP. CLXXII.

**C**helidonium maius; caule est gracili, cubita-  
 li aut altiore, agnatis foliosis: folis ranuncu-  
 li, mollioribus tamen, & colore cæsis: flore violæ  
 albæ. secundum singula folia prodeunte: in eo suc-  
 cus croci, mordax, acris, & aliquantulū subama-  
 rus, grauit̄ olēs: radix supernè singularis, infer-  
 nè in multa crocea capillamēta fibratur: siliqua,  
 ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figurā  
 longa: in qua semen papauere maius recludi-  
 tur. Succus in oreo vase, cum melle prunis deco-  
 ctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radi-  
 ce, succus exprimitur ineunte æstati, & siccatus  
 in vmbra digeritur in pastillos. Radix cū aniso



& vino albo pota, medetur regio morbo, & vlceribus quæ serpūt: imposita cū vino. aut manducata, dentium dolorē sedat. Hoc momē sibi videtur vēdicasse, quōd aduentu hirūdinū exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrāt, hirundines matres excecatis pullis, admota herba visum restituere.

Chelidonium minus. CAP. CLXXIII.

Vulgo  
Scrofula  
riu mi-  
nor.

**C**helidoniū minus, quod triticū sylvestre aliqui nūcuparūt, herbula pediculis ab radice pēdens, sine caule: folijs hedere, multo rotundioribus, & minoribus, teneris, & suppinguibus: radices habet ex eodē callo cōplures, pusillas, in granorū tritici modū acervatim congestas: quarū tres aut quatuor in longitudinē exiūt. Iuxta aquas & lacus nascitur, Vis ei acris, & anemones modo, summā cutē exulcerat: pforas & scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput naribus infunditur. Decoctum eius cum melle gargarizatum, magnificē id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit.

Othonna, CAP. CLXXIIII.

Varie de  
Othōna  
sentētiæ.

**O**thonnam aliqui maioris chelidoniæ succum esse aiunt, quidā glaucū. Alij succum floribus corniculati pipaueris expressum, Alij permistos cæruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaveris succos: esse cōtendunt. Alij Troglodyticæ cuiusdam herbe succum, quæ othonna vocatur: nascique eā in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptū spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cū



modo, & veluti à tinea derosis, squallore obfritis, paucis flore croci, latifolio: quare quidā anemones specie esse putauerūt. Extractus succus oculorum medicamenti adūcitur, vbi expurgare est opus: mordet enim & absterget omnem caliginē que oculis offunditur. Tradunt humorē quēdam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamē affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, aereo colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

## Auricula muris. CAP. CLXXV.

**M**uris auricula, quā myosotida vocāt, herba est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imo rubētibus, & concavis: folijs angustis, oblōgis, dorso acuto, elato, nigricātibus, per intervalla assiduē geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeūtib: flosculo, vt anagallidis, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita agylopiā sanat. Sūt qui alsinem, muris auriculam vocitent.

## Glastum. CAP. CLXXVI.

**S**atium glastū, quo infectores lanarū vtūtur, folium habet plātagini simile, verū pinguius nigriusq: cuius caulis duūm cubitorū longitudinē excedit. Illita folia tumores omneis discutunt, cruenta vulnera glutinant. sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrū, phagedenas, putre-



\*λεπτο-  
 τήρες, id  
 est, tenu-  
 iores.

scentia vlcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre  
 glastum satiuo simile est: folia fert maiora, la-  
 ctucaceis pxima: caules\* prætenuēs, multifidos,  
 quadrāmtenus rubentes: in quorū cacumine fol-  
 liculi multi dependent, quandam linguarū effi-  
 giem referētes, in quibus semē flore tenui, luteo.  
 Eadē quæ & supra dicta præstat: potu & illitu  
 lienosis auxiliatur.

Vulgò Telephium. CAP. CLXXVII.  
 Crassula **T**elephium herba portulacæ similis est, &  
 maior, et caule, & folijs: alas binas in singulis folio-  
 faba in- rum geniculis annectit, ramuli à radice seni se-  
 uersa. ptenive prodeunt, folijs referti cæruleis, crassis,  
 lentis, ac carnosiss, flore luteo, aut cādido. Nasci-  
 tur inter vites, & locis cultis vere. Folia senis  
 horis illita altam vitiliginem sanant:  
 sed postea hordeacea farina illini  
 debet. perunctam ex aceto  
 etiam in sole vitiligi-  
 nē tollunt, sed vbi  
 inaruerunt, ab-  
 sterguntur.

## SECUNDI LIBRI

FINIS.



PEDANII  
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medicinali materia,

LIB. III.

Ioanne RVELLIO Sueßionensi  
interprete.



UPERIORIBVS, charis-  
sime Aree, cōmentarijs, tradidi-  
mus de aromatibus, vnguentis,  
oleis, arboribus, earum fructibus  
& lacrymis, itē de animalibus,  
cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia prædi-  
tis. In hoc autem tertio radices, succos, semina,  
herbas, & quæ vernacula & inter se cognata  
cēsantur, quæq; pluribus scatent remedijs, prose-  
quemur.

Agaricum. CAP. I.

**A**garicū radix fertur la serpitij similis,  
sed facie summa solutior, & rariore fun-  
gosoq; tota contextu. Duo eius genera: scemina,  
quæ præfertur, rectis intus venarum discursibus  
cōstat, mas rotūdus est, & vndiq; cōpactior. Vtriq;  
gustus in initio dulcis, mox ex distributione in  
amaritudinem transit: gignitur in Sarmatiae  
regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem



esse planta affirmet: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringendi calfaciendiq; naturā habet: efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: predestitidē contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus otolis in vino mulso, febrim non sentiētibus. febriculosis verò, in aqua mulsa. Arquatis quoq; suspiriosis, iccineris, renūmq; vitio laborantibus, dysentericis. Itē si vrina agrē red datur, si vuluē strangulatus vrgeat, si pallor mēbra decoloret, drachma vna dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine vlla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acida ructātibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articularum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciēt: fœminis, quas inflatio vuluē vexat, vtiliter aquali modo datur. Horrores soluit datum ante februm accessiones: aluū purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorū antidotum est denarij instar, cum diluta portione sumptum: si serpentes ictū vibrarunt, morsūmq; subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, mirē auxiliatur. In summa, internis omnibus vitijs conuenit, pro viribus, & etate datū, nūc ex aqua, nūc ex



ex vineis ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum.

CAP. II.

**R**Ha. aliqui rheum, Latini rhaponticum vocant, provenit in ijs, quæ supra Bosphorū sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, cetaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantū levis, sine odore. Optimū habetur, quod teredines non sensit: si gustatu cum remissa adstrictione lenteſcat, māducatūmq; colorem reddat pallidum, aut ad crecum inclinantem. Id epotum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatē, & omne genus dolores, ad conuulsa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renum, vesicæ, & pectoris vitia, aduersus intēta præcordia, & vultu mala, coxendicum dolores, sanguinis excretionēs, suspiria, singultus, dysenterias, & celiacorum affectus, contra februm circuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis valetudinibus eodē, quo agaricū, pondere, & cum eisdem liquoribus: si febris careat, in mulso: si aliter, ex aqua mulsa: si tabē experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso, si dissolutio est stomachi, id est cū cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. liuētia, lichenāsque tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitū dissipat. summa eius vi adstringens cum aliquanto calore.

Ignoratur. Nec enim est qđ Rēpōtici nomine hodie indicatur.

Gentiana.

CAP. III.

**G**Entiane inuentio prima assignatur\* Gētiō. tidi.

\* Græcus Gen



Illyriorum regi, à quo cognomen habuit. Folij partim proximè radicem, iuglandi plātagi-  
 uve similibus, subrubris, partim à medio caule,  
 & præsertim iuxta cacumē, paulū dissectis: cau-  
 le cavo, & leui, digiti crassitudine, geniculato,  
 & ex interuallis maioribus foliato, binū saepe cu-  
 bitorum: semine in calycitus lato, sine pondere,  
 glumoso, satis ad sphondyliū semen accedente: ra-  
 dice longæ aristolochiæ, crassa, amara. Nasceitur  
 in sublimibus montiū iugis, vmbrosis locis, aquo-  
 sisq;. Vis radicis excafactoria, & adstringens:  
 contra morsus serpentiū, duabus drachmis, cum  
 pipere, ruta, & vino pota, auxiliatur. Extracti  
 succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi  
 deturbatis, ruptis, & conuulsis, prodest: hepaticis  
 & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix  
 collyrii modo subdita, partus ei cit: imposita, vt  
 lyciū, vulneraria est, & vlcerū cuniculatim de-  
 pascentium medela. Succus præcipuè eodem effe-  
 ctu prodest: oculis inflammatione laborantibus illi-  
 nitur: pro meconio collyriū acris immiscetur.  
 Radix vitiliginē absterget. Succus extrahendi ra-  
 tio hæc est: Contusa radix quinque diebus aqua  
 maceratur: postea in eadem tantisper decoqui-  
 tur, dum extēt radices: & vbi refrigit aqua, lin-  
 teo excolatur: mox discoquitur, dū mellis crassi-  
 tudo fiat. fictiliq; reconditur.

**A**ristolochia. CAP. IIII.  
 Aristolochia nomē ex eo sibi adaptauit,  
 quod



quod existimetur optimè puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ femina vocatur, folijs hederaceis: præstanti odore cum acrimonia, molitus subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus: floribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod rubrum est, grauitè olet. Longa, mascula appellatur: nonnullis dactylitis, longiore quàm rotunda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, grauitè olente, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix rotunda, in orbem conglobata, rapi modo. Longæ verò radix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulò maiorem. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ clematidis vocatur, ramulos habens tenues, refertos folijs subrotundis, minoris semperuino similibus: flores rubeæ: radices longiores, tenues, crasso cortice odoratæq; vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris venenis resistit. Longa vero aduersus angues, & venena, drachmæ pondere ex vino bibitur & illinitur: pota cum pipere, & myrrha, menses, partus, & omnia vuluarum onera eijcit: eadem efficit subdita in pessa.

Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus, spirijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur.

Aculeos, et spicula extrahit, ossiū squamas illitis  
adimo



adimit, vlcera putrida exest, & sordida expur-  
gat: cunat cum iri, & melle explet, gingivas, &  
dentes extergit. Clematidis ad eadem pollere cre-  
ditur, viribus tamen inferior est.

Dulcis radix.

CAP. V.

Liquiri-  
tia offi-  
cinis.

\* max-  
agris id  
est, lon-  
gus.

**D**ulcis radix plurima gignitur in Cappado-  
cia, & Ponto: fruticosa est, ramis binum  
cubitorum altitudine assurgētibus: folijs lētisci,  
densis, pinguibus, taclūque gummosis: flore lya-  
cinthi: fructu pilularum platani magnitudinis,  
asperiore, quae siliquas lentium modo habet, ru-  
fas & \* paruas: radicibus longis, vt gentianae,  
coloris buxii, subacerbis & dulcibus: quae den-  
santur in succum, lycij exēplo. Is in arteriae sca-  
britia efficax habetur: verū oportet vt lingua  
subditus eliquescat, aētuantī stomacho, thoraci,  
ac iocineri conuenit: sanat vesicae scabiem, & re-  
num dolores, cum passo potus: idem eliquatus  
sitim sedat, vulneribus illitus accōmodatur, com-  
manducatus ori prodest. recentis radice decoctio  
ad eadem cōuenit. Eiusdem farina pterygūs cō-  
modissimē inspargitur.

Centaurium magnum. CAP. VI.

Cēsetur  
Rheupō-  
ticū offi-  
cinar. ū

**C**entaurium magnum folia habet inglādīs,  
oblonga, viridi brassicarum colore, serrata  
in ambitu: caule, ceu rumicis, binum aut ternum  
cubitorū, multis ab rabice adnatis, in quibus ca-  
pita, ceu papauerum, in rotunditate oblonga: flos  
caeruleus: semen cnico simile, ceu laneis floccis  
quib



quibusdam inuolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo pregnans, cū adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rutescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & celles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribŭsque locis circa Pholoen, Lyciam & Smyrnam. Radix cōuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: ceteris, in vino. Itē ad tormina, & vulue dolores. Ramēta eius in collyriū formam vulue subdita, menses atque partus extrahunt. succus eadem præstat, vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antē madefacta, ea glutinat & cōiungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtuntur.

Centaurium minus. CAP. VII.

**C**entaurium, limnesiō aliqui vocauere, quoniam rigua amet loca. Herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: folijs rute prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui & supernacua, quæ gūstanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa, suo illitu vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrices obducit: bilem crassosque humores per aluum exigit. si decocta deoretur. Ius decocti ischiadicis cōuenientissimē infun



funditur:trahit enim sanguinem & dolorem le-  
uat.Succus oculorū medicamentis perquā vti-  
lis: siquidem cum melle caliginem oculorum ex-  
purgat:in vellere appositus, mēses & partus ex-  
trahit:epotus peculiariter nervorū vitii succur-  
rit.Succi extrahēdi ratio: Legitur herba semine  
pregnās,& diebus quinque madefacta, decoqui-  
tur,donec superemineat aqua:mox ubi refrixit,  
linteolo exprimitur,& eiecta herba, iterum de-  
coquitur, vsque dum mellis crassitudinē habeat.  
Nonnulli eā recentem gravidāq; contundunt,  
atq; succū fictili non picato exprimūt, & in so-  
le,lignea rude assiduē mouētes, inspissant. Quod  
si quid concretum faucibus vasis adhærescat, de-  
radunt, reliquōq; humori permiscent. Noctu dili-  
genter operiunt:nāq; ros nocturnus, liquores co-  
alescere non sinit. Quæ autem siccis radicibus aut  
herbis liquamenta exprimuntur, decocta (vt in  
gentiane mentione retulimus,) preparantur:sed  
quæ ex corticibus humidis, aut contusis herbis fa-  
ctitantur,in sole,vti antè dictū est,cogūtur. Sic  
èthapsia,sic è mādragora reliquisq; similibus suc-  
cus sic ex acerbis vuis melligo elicitor. Lyciū ta-  
men, & absynthium,hypocistis, & consimilia,  
decocta, eo, quo diximus, modo coguntur.

Chamæleon albus. CAP. VIII.

**C**hamæleon albus, iuxta ideo aliquibus voca-  
tur,quod quibusdā in locis piscum circa ra-  
dicem eius inueniatur,quo pro mastiche.viūtur  
mul



mulieres: folia habet silybo aut carduo similia,  
 \*asperiora, acutiora, nigroque chamaleone vali  
 diora: caulem non promit, verum ex medio spinas,  
 eclini marini, aut cinarae modo, erigit: flores pur-  
 pureos, veluti papporum lanugines emittit: semine  
 cnici simile: radicem in latis collibus crassam, in  
 montosis vero graciliorem, in profundo albam:  
 aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem.  
 Quae pota acetabuli mensura, latus interaneorum  
 tunc pellit Bibitur autem in vino austero, cum  
 origani feruescentis succo. Hydropicis commodissi-  
 me drachma in vino datur, etenim eos extenuat:  
 contra difficultatem urinae decoctum propinatur.  
 Hausta in vino, serpentium venenis resistit: occi-  
 dit canes & sues: mures item necat, subacta cum  
 polenta aut aqua, & oleo madefacta.

Chamaeleon niger. CAP. IX.

**C**hamaeleon niger, soli scolymo similis esset,  
 nisi minora, tenuioraque, ac rubro distincta  
 viderentur: caulem emittit dodrantalem, crassi-  
 tudine digitali, subrubrum: & in umbella flores  
 spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores:  
 radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quae  
 dissecta flavescit, & comanducata mordet. Pro-  
 uenit in campestribus, siccis, & clinosis tracti-  
 bus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti  
 sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem  
 abigit: eadem, cum sibi sulphur & bitumen asci-  
 nit, & cocta in aceto illinitur, impetigines abs-

ten

\* Sic  
 Plin.  
 graecus  
 codex  
 πρῶτον  
 πρῶτον, id est  
 crassiora  
 ni forte  
 πρῶτον  
 πρῶτον le-  
 gendum:  
 quod ex  
 herbarij  
 collatio-  
 ne, si  
 quando  
 videre  
 contingat  
 facile di-  
 iudicare  
 ris.



terget. Decoctum collutione dētium dolorem mī-  
tigat: cum pari pipere & cera oblita radix, dolen-  
ti denti auxiliatur. Radice concisa, & in aceto  
decocta, dētes fouentur: eos quoque frangit, si scrī-  
ptorio stylo feruens admoueat: vitia cutis in fa-  
cie, vitiliginēsq; cū sulphure emendat: erodenti-  
bus medicamētis admiscetur: phagedenas, tetrā-  
que vlcera illitu sanat. Quare chamaleo vocetur,  
ā varietate foliorū euenit: mutant enim cū terra  
colorem: hīc viridia, illic albicantia, alicubi cæru-  
lea, nonnusquam rubra inueniuntur.

Nomi-  
nis ratio

Crocodilium. CAP. X.

**C**Rocodilion chameleontis nigri figuram ha-  
bet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui,  
aliquantum lata, odore, vt nasturi, acuto. Fer-  
uefacta in aqua & pota radix, sanguinem copio-  
sum per naris pellit. Datur lienosis, eos eviden-  
ter adiuuās. Semen ei rotundū inest, duplex vtī  
scutum, quod suapte vi vrinam ciet.

Dipsacum, siue labrum Veneris.

CAP. XI.

Virga  
pastoris  
vulgē.

**D**Ipsacum, aculeatarum generis est: caule  
habet altū, spinis horridum, folijs lactuce,  
spinosis, binis geniculi singula complectentibus,  
prælongis, ceu quāsdā bullas intus & extra acu-  
leatis, in dorsi medio habētibus, concauo alarum  
sinu, in quo imber aut ros asseruetur: vnde dipsa-  
ci, quasi sitientis, nomē traxit. In cacumine cau-  
lis singula circuli capitula insunt, oblonga, echi-  
mata



nata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissectæque medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis, fistulasque, si tusa & decocta in vino radix, usquedum sit crassitudo cere, immittatur. Medicamentum area pyxide recodendum. Aiunt fornicationibus, verrucisque pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba. CAP. XII.

**S**pina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chameleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caule supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, celiacis, stomachicis, & qui cruenta extussunt, efficax est: urinam cit, tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica. CAP. XIII.

**A**rabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, ceterasque fluxiones radix etiamnum



valet. Prouenit in asperis.

Carduus. CAP. XIII.

Est gal-  
lorū Ar  
richau.

**C**arduus, Græci scolymon vocant, folia cha-  
maleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora,  
& crassiora: caulem longum edit, foliosum, capi-  
te spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, gra-  
ueolentiam alarum totiusque corporis emendat:  
item si decocta in vino libatur. Copiosam autem  
vrinam fetidamque expellit. Herba cum recens  
tenere scit, in olera, asparagi modo, transit.

Poterium. CAP. XV.

**P**oteriū, Iones neurada vocant, largè fruti-  
cat, cortice obductum tenui. spinis horridū,  
lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, te-  
nuibus, tragacanthæ proximis: folijs paruis, ro-  
tundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nul-  
lius vsus, sed gustu acuto et odorato. Nascitur in  
aquosis, & collibus. Radices demittit binū ter-  
nūve cubitorū, nervosas, & firmas: quæ pro-  
ximè terram recise, dant succum gummi simi-  
lem. Tusæ, præcisis neruis & vulneribus gluti-  
nandis illinuntur. Decoctum quoque eius ner-  
uorum affectibus prodest.

Acanthium. CAP. XVI.

\* Addi-  
tum ex  
Plinio.

**A**canthiū albæ spinæ simile, folijs nuclea-  
tis per extremitates\* & lanugine ara-  
neosa obductis ] ex qua collecta & neta, vestes  
bolyginis similes texūt. Folia vel radices ad re-  
media epistothoni libuntur.

Ata n



Acanthus.

CAP. XVII.

Offici-

**A**Canthus, Romanipaderotā vocant, na-  
 scitur in hortis, petrosis, & riguis: folia  
 halet multo lactucaceis latiora, et longiora, eruce  
 diuisura, nigricātia, pingua, leuia: caulē binūm  
 cubi torum, digitali crassitudine, laeuē, prope ver  
 ticem ex interuallis circundatum foliolis, ceu nu  
 camenta quadam oblonga referentibus, spino  
 sis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum,  
 luteum: caput thyrsi specie. Radicibus nititur  
 longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ vstis  
 igni & luxatis artubus illitæ subueniunt: potæ  
 urinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, con  
 uulsis, tabem sentiētibus, mirè prosunt. Nascitur  
 & syluestris acanthus, scolymo similis, aculea  
 tus, breuior quàm satiuus, & is qui hortis pro  
 uenit: cuius radix ad eadem, ad quæ superior,  
 efficax.

Anonis.

CAP. XVIII.

**A**Nonis, quā aliqui ononida appellāt, ra-  
 mos habet fruticosos, dodrantes, aut  
 paulo maiores, frequētibus geniculis cinctos, ca  
 uis alarū multis, capitibus rotundis, folijs lenticu  
 le, tenuibus, pusillis, ad rutæ aut  
 folia accedentibus, sūl hirsutis, odoratis, non in  
 iucundè olentibus. Muria conditur, antè quàm  
 spinosa fiat, cibus gratissima. Rami acutioribus  
 spinis, & veluti spiculis firmioribus horrēt: radi  
 cem mittit candidam, quæ excalfacit, & exte

Vulgò,

Resti bo  
uis.

\* Suspi-

cor lotū

syluestre

intelligē

dū: ac ob

id fortè

praten-



sem di- nuat: huius cortex ex vino potus, vrinam ciet:  
 ci, quod calculos comminuit, margines vlcenum erodit.  
 trifolij Radix cum decoquitur in posca, dolorem den-  
 pratesis tium collutione mitigat. Decoctum eius potu hæ-  
 cõstet fo morrhoidas sanare creditur.

lijs: vt  
 volumi-  
 ne quar  
 to à Dio  
 scoride  
 depingi-  
 tur.

Leucacantha. CAP. XIX.

**L** Eucacantha, prædita est radice cyperi, vali-  
 da & amara, quæ manducata dolorẽ den-  
 tium sedat: veteri laterum dolori, atque ischiadi-  
 cis prodest, decocto cyathis tribus ex vino potu.  
 Eadem ruptis & conuulsis medetur. Radicis epo-  
 tus succus eisdem præbet effectus.

Tragacantha. CAP. XX.

Offici-  
 nis Dra-  
 gagan-  
 tum.

**T** Ragacantha radix lata & lignosa, summo-  
 cespitem nititur, vnde surculos humiles, ro-  
 bustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia,  
 multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub  
 se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Est  
 etiamnum tragacantha, lacryma, quæ, vulnera-  
 ta radice manans, concreuit. Præstat pellucens,  
 gracilis, levis, sincera & subdulcis. Cutis spi-  
 racula, vt gumi, obstruit. Huius increbuit vsus  
 ad oculorum medicamenta, ad tussim, exaspera-  
 tas fauces, retusas voces, ceterasque destillatio-  
 nes, cum melle in delinctu: subdita quoque lin-  
 guæ liquescit, & in passum adfecta, drachmæ  
 pondere bibitur, contra renum dolorẽ, & vesicæ  
 rosiones, misto cornu cerui vsta & eloto, aut scis-  
 si. Alium inus momento.

Ergo



## Eryngium. CAP. XXI.

**E**Ryngium aculeatarum generis est. Cuius fo-  
lia in principio, sale condita, in cibos recipiū-  
tur: lata autem sunt, et extremo ambitu aspera,  
gustū aromatica. Sed ubi adoleuerūt, circa com-  
plures caulium eminentias in spinas aculeātur,  
in quorum summitatibus globosa capitula, dura  
rum acutissimarūmq; spinarum ambitu stella-  
tim circumuallātur, quorum colos aliās viridis, cū caule  
aliās albus, interdum cœruleus inuenitur. Ra-  
dix oblonga, lata, foris nigra, internè candida, deli  
pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis  
& campestribus. Vim habet calfactoriam: pota-  
mentis & vrinas pellit, tormina inflationesq; di-  
scutit: contra iocinerum vitia, serpentium mor-  
sus, & hausta venena, cum vino prodest. Bili-  
tur aduersus plurima, cum seminis pastinacæ m<sup>o</sup>: quā  
drachma vna: appensa illitāve, tubercula discu-  
tere proditur. Pota cum hydromelite radix, opi-  
sthotonicis & comitialibus medetur.

Nūc cor-  
rupto vo-  
calulo

Iringū  
dicitur.

\* Per

antheri-

cū caule

Aspho-

deli cui

aptissi-

potamē com-

paratur

Alce, hic

intelligi

m<sup>o</sup>: quā

uis Dio

scorides

i Aspho

deli siue

Aloe.

CAP. XXII.

**A**Loes folium scille similitudinem habet, Hastulæ  
crassum, pingue, modicè latū, rotūdum, regie li-  
retrosum pandum: folia vtrinq; ex obliquo lon-  
gioribus interuallis striantur, & in spinulas de-  
sinunt retusas truncasq;. Caulis emittitur non rē hoc ap-  
disimilis\* antherico: flos albus: fructus hastulæ pellari  
regie cognatus: graui tota est odore, & gustu nomine  
amarissima: radice vna, ceu palo, in terrā depa-  
tradat.



eta. Plurima præpinguisque in India gignitur,  
ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiã in  
Asia & Arabia, in locis quibusdam maritimis:  
& in insulis (vt in Andro) non valde succo ex-  
trahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sa-  
nè quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi ge-  
nera: quoddam arenosum, quod sedimentum pu-

\* Plin. rissimæ esse videtur. alterum ad iocineris imagi-  
pinguis, nem vergit. Eligi debet \* syncera, quæ nihil do-  
qui non li sensit, nitida, calculorũ expers, rufi coloris, fria  
ααβαβ bilis, ac iocineris modo coacta, facile liquefscens,  
vt nostri eximie amaritudinis improbat nira & fia-  
codices etu contumax. Gummi eã adulterant: quod de-  
habent, preheditur gustu, amaritudine, & valido odore:  
sed λιπαρ cõq; argumẽto, quod digitis friata nõ ad minima  
βαβ vi- vsq; fructa resoluitur. Nec desunt, qui acaciam  
detur le immisceant. Natura eius est spissare, exiccare,  
gisse.

somnum allicere, & corpora densare, aluũ resolu-  
uere. Stomachum repurgat binũ cochlearium  
mẽsura, in aqua frigida aut egelida pota: sangui-  
nis reiectiones sistit: regium morbu purgat, tri-  
bus obolis ex aqua, aut drachmæ pũdere in potu:  
denorata cũ resina, aut cum aqua, vel melle co-  
cto sumpta, aluũ soluit: purgationis perfectæ cau-  
sa, tribus drachmis sumitur: alijs purgatorijs me-  
dicaminibus admiſta, præstat vt minus stoma-  
chum infestent: sicca glutinandis vulneribus in-  
spargitur, vlcera ad cicatricem perducit, cohi-  
bẽtq; eadem peculiariter exulceratis genitalibus  
medet



medetur, & disrupta puerorum præputia iūgit: condylomata, rimasque sedis ex passo sanat: hæmorrhoidium abundantiam & sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores & insignita, ex melle tollit: priuatim scabras lippitadines, pruriginésque angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: tōsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit: oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde versatur, vt possit æqualiter torreri. Lauatur, vt quod sit arenosissimum, tanquã inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

Absynthium. CAP. XXIII.

**A**bsynthium, aliqui bathypicron herba vulgò cognita. Præstantius in Põto & capadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi: bilem expurgat, quæ & stomacho & ventri inhesit: urinam cit, & crapulam presumptum arcet. Ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum seseli & nardo Gallico potum: fastidia discutit, & arquatos sanat madefacti dilutū, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cum melle appositum. Cōtra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cum vino: item cicuta, & muris aranei morsibus, & draconi marino.



Angine eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorū caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dētiū auriūque dolores decoctū vaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordijs & iocineri, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoque longa valetudine laboranti, cum rosaceo: cū ficis autem, aceto & loliacea farina, aqua inter cutē lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod absynthiten vocant, præsertim in Propōtide & Thracia, quo ad antè dicta vtuntur, cū febris carēt: alioquin in æstate propinant, & acceptam huic vino incolumitatē referunt. Insparsum arcis absynthium, vēstes ab erodētīū iniuria vindicat: culices ex oleo perunctū abigit, & à corpore arceat: atramentum librarium diluto eius temperatum. Literas à muriū erosione tuetur. Existimatur liquamentum eosdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat, quoniam stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

Marinum absynthiū. CAP. XXIIII.

**A**bsynthiū marinū, quod aliqui seriphū vocant, copiosissimū in Tauro mōte: iuxta Cappadociā & in Taphorisi Aegypti gignitur: quo Isiaci pro oliue ramo vtūtur. Herba est tenuis, \*abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica.

Ea

\* Abrotonū mare intel-  
lige.



Ea grauit̃ olet, & cū quadam calfactione adstringit: per sese, aut cū oriḡa cocta, interaneorum animalia, teretēsq; tineas, adiecto melle, enecat, aluum leuigat: cum edulio autē vellenticula decocta, eadem pręstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absynthio assignatur, quo Gallia alpius finitima scatet: id patrio nomine Santonicū vocant, regionis in qua nascitur cognomēto, absynthio nō dissimile, verū subamarum est, nō adeo seminis fecundum. Eadem quę seriphium potest.

Abrotonum. CAP. XXV.

**A**Brotonum duorum est generū. Fœmina quadā arboris specie fruticans, cādicat, circū ramulos folijs, seriphi modo, minutim incisis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatē prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu: id genus Siculum esse cōstat. Alterū mas vocatur. sarmētosum, gracilibus ramulis vti absynthium. Plurimū in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atq; in Syriæ Hierapoli. Crudum semen, tritum & feruefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, cōuulsis, ruptis, coxendiculis, vrinę angustijs, mensibus suppressis, aut remorātilus. In vino potum exitialium venenorum antidotum est: horroribus ex oleo illinitur: serpentes & substratu & nidore fugat: contra ictus eorum cum vino potum prodest: pri-



uatim efficax contra scorpionū & phalangiorū  
venena: oculorum inflammationibus commodè il-  
linitur, cū cotoneo cocto, aut pane: tritum cū fa-  
rina hordeacea: decoctumq; tubercula discutit:  
irini compositionibus admiscetur.

Hyssopum. CAP. XXVI.

**H**Yssopum, herba nulli non cognita, duūm  
generum est, montanum & hortense. Opti-  
mum est Cilicium. Vim habet extenuandi & cal-  
faciēdi: decoctum cum ficis, aqua, nelle, & ruta;  
potiūmq; peripneumoniciis, diuturnæ tussi, suspirio  
sis, de stillatiōibus, & orthopnoicis auxiliatur: ti-  
neas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur.  
Crassum humorem per aluum extrahit, decoctū  
ex aceto mulso epotum: et ad subducendam aluū  
cum ficis viridibus detritis manditur, vehemen-  
tiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deijcit:  
colorem in corpore fouet: lieni, & aquæ inter cu-  
tem, cum fico nitroque, inflammationibus quoq;  
ex vino illinitur: cum feruente aqua impositū, su-  
gillata discutit: cū decocto ficorum, optimè ang-  
nis gargariatur. Decoctum cum aceto, dentiū  
dolorem in collutione sedat: inflationes auricula-  
rum vaporis suffitu discutit.

Stœchas. CAP. XXVII.

Offici-  
nis, Sti-  
chas A-  
rabica. **S**Tœchas iuxta Galliam in insulis eiusdē no-  
minis è regione Massilia gignitur, unde co-  
gnomētū accepit. Herba tenuibus surculis, coma-  
ratica. thymi, lōgiore folio, subamara gustu, & aliquā-  
tum



tum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pe-  
toris vitia efficax est. Antidotis miscetur. Visce-  
ra omnia & vniuersum animantis habitū exte-  
nuat, ab obstructionibus & fæctis liberat.

Origanum. CAP. XXVIII.

**O**rganum Heracleoticum, quod & cuni-  
lam vocant, folium habet hyssopo non dissim-  
ile: umbellam autem non in rotæ speciem orbi-  
culatâ, sed veluti multifidam, semine in summis  
virgis haudquaquã denso. Excalfacit: vnde de-  
coctum cum vino potum, demersis à serpente cõ-  
uenit. Si cicutam aut meconion hauserint, ex pas-  
so, si gypsum aut ephemeron, ex aceto mulso pro-  
pinatur. Ruptis, conuulsis, hydropicis, cū fico esui  
datur. Aridum acetabuli mēsurā potū in aqua  
mulsa, atros humores per aluum extrahit: mēses  
ciet, & tussi cum melle linctum medetur: ad pru-  
riginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in  
balneis prodest. Succus virentis tonsillis, vuam,  
& oris vlcera sanat, & per nares, ex oleo irino  
infusum, trahit: aurium dolores cum lacte mul-  
cet. Cōficitur ex eo, & capis, & rhois frutice, quo  
ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentū,  
his omnibus in cupreo vase per dies bis videnos  
insolatis, dum canicula sydus flagrat. Herba au-  
tem substratus serpentes fugātur. Quæ onitis ap-  
pellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior.  
Semē veluti cōiunctos corymbos habet. Vis ei ori-  
gani Heraclei, sed multò inefficacior. Sylvestre  
orig



origanum, aliqui panaces Heraclion, alij cum-  
lam vocāt, ex quibus est Nicander Colophonius.  
Folij est origani, ramis tenuibus, dodrantem al-  
tis, in quibus umbelle anethi insunt, flores candi-  
di: radix tenuis, superuacua. Peculiariter per-  
cussis à serpente, folia & flores ex vino poti au-  
xiliantur.

Tragoriganum. CAP. XXIX.

**T**ragoriganū tenuis frutex est, sylvestris ser-  
pyllo aut origano similis, folio & ramulis.  
Quibusdā in locis letius virētiusq; inuenitur, et  
latioribus folijs, satis glutinosum. Alterū exi-  
libus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui pra-  
suum vocauere. Optimum est Cilicium, & Creten-  
se, & Smyrneum, & in Chio Cooque proveniēs.  
Omnia ex calfaciunt, vrinam cient, aluo accom-  
modantur, decocto potu bilem deiciunt, lienosis  
ex aceto bibere prodest, contra pota ixiæ venenæ  
in vino bibuntur, mēses trahunt: peripneumoni-  
cis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur.  
Grata ac mitis eorum potio est: quare cibum fa-  
stidientibus & stomacho acida ructāti, imbecil-  
loq; traditur. Item si à maritima iactatione nau-  
sea, & æstus præcordiorum excitetur: tumores  
verò cum polenta illita discutiunt.

Pulegium. CAP. XXX.

**P**legiū herba vulgaris notitiæ. Extenuat,  
calfacit, decoquit: mēstrua, secundas ac  
partus eicit: pulmonis vitia ex melle & aloe po-  
tum



eū extrahit, & cōuulsis auxiliatur: nausæas stomachiq; intercisiones, ex posca permulcet: atramentum per aluum exigit. Bibitur in vino utilissimè cōtrā serpentiiū morsus. Defectos animo recreat, cū aceto naribus obiectū: gingiuas arefacti cinere corroborat: illitum cum polenta: inflammationes omneis sedat, podagris per se subuenit, impositum vsq; dum rubescat locus: cum cerato varos extinguit, lienosis cum sale utiliter illinitur: decoctum eius ablutas prurigines mitigat, conuersas vuluas corrigit, cōtrā inflationes duritiasq; vuluæ, in desessiones conuenienter adiçitur. Vocant aliqui blechona, quoniā dum floret, gustatum à pecoribus, balatum concitat.

Dictamnium. CAP. XXXI.

**D**ictamnium, aliquibus syluestre pulegium vocatur. Cretensis herba est, acris, leuis, Græcus, pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomēto. Dicta- quodam spissāq; lanugine pubescunt. Florem nullum: ac lum aut semē profert. Præstat omnia quæ sati- sic etiam uum pulegium, sed efficacius multo, nam nō po- Plinius. tum modo, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus eicit. Prodiit in Creta capras sagittis percussas, huius herbe pastu, eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cū polenta tritus. Herba impactos pedibus reliquove corpori aculeos, illitu reficit. Ad lienis dolorem efficax habetur: siquidem ipsum imminuit. Metunt æstate & autumno. Radix eius gustu cal-  
facit.



facit, partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus presidio est. Tanta herbe facultas est, ut olfacta abigat bestias, quæ venenato ictu seuiunt, appensaq; cōtactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis morsibus, infusus succus presentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur. Quod pseudodictamnium vocāt, multis in terris nascitur, aut dicto simile, sed minus quàm illud acre. Eosdē effectus præbet, sed inefficacius multo. Defertur à Creta alterum dictāni genus, folijs si symbrii, ramus maioribus in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles: odor foliorū inter si symbrium & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem sed minus nares ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus, quæ aduersus serpentium iniurias consinguntur, theriaca vocāt.

Salvia.

CAP. XXXII.

**S**alvia siue elelisphacon, frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrangulas, & canas: folia mali cotonei effigie sed longiora, asperiora, crassiora & quæ sensim attritarum quasi vestium scabritiem referāt, hirsuta, subalbida, perquā iucūdo odore, sed graui: semē summis in caulibus sylvestri hormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit & vrinas, decoctū foliorum ramorumque potus, & partus extrahit, & pāstinacæ marine ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnerū sanguinē cohibet, tetra vlcera

ra



ra purgat: testium pruritus sedant rami folia-  
que, si\* decocto eorum foveantur.

\*σῖπ οἶ

Mentha. CAP. XXXIII.

ῥω.

**M**entha, cognita herba est, calfaciendi, ad-  
stringendi, atque exiccandi vim habet.  
Sistit sanguinem, poto ex aceto succo: tineas in  
ventre teretes enecat, venerem stimulat, singul-  
tus, vomitiones, choleraq; sedant terni ramuli  
cum acidi granati succo poti. Suppuraciones dis-  
cutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, ca-  
pitis dolores mulcet: mamas, si tendantur, aut la-  
cte turgeant, compescit: cum sale, canum morbi-  
bus illinitur: aurium doloribus cum aqua mulsa  
subuenit: vulue ante coitum admota, cōceptioni  
resistit: lingue scabritie confecta leuigat: coire  
lac, densariq; in caseum non patitur, si folia po-  
tioneibus lactis immergantur. In summa, stomacho  
utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam  
habet. Sylvestris mentha, Latini menthastrum  
vocant, hirsutior est folio, & prorsus maiore,  
quàm sisymbrium, odore magis viroso: quare mi-  
nus ad sanorum usus expetitur.

Mētha-  
strum.

Calamintha. CAP. XXXIIII.

**E**x calaminthe generibus quedam monti-  
lus familiaris, folia ocimi habens, incana,  
surculos, & caules angulosos purpureum florē.  
Altera pulegio similis est, sed maior: quā sylue-  
stre pulegium ideo appellarūt, quod odore ipsum  
emuletur: nepetam Latini vocitant. Tertia mē-  
thast

Calamē-  
thū offi-  
cinarū.

Nepeta.



thaſtro cognata eſt, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quā ſuperiora, ſed viribus inefficacior. Omnium folia guſtu impenſe feruētia, & acria: radix ſuperuacua. Naſcitur in campeſtribus, aſperis, & aquoſis. Potu aut illitu demorſis à ſerpēte opitulatur. Decoctū potu mēſes, & vrinas expellit: ruptis, conuulſis, orthopnoea, torminibus, cholericis, horroribusq; auxiliatur: regiū morbum expurgat: præſumpta in vino, venenis reſiſtit: tineas ceteraq; interaneorum animalia, cum ſale & melle pota, enecat: nec ſecus cocta crudā ve, ſi iteratur. Elephāticose ſitata adiuvat, ſi poſtea ſerū lactis ebibatur. Folia detrita ſi in vellere ſubiciantur, menſes extrahūt, & partus enecant. Accenſa aut ſubſtrata, ſerpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita, & ſugillata tollunt. Calamintha iſchiadicis imponitur, vt ex alto humores euocet, ſummā cutem exurens. Vermes necat ſuccus auribus inſtillatus.

Thymum. CAP. XXXV.

**T**hymum ab omnibus cognoscitur, ſurculoſus frutex, exilibus folijs, multis & anguſtis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpureaſcente refertis. Gracili ſolo, & petroſo prouenit. Vim habet hanc, vt cum ſale & aceto potum, pituitam per alium detrahat. Decocti ius prodeſt orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menſes, partus, & ſecundas pellit,

vrin



*urinas ciet: cum melle in eclegmate, faciles facit excreationes: recentes tumores discutit, cū aceto illitum: concretū sanguinē dissolvit: verrucas thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit: ischiadicis cum vino, & polenta impositū subuenit: hebetibus oculis in ciboprodest. Perquā vtile pro cōdimento, duntaxat ad vsus eorū, qui rectē valent.*

## A N N O T A T I O.

Herba, quam Medici pro satureia hodie vsurpant, hyssopi folio, thymū magnitudine longē exuperat, vt non esse genuinā, ac hic descriptā, satis eius historia conuincat.

## Satureia. C A P. XXXVI.

*Satureia triuialis notitiæ est: gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamen, & tenerior: defert spicā florū plenā, coloris herbacei. Eadē potest quæ thymum, si modo cōsimili sumptitetur. Aptus sanis vsus: est etiamnum quædam satiuā, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam, commodius in cibos recepta est.*

## Serpillum. C A P. XXXVII.

*Serpillum duorum generum est: Hortēse odore sampsuchū imitatur, atq; in coronas addi solet, cui à serpendo nomen inditum est: quoniā si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores: in macerijs multò procerius asurgit. Siluestre, xygis appellatum, non serpit,*



sed in altitudinē increfcit, ramulos, edens tenues,  
furculosos, folijs refertos, longioribus quā rute, &  
durioribus, angustis: flores incūdē olent, gustanti  
acres: radicis nullus vsus. Nascitur in petris, sati-  
uo efficacius, atq; magis excalfaciēs, & ad medē  
di vsu aptius. Menses trahit, vrinā potu ciet:  
torminibus, ruptis, vulsis, et iocineris inflāmatio-  
nibus, auxiliatur: & aduersus serpētes potu illi-  
rūve: capitis dolores mulcet coctū, adiecto rosaceo,  
& madefactū in aceto: maximē verō phreniti-  
eis, & lethargicis conuenit. Cruentos vomitus se-  
dat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Sampsuchum. CAP. XXXVIII.

**S**ampsuchū in Cypro, & Cyziceno laudatiss-  
simū: secundum sibi locum vendicauit Ae-  
gyptiū. Amaracū gens Sicula, & Cyzicena ap-  
pellat. Herba est ramosa, per terram repens, folijs  
eius calaminthe, quæ tenui folio cōstat, hirsutis,  
& rotundis suauissimum odorē spirat, ideo coro-  
nis inseritur. Vis eius excalfaciens Succus decocti  
potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs  
quos vrinæ difficultas, aut tormina excruciat.  
Illita ex melle arida folia, sugillata tollūt: menses  
subdita in pessa trahunt: cōtra scorpionis ictū ex  
aceto & sale illinuntur: lixatis tumoribūsq; , ce-  
rato excepta imponuntur: aduersus oculorum  
inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ  
illini prodest Acopis malagmaticisq; , calfaciendā  
gratia commiscetur.

℞



**S**ertula Cāpana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam: inflammationem omnem emollit, praesertim quae in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut fanigraci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaveris, intybóve. Recētes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manātia in capite, illita cū creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis: leuat: doloribus aurium mitigādis cruda ex passo instillatur: in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Marum. CAP. XL.

**M**arū herba cognita vulgò, surculosa, flore origani, folijs multò cādidioribus, flore odoratiore. Vim habet, sisymbrio consimilē. Substringit enim, & modicè calfacit: qua de causa illitu serpentia vlcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesium, & Tralleis copiosissima gignitur.

Acinos. CAP. XLI.

**A**Cinos aut aconos à Graecis dicitur, tenui siccoq; ramulo herba, ocimo similis, odo-



rata, sed hirsutior: qua coronæ faciuntur. à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum potest sistit. Illita panos ignemque sacrum sanat.

Baccharis. CAP. XLII.

\* 106-  
Ms. i. o- **B**accharis herba \* fruticosa, quæ in coronas additur cuius folia aspera sunt, media violacea & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamono proximus. Asperum squallidumque; solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulsis, ex alto precipitatis spirandi difficultati, salutaris. Item diurnæ tussi, & urine difficili: menses pellit: contra serpentium morsus utilissimè datur in vino. Recens radix apposita, partum extrahit: puerperis eius decoctum in desensionibus prodest: in diapsmata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt: oculerum inflammationibus, mammis tumetibus à partu, egypcijs incipientibus, ignibusque sacris auxiliantur. Odoresomnum gignit.

Ruta. CAP. XLIII.

**R**uta montana sylvestrisque; sativa, & hortensis acriore est, & in cibis damnata: sativa verò quæ sub ficu arbore nascitur, magis in cibos admittitur. Vtraque urit, calfacit, exulcerat: urinam ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu ciboque leth



lethaliū medicamentū antidotū est, si se-  
men ex vino, acetabuli mensura, ebibatur. Folia  
per se præsumpta, aut cū nuce iuglande, aridi s;  
ficis, inefficaces venenorum vires reddunt: cōtra  
serpentes simili modo sumere cōuenit: genitū tam  
cibo potūve extinguit: cum anetho sicco decocta,  
tormina sedat. Facit ad pectoris laterūmq; dolo-  
res, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis inflā-  
mationē, coxendicum articulorūmq; cruciatus,  
& horrores febrium circuitu repetentes, pota vt  
antē dictū est. Itē ad inflationes coli, vuluæ, re-  
ctiq; intestini, cum oleo decocta, & infusa. Fie-  
minas vuluæ strāgulatu liberat, si à genitali, se-  
de tenus cū melle subijciatur. Feruefacta ex oleo  
& pota, vētris tineas excutit: articularijs dolo-  
ribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illini-  
tur. Eisdē in potu auxiliatur, decocta in vino ad  
dimidias parteis, & oblita. Cruda cōditāq; cibo,  
visus aciem excitat: dolores oculorum illita cum  
polenta lenit, doloribus capitis cum rosaceo, &  
aceto illita auxiliatur, profluentem naribus san-  
guinem sistit trita & indita, testium inflamma-  
tionibus cum laureis folijs imposita: & eruptio-  
nibus papularum cum myrto, & cerato prodest.  
Cum pipere autē, vino, & nitro affricata, albæ vi-  
tiligini medetur. Cū eisdem illita fornicationes  
tollit, & verrucas, quæ thymi florem represen-  
tant: contra impetigines cum alumine, & melle  
vtilissimè imponitur. Succus in mali punici caly



ce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum faniculi succo ac melle peruncti iuuantur: ignem sacrum, ulcera quae serpunt, aut in capite manant, cum acetato, rosaceo, & cerusa persanat: mansa, aliorum ceparumque acrimonia domat. Mōtana, si copiosius estur, interficit. Dū florē promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione. Oportet itaque eam vinctis antea manibus, & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum feles arcere. Adijciunt eam, quae in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, viperis scatet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est: in antidota commodè additur: contra incontinentiam urinae tostum semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly vocatur. Sylvestris ruta sativae similis est. Prodest comitalibus, & coxendicum doloribus: menstrua mouet, partus enecat. Acrior est viribus, quam hortensis, & validior. Sylvestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

Sylvestris ruta. CAP. XLIIII.

**V**ocant etiamnum sylvestrem rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Asiae finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multo, quam alterius ruta longioribus, tenerioribusque, odore graui: flore

re



re candido: capitulis in cacumine paulò maioribus quàm sativæ, rute quæ tribus maximè partibus constat: in quibus triangulum semen, subrofum gustu amarum recluditur, cuius est usus. Semen autumnò maturescit: quod cum melle, vino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur cõtra retusam oculorum ariẽ. Sunt qui eã hanc malam vocent, Syri besasan. Qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam quandam cum moly servet similitudinem: radice nigra, flore candido. In collibus, & leto solo provenit.

## Moly. CAP. XLV.

**M**oly folia habet graminis laticra, humiliter sparsa: florẽ albæ violæ similẽ, sed minorem, ac magnitudine violæ purpureæ respondentẽ, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid, quod alij speciem referat. Radix parva, bulbosa, quæ mirum in modum valet ad aperiendas vulvas, si trita cum irino unguento, in pessa subiiciatur.

## Panaces. CAP. XLVI.

**P**anaces nonnullis heracleum dicitur, ex quo popopanax colligi solet. Plurimum in Bæotia, & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; cõpendij, & quæstus, qui ex eo liquore facitatur, gratia studiose colitur. Folijs est asperis, in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinque partitò divisis: caule, ut ferule, altissimo, qui lanugine quadam in-



canescit, folijs etiam minutioribus obsitus, muscarijs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato feruētēq; radices habet multas ab origine vna, candidas, graueolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succū excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mēsis inciso, profluentem succū eximūt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maximè in hoc succi genere probatur, quā amarissimus, internè albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem inclinans, leuis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. Niger improbat, ac mollis. Adulteratur ammoniaco aut cera: sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluator, & lactescat. Excalfacit, molli, extenuat: horroribus febrium circuitibûsque, vulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio vrine conuenit. Contra vesicæ scabiem ex aqua mulsa aut vino bibitur: menses trahit, fixum enecat, inflationes, quæ vuluam malè habent, duritiasq; ex melle dilutus, discutit: ischiadici



dicis illinitur, acopis & capitis medicaminibus admiscetur, carbunculos rumpit, podagricis cum rura passa illitus subuenit: dolore dentium liberat, canis inditus: oculorum aciem illitus excitat. Ex eo & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta conscissa, vuluæ admota, partus extrahit: ad vetera vlcera efficax est, nudata ossa corpore operit, si trita cū melle illinatur. Semen cum absynthio sumptum, menses pellit: cum aristolochia, prodest aduersus animalia quæ venenum ei aculantur, & contra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

## Panaces Asclepij. CAP. XLVII.

**P**anaces Asclepij caulē à solo emittit tenuē, cubitalem, geniculatum, circa quē folia foeniculi funduntur, sed maiora tamē hirsutioraq; odorata: in cacumine umbella, vbi flores emicant aurei, odorati & acris gustus: radix parua est & tenuis. Auxiliare vim habēt flores et semina, contra vlcera: phagedænis, & tubercula, si trita cum melle imponantur: aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cū oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre organum vocant, alij cunilam, de qua in organi mentione diximus.

## Panaces chironium. CAP. XLVIII.

**P**anaces Chironiū, in Pelio monte maximè prouenit: folium eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gu



stu acris. Pota radix serpentium veneno resistit,  
Illita coma, eadem præstat.

Ligusticum. CAP. XLIX.

Galeno  
Libyisti-  
cum.

\*  $\omega\alpha\rho\alpha$   
Τοῖς Διω-  
γυσί, id  
est, iux-  
ta fossas.

**L**igusticum, quod alij panaceā, alij panaces  
vocat, plurimum in Liguria nascitur, in  
monte Apennino, Alpibus contermino: vnde no-  
men traxit. Panaces incolæ non ab re appellant:  
quoniā & radice & caule, heracleotico panaci  
simile fit, & viribus eisdem præditū. Gignitur in  
altissimis asperisq; montibus, ac vmbrosis, maxi-  
mè verò iuxta fluēta. Cauliculum fert anethi,  
geniculatum, tenuē, & in circuitu folia sertulæ  
campane, molliora, odorata, prope verticem gra-  
ciliora, & longè magis diuisa: in cacumine musca-  
rium, in quo semen dependet nigrū, solidum &  
oblongum, fœniculo proximum, gustati acre, &  
aromacens: radix cādida, heracleotici panacis  
similis, odorata. Radicis seminisq; vis excalfacto-  
ria, concoquens: prodest ad intestinos dolores, tu-  
mores, cōcoctiones. Itē ad inflationes, præsertim  
quibus stomachus turgeat: & contra serpētium  
ictus: vrinas & mēses potu trahit. Eosdem præ-  
stat effectus apposita radix. Semen cum radice  
oxyporis & medicamentis decoquentibus admi-  
scetur: ori perquā vtile: quare propipere vtun-  
tur eo indigenæ, ad obsonia. Adulteratur semi-  
ne quodam simili, quod facile gustu discernitur:  
amarū enim est. Alij semen fœniculi aut seselis  
admiscētes, ligusticum dolo vitiant.

P. 154



## Pastinaca.

## CAP. L.

**P**astinaca sylvestris folia gingidij habet, latiora, subamara: caulē rectū, scabrum: umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio exiguum quiddā cernitur colore purpureo, ferē ad croceum accedente: radix digiti crassitudine dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum vel impositū, menstrua mœuet. Iis conuenit in potione, quos vrinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat; aut si aqua cutē subiit: serpentium morsibus ictibusq; prodest: presumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuvat. Radix vrinam pellit: venerem stimulat, partus apposita eijcit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedenas vlcera purgāt. Satiua ad eadem pollet, efficacior tamen, & cibo aptior.

## Seseli.

## CAP. LI.

**S**eseli Massiliense folia fœniculi habet, crassiora: caulem vegetiorē: umbellā anethi, in qua semen oblongum, angulosum: degustāti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habent: potu stranguriæ & orthopnœæ medentur, suffocationibus mulierum comitialibusq; prosunt, menses & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent, tussim veterem sanant. Semen cū vino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus utile, & cōtra perfrictiones in itineribus, cū pipere & vin

Recetio-  
ribus Si  
ler mon-  
tanum.



& vino bibitur: capris, ceterisq; pecudibus, datur in potu, quò facilius suos fetus enitatur. *Aethiopicum* seseli, folia habet hedere, minora, et ad periclymeni modum oblōga: frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, *Massiliensi* odoratiore, & acriore, multum suavi. *Peloponnense* folia habet cicute, latiora, & crassiora: caulem supra *Massiliensis* magnitudinem, ferulaceum, & latā in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem viribus praeditum est: nascitur in asperis, riguis, et collibus: invenitur & \* in insulis.

\* ipi Añ  
id est, in  
Ida mō-  
te.

*Creticum* seseli.

CAP. LII.

**T** *Ordylum*, quod aliqui *Creticum* seseli vocant, iuxta *Ciliciam* in *Amano* monte nascitur, herbula surculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra vrine difficultatem bibitur, potu cit mēses. Succo seminis, caulisq; virentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

Hic o-  
missa est  
ab inter-  
prete de  
scriptio.

*Sison*.

CAP. LIII.

**S** *Ison* exiguum semē est, in *Syria* natū, apio simile, nigrū, feruens, oblongum. Contra lienis vitia bibitur, vrine difficultatē potu emendat, remoratos menses citat. Quo in cōdimentis,

enm



eum cucurbita, & aceto indigena vtuntur. In cacumine granula multa gerit.

Anisum. CAP. LIII.

**A**nisum in summa excalfacit, exiccat: oris halitū incūdiorē facit, doloris leuamentū præstat, vrinā ciet: aquam, quæ subijt cutem, dissipat, potum sitim cohibet, animalium veneris aduersatur: valet ad inflationes, aluum & alba feminarum profluvia sistit, lac ad mammas elicit, venerē stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus: cum rosaceo tritum, instillatūque, fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non fursufosum, odore præstans. Inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium.

Carum. CAP. LV.

**C**arum, semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit, vrinam concitat, stomacho vtile, os commendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur antidotis & oxyporis: anisi vicem præbet. Radix cocta, pastinacæ modo manditur.

Anethum. CAP. LVI.

**A**ridi anethi comæ seminisq; decoctū potu lac euocat, inflationes & tormina sedat, aluū vomitionesq; sistit, vrinam ciet, singultus lenit, oculorum aciem hebetat, & genituram restinguit assiduè potum. Fœminis vuluæ malo opportunis, ad defensiones vtile, \* condylomata illitus eius cinis tollit.

\* τὸ ὄσπριον  
σπρίσμα  
καὶ ὄσπριον  
καὶ ὄσπριον  
καὶ ὄσπριον  
καὶ ὄσπριον  
καὶ ὄσπριον

Cum



Cuminum satium. CAP. LVII.

**C**uminum satium ori gratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regium appellauit. Secundum locum tenet Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia. & Terentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationesque conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum vua passa, aut lolij farina ceratove. Mensium abundantiam inhihet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profluvia sistit. Colorem bibentium aut peruntorum mutat in pallorem.

Syluestre cuminum. CAP. LVIII.

\* Sic **S**yluestre cuminū, plurimū efficaciusque in Lycia & \* Galatie Asia. atque Carthagine Hispanie gignitur: frutice paruo: dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, veluti serratis, et gingidy diuisura In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus est semen acerosum, gustu satuiacriore: nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina inflationesque: itē contra venenatas bestias, ex vino singultus ex aceto sedat, stomacho vtile, quem humor vexat, sugillata tollit, si manducatum cum melle & vua passa illinatur:



natur: testium inflammationibus, adiectis eisdē illitum medetur. Est & aliud sylvestris cumini genus, satiuo nō dissimile, quod à singulis floribus promit cornicula in sublime exerta, in quibus semen est melanthio simile: quod potum omnium serpentium morsibus presidio est. Calculosis & ijs qui vrinae stillicido vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur sed apud semen feruefactum postea bibendum est.

Ammi. CAP. LIX.

**A**mmi \* Aethiopicū cuminiū appellant, \* pleriq; hoc natura diuersum esse ab illo existimant. Vulgò notū est, semē exile, multò minus cumino, origanum \* resipiens. Eligendum est purum, minimè fursurosū. Vis ei excafactoria, feruēs, & exiccās: facit ad tormina, vrinae difficultatem, serpentium ictus, cum vino potū: menstrua ciet. Miscetur derodētibus cantharidū medicamentis, quae ecdoria vocāt: vt inde exortis vrinae difficultatibus resistat. Sugillata cū melle tollit, colorem potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum vua passa aut resina, vulvas purgat.

Coriandrum. CAP. LX.

**C**oriandrum, aut corianum, vulgaris est notitia, vim refrigeratoriā habens. Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quae serpunt, medetur: epynictidas cum melle vel vua passa, testium inflammationes, carbunculōsq; sanat: cum faba fresa, strumas & tubercula

\* ἰνίοι  
καὶ ττο.  
\* οἱ ἵ  
βασιλι-  
κὸν κύμι-  
νον κx-  
λῶσις  
ἰνίοι ἵ  
&c.  
\* τῇ γέν-  
σει.



ἐλαγος.

bercula discutit: tineas interaneorū expellit \* semen cum passo potum, & geniturā adauget: largius autem sumptum, mentem non sine periculo mouet, quare continuo, & copiosore vsu abstinendum. Succus cum cerusa, spumāve argenti, necnō aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

## Hieracium. CAP. LXI.

**H**ieracium magnum, caulem emittit, asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi: vnde illitum, stomacho æstuantī, inflammationibꝯque prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, vibratis à scorpione vtribus auxiliatur. Hieracium paruum, folia eodem modo obtinet ex interuallis diuisa per ambitū, cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

## ANNOTATIO.

Capitula cicutæ. ] Legitur in Græcis, corruptè ac nullo planè, si quid est in me iudicij, sensu, καὶ φάλακκηωνίων περιμφορῶν. id est, capitula succo papaueris similia. Videtur autem locus ex Theophrasto ac Plinio, quo Oreoselinō cicutæ folio describūt, hoc modo posse restitui: φύλλα κωνείω περιμφορῶν, id



id est, folia cicutæ nō abſimilia: quod cum alijs ſatis aptè cohæret. Velim tamē in hac re, vt & alijs omnibus, ſuo quēque vti iudicio.

Apium.

CAP. LXII.

**H**ortensis apij herba ad eadem, ad quæ co- Noſtrū  
rianum, conuenit: inflammationibus ocu- Petroſe-  
lorum, cum pane aut polenta illinitur: æſtuantē linū, vt  
ſtomachum mulcet: mammarum duritiā ex la colligi-  
tē concreto contrāctam reprimat: vrinam ciet, tur ex  
ſiue crudum, ſiue coctum edatur. Decoctum eius notis plū  
radicis que potu, venenorum noxæ reſiſtit, quum nū.  
vomitiones excitet, alium cohibet. Semen vehe-  
mentius vrinā pellit: contra ſerpētium venena,  
aut epotā argenti ſpumā auxiliatur: inflationes  
diſcutit. Admiſcetur medicamentis, quæ dolo-  
rum leuamenta præſtant: theriacis quoque, ac  
tuſis remedijs. \* Eleoſelinum in humidis naſci- \* Apiū  
tur, ſatiuo grandius, et ad eadem efficax. Oreo- officina  
ſelinum, caule eſt dodrātem alto, ab radice tenui rum.  
exeunte: per cuius ambitū ramuli, \* & capitū-  
la cicutæ, multò tamen tenuiora: ſemine cumi-  
ni, oblongo, acri, & odorato, tenui: naſcitur in  
petroſis & montibus. Vrinam ciet, ſemine ac ra-  
dice in vino potis: menſes trahit. Antidotis, nec-  
non medicamentis vrinam cientibus, & ex calfa-  
ctorijs, inſeritur. Nec hallucinari nos oportet,  
exiſtimātes oreoſelinum eſſe, quod in ſaxis pro-  
uenit: aliud enim eſt petroſelinum. Petroſeli-



num in Macedonia prouenit, in præruptis locis, semine ammij, odoratiore, sapore acri, aroma o-lente. Vrinã cit ac menstrea contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest: laterum, re-num, et vesicæ doloribus in potu subuenit. Admi-scetur antidotis vrinam cientibus. Hippofelinũ,

\* Gale-  
n<sup>o</sup> Smyr-  
nium. de  
quo se-  
quẽti ca-  
pit. Ro-  
manis sic  
dictum  
fuisse, li-  
bro 2. de  
Alim. fa-  
cult. tra-  
dit.

\* Latini clusatrum appellant, aliqui smyrnion, quãuis aliud sit, quod propriè smyrnion dicitur, vt paulò post referemus. Est autem maius & sa-tiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habẽ-te veluti lineas: folijs latioribus, in puniceũ ver-gentibus: coma roris marini, florum plena, depen-dentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflo-rescat: ea semine turgēt nigro, oblongo, acri, so-lido, aromatico: radix dimittitur odorata, candi-da nec crassa, quæ os cõmendat. In vmbrosis & palustribus enascitur. olerũ generis, vt apium. Radix cruda coctã ve estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus preparantur, crudãq; muria condiuntur. Vim hanc habet, vt potu semine ex mulso vino menses cieat: algentes calfacit potu aut illitu: vrine stil-licidio auxiliatur. Radix eosdẽ præstat effectus.

Smyrnium.

CAP. LXIII.

**S**myrnion, quod in Cilicia petroselinum vo-cant, plurimũ in Amano monte gignitur. Caulem habet apũ, & stolones multos: folia la-tiora, sulpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cũ quadam acrimonia iucunda, color



colore in luteum languescēte : capitibus caulium orbiculatis, vt anethi : semine brassica, rotundo, nigro, sapore aspero, sicut myrrha, ita vt alterum alterius loco cedat : radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis : cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atq; squalidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herba, & seminis exalfacere. Folijs muria maceratis ad obsonia vtuntur, aluum sistunt, radicem contra serpentium ictus libere conuenit, tusses et orthopneas mitigat, vrinae difficultati medetur : recētes tumores, collectiones, duritiāsque discutit, illita & vulnera ad cicatricem perducit : partus abortu vitiat, si feruefacta subiiciatur. Semen, \*Intelli-  
 lienis, renum & vesicae vitijs prodest : menses & genō co-  
 secundas pellit : commodè datur ischiadicis in vi-ronariā  
 no, inflationes stomachi lenit, sudores ciet, & rosmari-  
 ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, et nū : sed  
 contra febrium circuitus. eā, quæ

Elaphoboscum. CAP. LXIII. simplici-

**E**laphobosco foeniculaceus caulis est, \* aut ter hoc  
 rorimarino similis, geniculatus : folijs duūm nomine  
 digitorum : latitudine, vt terebinthi, praelongis, appellā-  
 aliquantum asperis, circumfractis : adnata mul-tur. de  
 ta habet, ferentia umbellæ anethi similes, et se-qua ca-  
 mina eiusdem : florem subluteum : radice ternūm pit. lxx.  
 digitorum longitudinis, & crassitudinis vnus, huius li-  
 candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olere bri.



manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium morsibus resistere.

Fœniculum.

CAP. I. XV.

**F**œniculum si herba edatur, aut semen cum ptisana libatur, mammas lacte replet. Comæ decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet: contra serpentium ictus in vino convenienter bibitur: menses ciet: in febribus nauseam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contrite radices & cum melle illitæ, morsibus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, et in sole siccat, in medicamentâ adijcitur, quæ ad excitandâ oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viridi, ramulisq; & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia, quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret rustici demetunt, igniq; admonent, quod facilius vi caloris exudans, gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculum erraticum, siue hippomarathrum. CAP. LXVI.

**E**st & sylvestre fœniculum, magnum: fert autem semen cæchryi simile, cuius radix iunculæ olet, potaq; strangurie medetur: menses imposita ciet: venter sistit, radice aut semine potor, & contra serpentium morsus auxiliatur, calcu-  
lōs. 12.



lōsq; comminuit, & regium morbū expurgat. la-  
ctis abūdantiā facit decoctum foliorū hauſtum,  
& feminas à partu purgat. Traditur aliud hip-  
pomarathri genus, longo, exili, & angusto folio:  
semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex-  
calfaciendi naturam habet, & viribus fenicu-  
lo respondet, sed ad omnia infirmius.

Daucum.

CAP. LXVII.

**D**AUCUM aliqui Daucium vocant. Creti-  
cum folijs feniculo simile, minoribus &  
tenuioribus: caule dodrantali, umbella coriandrī,  
flore albo: semine acri, cādido, hirsuto. suauissimi  
odoris in mādēdo: radix digitali crassitudine &  
dodrātis lōgitudine adoleſcū: in saxosis nascitur,  
& locis sole illustratis. Aliud eius genus, sylue-  
stri apio simile, acre, odoratū, aroma ulēs, feruē-  
tis gūstus. Probatissimū Creticū. Tertium aſi-  
gnatur genus folijs coriandri, floribus albis, capi-  
te & semine anethi, muscario pastinacæ: semine  
oblōgo, ceu cumini, acri. Omnium semē excalfacit:  
potum vrinā, menses, & partus extrahit, tormi-  
nibus liberat, veterē tuſſim mitigat: phalangio-  
rū morsibus potū in vino auxiliatur: tumores il-  
litu discutit. Seminis dūtaxat in alijs generibus  
inualuit vsus: in Cretico, etiā radicis, quæ maxi-  
mē contra venenatorum iniuriā in vino bilitur.

Delphinium.

CAP. LXVIII.

**D**ELPHINIUM, surculos emittit à radice vna  
sesquipedales, aut maiores, à quibus folia



exerunt parua, tenuia, diuifa, praelonga, quæ delphinorum effigiem repræfentant: vnde tractum nomen eſt. Flos violæ albæ non diſſimilis, purpureus: & ſemen in ſiliquis, milio proximum, quo nō aliud vtilius bibi poteſt, ab ſcorpione percuffis. Aiunt enim obiecta herba, ſcorpiones reſolui, atque ignauos torpeſcere: ſemota verò ea, ſeſe recolligere. Prouenit in aſperis & apricis. Alterū eſt delphinium, quod Romani bucinum vocant, ſuperiori ſimile, ſed felix & ramis longè gracilius. Viribus eiſdem pollet, ſed non ita efficacibus.

## Pyrethrum.

## CAP. LXIX.

**P**yrethrum Romani ſaliuarem vocant, folia caulēq; emittit vt daucum ſylueſtre & fœniculum: vmbellāq; anethi, circinatæ rotunditatis. Radix longa eſt, pollicis craſſitudine, guſtu feruidiſſimo. Pituitam elicit: idē in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: manſa pituitam extrahit: ſudores ciet, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficax eſt & contra perfrictiones membrorum, reſolutionēſque eximie conducit.

## Roſmarinus.

## CAP. LXX.

**C**achrys **D**vororifmarini genera: vni fecundū frugiferūq; cuius ſemen canchrys vocatur: folia fœniculi habet, craſſiora & latiora, in rotæ ſpeciem humi ſparſa, iucundè olentia: caulem cubiti altitudine, aut maiore, multis concanū aliis: in



in cacumine umbellam, in qua semen copiosum,  
candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum,  
acre, resinaceum, quod in mādendo linguā exu-  
rit: radix thus redolet, candida, prægrandis. Est  
& alterum omnino consimile, semen ferēs latū,  
nigrum, uti sphondylion, odoratū minimè exu-  
rens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba.  
Verūm id quod sterile dicitur, illorum planè simi-  
litudinem refert: sed neq; caulem, neque florem,  
neq; semen promit. Nascitur in saxosis & aspe-  
ris. Trita omnium herba cōmuniter hæmorrhoi-  
dūm profluvia sistit, sedis inflammationes &  
cōdylomata mitigat, cōcoquit strumas & absces-  
sus, qui ad maturationem agrè perducūtur. Sic-  
cæ radices cum melle vlcera purgāt: torminibus  
medentur cum vino potæ, & contra serpentium  
morsus conveniunt: menses & vrinas cient, ve-  
teres tumores illitu discutiūt. Tam radiciū quā  
herba succus, adiecto melle illitus oculorū aciem  
exacuit. Potum semen ad eadem pollet, si comi-  
tiale malum sentiatur, aut vetus pectoris vitiū,  
auxilio est: regio morbo laborātibus cum vino  
& pipere datur: sudores mouet, cum oleo perun-  
ctum: ruptis & convulsis prodest: podagris, cum  
loliaceæ farina & aceto tritum, illinitur. purgat  
vitilignes, addito aceto quā acerrimo. Semine  
in potionibus vtendum, eius quidem quod can-  
chryn non ferat, quippe illud sua acrimonia ar-  
teriam exasperat. Rosmarinum cum crica na-



sci, folijs lactuce sylueſtris amare aſperioribus, candidioribúſq; radice breui, Theophraſtus author eſt: potúq; idipſum alterutra parte purgare. Canchrys vim habet excalfaciendi, & vehementer exiccandi, quare abſtergentibus medicamentis inferitur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die ſoluatur.

Rosmarinum coronarium.

CAP. LXXI.

**R**osmarinum, quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, deſa, longa, exilia, ſubter incana, ſupernè virentia, \* graui odore. Excalfactoria vi præditum eſt: regium ſanat morbum, ſi decoctum in aqua, ante exercitatiões bibatur: et vbi laboras exercitatiōni ſe crediderit, in balnea deſcēdat, et merum potet. Acopi, gleucinoq; vnguento admiſceri ſolet.

\* Cōmodius marcellus, cū grauitate olera.

Sphondylium. CAP. LXXII.

**S**phondylium folia quadāntenus platani et ſpanacis habet: caules ſexniculaceos, culitali altitudine, aut amplius aſſurgētes, in quorū cacumine ſemē duplex, ſeſeli ſimile, ſed latius, candidius, & magis paleaceū, grauis odoris: flores eius alti, aut pallentes: radice raphani, cādida. Naſcitur in paluſtribus et aquis. Potū ſemen pituitam per aluū extrahit: medetur iccineris vitūs, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vularū ſtrangulationi. Vternos ſuffitu reuocat: cum oleo commodè inſunditur capitibus phreneticis



ticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentia vlcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia: circumrassa eadem, & iniecta callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisque accommodatur: qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Ferula.

CAP. LXXIII.

**E**Viridi ferula medulla pota utilis est ad cruetas excreationes, coeliacosq; & contra viperarum morsus in vino datur, erumpentemq; naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur. sudores ciet, vncto ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: muria cōdijuntur.\* Ferula itaq; caulem profert

\* Desunt in codice nostro graeco, ac antiquissimis quibusque Marcello teste.

Peucedanum.

CAP. LXXIIII.

**P**Eucedanum, caulem emittit tenuem, gracilentum, fœniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa. gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; è plaga succus vmbra mandatur: in sole siquidem confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusus, ne capitis dolor premat, & vertigo sentia-



tur. Affatione radix inutilis fit. Tam lac, quàm succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora: verùm inefficacior succo lacryma habetur, & velocius expirat. Interdum etiã concreta inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adherens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruēs gustu. Ex oleo & rosaceo illitū pencedanum prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, et longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus, in vniuersum, vitijis neruorum, ex oleo & aceto illitū prodest. Fius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veteri nosi reuocatur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur. cauernis dentium inditur, mitigat dolorem: contra tussim efficacissimè ex ouo assumitur, suspirijsq; & torminibus, & inflationibus subuenit: ventrem leniter emollit, lienē absu mit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum, & vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. In cerata, & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta, aut pane calido, aut anetho resolvitur.

ANN



## ANNOTATIO.

\*Herba doctis omnibus pro melanthio recepta, folijs fœniculum potius quàm senecionem videtur imitari, vt certè locum hunc esse aut deprauatum, aut verum ignorari melanthion, sit suspicandum.

Gith, seu Melanthium.

## CAP. LXXV.

**G**ith exilibus surculis fruticat, sæpe binos drantes excedens: folijs \* vt senecionis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui: paruo, ceu papaueris, oblongo, intercurrentibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentiginēs, duritias, tumoresque vetustos, cum aceto illitum: circumsarificatos clauos excutit, cum retere vrina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto, & teda, prodest: teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua vmbilico: destillatione laborantes adiuvat, tritum in linteo, & olfactum: vrinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit, difficultatem spirandi cum vino potum leuat: phalangiorum morsibus ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

Laserp



**L**aserpitium in Syria, Armenia, Media, et Libya nascitur, caule ferulaceo, quem masspetum vocant: folijs apio similibus, lato semine. Radix excafcit: in cibis agrè concoquitur, vesica noxia sugillatis illita cum oleo, et strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis cōuenit cum irino aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur cū putamine mali punici, & aceto decocta: venenis pota resistit: os commendat, cibis aut sali permista. Laser è radice atq; caule scarificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, nō porraceum, odore valens, suau gustu: quod dilutum facilè albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adèò vt ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicū & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequā siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: quod maleficiū deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutiōe. Caulem aliqui silphion, radicem magudarin, & folia masspeton vocauerunt. Efficacissimū laser, mox folia, postremò caulis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctas cū aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorum aciem exacuit, et incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dentium



tium in dolore inditur, aut cum thure in linteo  
circunligatur, aut cum hyssopo, ficis coctis in po-  
sca, os colluitur: ijs prodest, quos bestia in rabiem  
efferata momorderit, vulneribus immissum: va-  
let aduersus venena telorum, & animalia o-  
mnia, quæ virus eiaculantur, potiùs, aut illitum:  
scorpionum plagis oleo dilutum circunlinitur:  
gangrenis præcoërcitis immittitur: & cum ru-  
ta, nitro & melle, vel per se, carbunculis: clauos  
callôsque prius circunrasos vellit: cerato aut ari-  
dorum ficuum carne præmollitum, recentes liche-  
nas ex aceto sanat. Et excrescentia in carne, po-  
lypôsque, si aliquot diebus cum atramēto sutorio,  
aut ærugine illinatur: extuberantia cum forfice  
extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur:  
grauem, subitoque irrauescētē vocem, dilutum  
aqua, sorbitione confestim expedit: ruam illi-  
tum cum melle reprimit: anginis ex aqua mulsa  
vtilissimè gargarizatur. vescentes eo, latiore co-  
lore mangonizant: tussi cōmodè in sorbili ouo da-  
tur, & pleuriticis, in sorbitionibus: in fellis suffu-  
sione, et aqua inter cutē, cum aridis ficis: horrores  
discutit cum vino, pipere, & thure potum: neruo-  
rum contractionibus, opisthotonicisque datur oboli  
pondere deuorandum: herentes gule hirudines,  
gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus  
coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso  
proficit: menses ciet, cum pipere & myrrha po-  
tum: caliacos adiuvat, in acino ruæ sumptum:  
cum



cum lixiuio autem potui datū, repentē conuulsis ruptisq; prodest: ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorū succo ad eadem proficitur, sed multò inefficacius: cum aceto mulso mādatur, ad expediendam arteriā, maximè cū vox retūditur: eo cū lactucis utitur: ex itq; in vicem erucæ. Fertur & altera magadaris in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum. CAP. LXXVII.

**S**agapenum ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimū est translucēs, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanū redolens, gustu acri Prodest laterum, & pectoris doloribus, tussibus vetustis, cōuulsis, & ruptis. Crassam pulmonis pituitā expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis: item cōtra neruorū resolutionē, perfrictiones, & febrium circuitus in potu: in vnguenta protè admittitur: menses pellit, sed fatum exanimat, cum hydromelite potū prodest ex vino haustum serpētium ictibus: olfactum ex aceto, vuluarum strangulatus exiccat, oculorum cicatrices, offusam caliginē, hebetudines, suffusionēsq; detergit. Resoluitur vt laser, ruta, aqua, et amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

**E**uphorbium. CAP. LXXVIII.  
Euphorbium Lilyca arbor est, ferulæ speciem



ciem habens, quæ \* in monte Atlante iuxta \* Ita  
 Mauritaniâ inuenitur. Ea acerrimo succo tur- Plinius  
 get: cuius eximiû feruorem expauescētes incolæ, Græcus,  
 ouillos vêtres elutos, arbori circumligāt, & emi- in Tmo-  
 nus caulem contis incidunt, cōfestimq; è plaga, lo.  
 périnde atq; vase quodam, in ventriculos copio-  
 sus lactis humor effluit, præter id quod humi  
 sparsum, vulnus eiaculatur. Duo succi genera:  
 vnû oroli magnitudine, sarcocolla modo emicat:  
 alterû in ventriculis cōcrescit, atq; vitreum spe-  
 ctatur. Eligēdum est trās lucēs, & acre. Euphor-  
 bium adulteratur sarcocolla, & glutini mistio-  
 ne, sed difficile quidem experimentum: quippe  
 cum leui gustu, os accēsum diu detineat, ad eò vt  
 quicquid ori obijciatur, planè euphorbium resi-  
 piat. Eius inuētio tempore Iubæ regis Libyæ co-  
 gnita extitit. Succus illitu suffusciens discutit:  
 potus tota die exurit: quare melli collyrijsq; pro  
 acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarû do-  
 loribus prodest in odorifera potiōe haustus: squa-  
 mas ossiû eadem die eximit: verûm eo vtētes, ne-  
 cesse est linamētis aut ceratis communire corpus,  
 quo ossa cōuestiuntur. Aliqui memoriæ prodide-  
 runt, percussos à serpente nihil molesti passuros,  
 si incisa osse tenus capitis cute, inritus succus  
 infundatur, vulnûsq; postea consuatur.

Galbanum.

CAP. LXXIX.

**G**albanum succus est nascentis in Syria fe-  
 rule, quod nōnulli metopium vocant. Ma-  
 ximè



ximè laudatur cartilaginosum, merum, thuris  
 effigiem præbens, pingue, minimè lignosum, reti-  
 nens nonnihil adiecti seminis, & ferulæ, gravi-  
 odore, neque valde humidum, neque nimis ari-  
 dum. Adulteratur faba fresa, resina & ammo-  
 niaco. Galbanū excalfacit, vrit, extrahit, discuti-  
 tit: menses ac partus trahit appositum vel suffitu:  
 lentigines aceto & nitro perunctas tollit: deuora-  
 tur ad tussim veterē, difficultatē spirandi, suspi-  
 ria, rupta, conuulsa: aduersatur toxicis: potum  
 cum vino & myrrha. simili modo sumptū mor-  
 tuos partus extrahit: imponitur lateris dolori-  
 bus, & furunculis comitiales, & vuluæ strangu-  
 latus, et vertiginosos olfactu suscitatur: si vratur,  
 fugat nidore serpētes, & perunctos feriri nō pa-  
 titur: serpētes cum oleo & sphondylo circumposi-  
 tum, necat: dentiū dolorem oblitū, aut cauernis  
 inditū, mitigat: vrinæ difficili prodesse existi-  
 matur. Resoluitur ad potiones amaris nucibus, a-  
 qua, aut ruta, aut calido pane, mulsāve, aliās  
 meconio, ere vsto, aut felle liquido. Si purgare  
 Galbanum voles, in feruētē aquam demittito:  
 nanq; cum liquefactum fuerit, eius sordes fluita-  
 bunt: quas hoc modo facile separabis: mundo lin-  
 teo raroq; alligatum in fictili aut area pyxide  
 ita pendeat, vt imum vasis ne tangat: opertōq;  
 vase in feruidam aquam demittito: sic enim  
 syncerum veluti per colum eliquescet, & ligno-  
 sum in linteo remanebit.

Ammon



## Ammoniacum. CAP. LXXX.

**A**mmoniacū, ferula succus est, quā iux-  
ta Cyrenē Aphrica gignit: cuius fruticē  
cū radice agasyllim vocant. Probatnr bene colo-  
ratū, ligni & calculorum expers, thuris similitu-  
dine, minutis glebis, densum, syncerū, nulla sorde  
spurcatum, castoreū odore imitans, gustu ama-  
rum. hoc genus thrausma, id est, friaturā appel-  
lant: quod verò terrā, & calculos collegit, phyra-  
ma. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis ora-  
culū, succū stillante ferulacea arbore. Mollit, ex-  
trahit, calfacit: tubercula duritiasq; discutit: po-  
tum, aluum soluit: partus extrahit, lienam consu-  
mit, drachmæ pondere haustum: articulorum co-  
xēdicūmq; doloribus liberat: auxilio est anhelā-  
toribus, orthopnoicis, comitialibus. Itē quibus hu-  
mor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut  
cum ptisane succo sorbeatur, cruentam vrinam  
pellit: albugines oculorum absterget: genarum  
scabritiam alsumit: tritum autem cum aceto,  
& impositum, iocineris lienisq; duritias sedat:  
discutit tofos, qui in artubus concalluerunt. cum  
melle aut cū pice illitum, lassitudines, & coxen-  
dicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro, &  
cyprino oleo, vice acopi.

## Sarcocolla. CAP. LXXXI.

**S**arcocolla, lacryma est arboris in Perside  
nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu  
amara. Vulnera glutinat, oculorum fluxiones in-



hibet: emplastris inseritur. Adulteratur ad misto gummi.

Glaucium. CAP. LXXXII.

**G**laucium, succus est herba, quæ ad Hierapolim Syriæ nascitur, folijs ferè corniculati papaveris, pinguioribus tamen, in terrâ sparsis, odoris tetri, gustus amari: tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semi frigidis clibanis calfaciunt indigenæ, usq; dñ flaccescant, deinde contusis succum exprimunt: cuius est usus ad oculorum medicamenta, ut pote cum inter initia refrigeret.

Glutinum. CAP. LXXXIII.

**G**lutinum, quod xylocollan, alij taurocolla vocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est, & translucens. Nigrum verò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasq; cutis delet: ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumque pustulas erumpere non patitur: vulneribus prodest, melle aut aceto madefactum.

Glutinum piscium. CAP. LXXXIII.

**I**chthyocolla, gluten piscium, veter est piscois cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, subaspermum, minimè seabrum, & quod celerrimè liquescit. Utile emplastris, capitis & leprarum medicamentis, & tetanothris, quæ cutem faciem erugant, & extendunt.

Viscum. CAP. LXXXV.

**V**iscum optimum est recens intus porraceum,  
extris



extra fuluū, quod asperi nihil, aut fursurosi conceperit. Fit acinis in robore nascētibz, bux eo fruticis folio: contusum acinū lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui cōmanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus: quinetiā inuenitur in quorundā fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit parotidas, tubercula, ceterasq; collectiones ad maturationē perducit: cum resina autem, & cera pari, epinyctidas in splenio sanat: vetera ulcera abscessūsque, quos cacoēthes vocant, ex thure mollit: lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum, & impositum absomit: cum sandaracha, aut auripigmento illitum, vngues extrahit: mistum cum calce, & vini fece, suam vim intendit.

## Aparine. CAP. LXXXVI.

**A** Parine ramis multis, et paruis fruticat, Vulgd  
 asperis, quadrāgulis, per intervalla orbi aspergunculo foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: se- lu.  
 men durū, retundū, concavū, albū, vmbilici figura asperitate vestiū tenaci. Ea pastores coli vice utuntur, ad eximendos à lacte pilos. Seminis: caulium, ac foliorum succus, potus contra viperarum phalangiorūque morsus auxiliatur: infusa aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita strumas discutit.

**A** Alyssum. CAP. LXXXVII.  
 Lysson exiguus frutex est, vnicaulis, sub



aspera, rotundis folijs fructu dupliciũ scutorũ effigie, in quo est semen, quad. imtenus latũ. in mōtib, & asperis locis emicat. Eius decoctũ singul-  
tus sine febris, potu discutit: idẽ efficit, si quis eam  
aut teneat, aut odoretur: cũ melle trita, vitia cu-  
tis in facie, & lentigines emendat. cõtusa in edu-  
lio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa  
salutaris esse creditur, & hominibus atq; anima-  
libus fascini amuletum. Purpureo linteo circun-  
ligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. CAP. LXXXVIII.

**A**sclepias, ramos emittit longos: folia he-  
dere, longa: radices numerosus, tenues,  
odoratas: floris virus graue: semẽ securidacẽ. na-  
scitur in mōtib. Radices ex vino potẽ tormini-  
bus auxiliantur, & contra serpentium iñtus. Fo-  
lia aduersus vuluẽ mammarũmq; vlcera, quẽ  
cacoẽthe vocant, illinuntur.

Atractylis. CAP. LXXXIX.

**A**tractylis, spina est cnico similis, folia  
multolōgiora ferens in summis virgis,  
magna parte nuda, aspera q; qua fœmine pro fu-  
sis vtuntur. capitula in cacumine spinis horrent.  
flos luteus, quibusdã in locis purpureus inueni-  
tur: radix tenuis. superuacua. Coma, semẽ & fo-  
lia cũ pipere, & vino teruntur vtilissimẽ contra  
scorpionum iñtus. percussos tradunt quandiu ea  
teneatur herba, nullum experiri dolorẽ, ipsũm-  
que deposita statim recrudescere.

Pol



## Polycnemum.

## CAP. XC.

**P**olycnemon, frutex est surculosus, folijs organicaule, vt pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridũ cum aqua, efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. Ad vrinae stillicidia ruptaq; cum vino bibitur.

## Clinopodium.

## CAP. XCI.

**C**linopodion frutex est folijs serpilli similis, surculosus, duũ dodrantum altitudine. nascitur in petrosis. Flores, marrubij modo, ex intervallis distincti speciem lectipedum præbent. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad cõvulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses & partus pellit: & pensiles verrucas, quas acrochordonas vocant, eiicit, aliquot diebus potũ. aluum sistit decoctum ad tertias, potũmq; si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

## Leontopetalum.

## CAP. XCII.

**L**eontopetalon, caulem emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alijs concavũ, & in cacumine semina parva duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemone similes, punicei coloris: folia brassicæ, sed papaveris diuisura: radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis. nascitur in arvis & segetibus. Radix auxiliatur serpētium ictibus, ex vino pota: nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.



## Teucrium.

## CAP. XCIII.

\* Cha- **T**eucrium, siue, vt alijs placet, teucriis, herba  
mædry- est virgæ referēs effigiem, \* trissaginis simi-  
os. litudine, tenui folio, non multum à cicere alieno.  
hec in Cilicia iuxta Gētiadem Cissadēmque vber-  
tim provenit. Recens cum posca, aut aridæ ferue-  
factæ ius, potu lienem potenter absumit: lienosis  
cum aceto & ficis illinitur: item serpentium mor-  
sibus ex aceto solo, sine ficis.

## Trissago.

## CAP. XCIII.

\* Plin. **C**hamædryis Græcis, alijs chamædrops, Lati-  
nis trissago dicitur. sunt qui eā teucrion ap-  
pellauere, propter eam quam cum teucrio seruat  
similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis fru-  
tex dodrantalis, folia habens exigua, amara,  
\* effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè  
colore: purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in  
quod & aqua decocta, potu tussibus, indurato lieni, vri-  
ipsum ne difficultati, incipientibus hydropicis, auxi-  
herbe liatur: cit menses: partus extrahit, lienē ex ace-  
pulchrè to pota cōsumit: aduersus serpentium venena ex  
cōgruit. vino, potu, illitūque efficacissima. Trita digeritur  
in pastillos ad supradicta: purgat vetera vlce-  
ra, cum melle: cum oleo illita, caliginē oculorum  
discutit: natura eius est calfacere.

## Leucas.

## CAP. XCV.

**L**eucas mōtana, latioribus quàm vrbaña fo-  
lijs, semine acriore, amariore, ori ingrato,  
efficacior tamē quàm satina habetur. Viraque ex  
vino



vino contra animalium venena, præcipuè marinorum opitulatur.

## Lychnis CAP. XCVI.

**L**ychnis coronaria, flore est albæ violæ simili, sed purpureo, quo carollæ factitantur. Cōtra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbanæ similis. Bilem per aluū detrahit, semine duabus drachmis potu: ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbae appositu, scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

## Lilium. CAP. XCVII.

**L**ilia coronamenti se dedūt, Liria à quibusdam vocata. E quibus vnguentum tēperatur quod aliqui lirinū, alij susinum appellāt, nervos & priuatim vuluæ duritias emolliens. Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruē facta, ambustis proficiunt: aceto condita, vulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati vlcerū, & ad recentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat: vuluā emollit, mēses ciet, vlcera cicatrice obducit: cū melle detrita, nervis precis, luxatisq; medetur: vitiliginēs, furfures, et lepras emendat: vlceraq; in capite manantia expurgat: al stergit faciem & erugat: teritur in aceto cum hyoscyami folijs: & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum



morsibus serpentium aduersatur: ignibus sacris se-  
 \* πορφυ- men & folia cum vino illinuntur. Tradunt & \* ru  
 γὰ, id est bra esse lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphy-  
 purpu- lie, efficacissima vnguentis nascuntur.  
 rea.

## Ballote. CAP. XCVIII.

Vulgo **B** Alloten, nomine alio nigrum marrubium vo-  
 Prasium cant: caules edit quadrangulos, nigros, sub-  
 foetidum. hirsutos, complures ex una radice: folijs maioribus  
 \* σφοδρὸν quàm marrubij, hispidis, cingentibus per interval-  
 λὰ καὶ ὅρα la caulem, \* subrotundis, graueolentibus, apiastro  
 i. rotundio- proximis: unde aliqui apiastrum eam vocauerunt:  
 ribus. candidi flores vniuersi verticillato ambitu, caule  
 Plinius coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus,  
 nigriori folijs ex sale illitis: feruenti cinere flaccescunt folia  
 bus: quod ut condylomata reprimant: purgant & sordida  
 magis ar ulcera cum melle.

ridet.

## Apiastrum. CAP. XCIX.

Melissa  
 officinis.

**M** Elissophyllum siue melithena, id est, apia-  
 strum, id sibi nomen usurpauit, quoniam  
 apes ipsa herba delectantur. cauliculi & folia bal-  
 lote, de qua paulo ante dicimus, similia essent,  
 nisi maiora, tenuioraque, nec ita hirsuta specta-  
 rentur: citreum malum olent. Folia cum vino po-  
 ta at illita prosunt contra ictus phalangiorum,  
 scorpionumque: item aduersus canis morsum. Deco-  
 cto eorundem gratia, foueri prodest: desessionibus  
 foeminarum ad ciundos menses conuenit, dentes  
 eodem in dolore colluuntur. dysentericis infundi-  
 tur. Fungorum strangulationibus folia, addito ni-  
 tro,



tro, potu auxiliatur: torminibus & crithopnoicis delinclin. Illita cum sale strumas discutit, vlcera purgant, articularios dolores illita sedant.

Marrubium.

CAP. C.

**M**arrubium, frutex est ab radice ramosus, cādicans, subhirsutus, quadrāgularibus ramis: foliū pollicē aequat: subrotundū, hispidū, rugosum, gustu amaro: semē in caulibus, & ex intervallis: flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter aedificia, ruinas, & rudera.

Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspiriosis, tussietibus, & ad tabitudinē redactis. Crassam è pectore pituitam, cum sicca iri eicit. Mulieribus à partu nō purgatis datur, vt menstrua & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserūt, aut à serpentibus demorsi sunt: vesicā renēsque ledit. Folia cum melle illinuntur sordidis vlceribus purgandis: pterygia nomāsque sistunt, laterū dolores mitigant. Succus folijs cōtusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuvat: naribus regium morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Stachys.

CAP. CI.

**S**tachys frutex est, marrubio similis, sed longior folia ferēs numerosa, hirsuta, rata, praedura, cana, odoris iucundi, & complures virgas



ab radice exeuntes, marrubio candidiores: nascitur in montibus & asperis. Vim habet excaesatoria & acrem. foliorum decoctum potu, pellit menstrua & secundas.

## Phyllitis. CAP. CII.

**P**hyllitis, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora. fena aut septena, recta, quæ parte anteriore leuia cernuntur. à tergo autem pendiles quasi vermiculos tenues ostendunt: in umbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo: neque caulem, neque florē, neque semen profert. Folia in vino pota serpentium morsibus aduersantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta aluus exercet, potui datur.

## Phalangium. CAP. CIII.

**P**halangium à quibusdā phalangites vocatur. \* ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, in diuersa tendentes: flos candidus. lilio similis, multas incisuras habens: semine nigro, lato, ad lenticule dimidiata figuram, multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra eruitur: prouenit in collibus. Huius folia, semen, flos cum vino pota, auxiliatur contra scorpionum phalangiorumque, & telus: tormina quoque discutiunt.

## Trifolium. CAP. CIIII.

**T**rifolium, Græci triphylon, alij oxytriphylon. alij meny-anthes, alij asphaltion, vocant. Frutex supra culti altitudinem attollitur, virgas habens tenues, iuncæas & nigras, unde ramulares

\* οἱ ὅ  
καὶ τὰ  
τῶν λῶ-  
καὶ κα-  
βαρ κα-  
λοῦσι.

\* Ita  
Plinius.  
Græcus

παχὺ ἰ-  
στ, craf-  
so.



lares euascentur appēdicula, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto arbori familia: ūs recēter enatis rutę odor inest: ubi autem adoleuerunt, bitumen olent. Florē edit purpureum, semen quadātenus latū, subhirsutū, ex altera extremitate exertum, antennę modo corniculum gerens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, vrinę difficultati, comitialibus, & ūs qui aquę intercutē principia sentiunt, fœminis quoq; vuluę rētio opportunis, auxiliantur: menses ciunt: ternę drachmę ē semine dari debent, ē folijs verò quaternę. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradūt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorūmq; decoctū fotu dolores eorum finire, quos serpentes percusserint: qua autē aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiā alius foueatur, qui vlcus habuerit, pērinde afficitur vt à serpēte demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum vino potui dedere: & in quartanis, quaterna, vt quę februm circuitus discuterent. Radix antidotis inseritur.

Polium.

CAP. CV.

**D**Vo genera polij: montanum, cui teuthrio nomen est, & cuius est vsus. Tenuis frutex est, candidus, dodrantalis semine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborū speciem præ se ferente, paruo, cano hominis capillo simili, grauiter clente, non sine quadā iuauitate. Alte

rum



rum fruticosius, non usque adeò valens odore, & viribus infirmius. Potum feruefactius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, merbo regio, & lienosis ex aceto: stomachum malè habet: caput doloribus afficit, aluum & menses ciet: substratum suffutimve serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

## ANNO TATIO.

Scordii hoc loco depicti vberimus ubique est prouentus, ut non iniuria eorum sit explosus error, qui aliud sylvestre, aut obuiam quamcunq; herbam allium subolentem, hoc esse opinabantur. Est autem præter id, Plinio libro 25. cap. 6. authore, aliud quoddam genus latioribus foliis ac menthastræ effigie, cuius nuper in monte quodam ad Viennam ingens copia nobis obtulit: nec alia sanè nota, quam foliorum cum menthastræ similitudine, à scordio huic authori descripto, differre obseruauimus.

## Scordium. CAP. CVI.

**S**cordium in montibus & palustribus nascitur, folijs trissaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus: quadrangulis caulibus, sub rubro flore. Herba vim excelsæ toriæ habet: urinam cit. Cocta recens arida ve cum vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, & urine diffic



difficultatem, binis drachmis cum hydromelite: crassamen purulentū pectore expellit. Facit aride farina ad veterem tussim, rupta, conuulsa, si cū nasturtio, melle & resina misceatur in eclegmate: inflammata modicè præcordia, cerato excepta, recreat: cū aceto acri aut aqua, podagris cōuenienter illinitur: mēses imposita mouet: vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excrementias in carne cohibet. Succus ad eadē vitia bibitur. Inter prima efficax Ponticū natione, Creticūmq;.

## Tussilago. CAP. CVII.

**T**ussilaginis folia sunt maiuscula quàm hederæ, sex aut septem à radice, sul albida à terra, supernè virentia, in plures angulos exeuntia, caulis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quoniam cum caule confestim exuitur: inde nonnulli his vacare existimauerunt. Radix tenuis est & superuacua: nascitur in amœnis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro & omnibus inflammationibus illitu medētur. Aride fumus per infundibulū hianti ore raptus, hos sanat, qui sicca tussi atque orthopnea infestantur: pectoris vomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite, & pota emortuos partus eūcit.

Vulgò  
ungula  
caballina.

## Artemisia. CAP. CVIII.

**A**rtemisia magna ex parte in maritimis nascitur, absynthij modo fruticosa, maioribus



ribus & pinguioribus folijs, ramisq; huius quidē genera duo. Vnū letius habitiusq; , folijs virgīsq; latioribus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vnicaulis nomine appellāt, tenuē herbulam, simplici caule & minuto, floribus scattente tenuibus, flauo colore: hæc iucundiorē quā precedēs efflat odorē. Vtraque excalfacit, extenuat: feruesactæ cōuenienter in muliebres desessus adiūciuntur, ad detrahēdos menses, partus, secund.ūq; item ad præclusiones vuluæ, & eiūsdē inflammationes: calculos cōminuunt: remorata mvrinam cient: menses pellunt pubi illitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadem quæ in sefio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

## Ambrosia. CAP. CIX.

**A**mbrosia pusillus frutex est, ramosus, altitudine triū palmorū folijs rute, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, pērinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florē pariūt, odore vinoso suauis: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illitu adstringere humores, qui in aliquam partem inumbunt.

## Botrys. CAP. CX.

**B**otrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multis alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia: tota suauem odorem



odore spirat: quare vestimentis interponitur: inuenitur in torrentiū ripis, & cœnuallibus. Pota orthopneas muleet. Hanc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Geranium. CAP. CXI.

**G**eranion folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflammationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluæ, in summis alis sursum spectantia grauius capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dētes. Nullius in medicina vsus.

Pes colicinus  
vulgò.

Gnaphalium. CAP. CXII.

**G**naphaliū folijs mollibus ac albis protomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam.

Typha. CAP. CXIII.

**T**ypha folium edit \* ciperidi simile: caulem altum, leuem, aquabilem: florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculā aliqui nomināt. Huius herbe flos suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

\* Intelligi  
se quam  
libro I.  
cyperum  
vocaui.

Circæa. CAP. CXIIII.

**C**ircæa, quā & dircæa aliqui vocāt, folijs est hortensis solani, agratis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdam veluti corniculis: dodrantali radice, tri-

plex



plici ferme aut quadruplici, cādida, odorata, ex-  
calfaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vento  
perflatis. radicis tusse pondo quatuor, in sextarijs  
tribus vini dulcis, per diem & noctem maceran-  
tur, potuq; triduo vulvas expurgant. Semē in sor-  
bitionibus datum, lacte mammas nutricū explet.

Oenanthe. CAP. CXV.

Videtur  
nostra  
Filipen-  
dula.

**O**Enāthe folia habet pastinacæ: florem can-  
didum: caulem crassum. palmi altitudine: se-  
men atriplicis: radicem magnam, in multa rotū  
da capitula extuberantē: nascitur in petris. Cau-  
lis eius & folia, cum mulso vinopotā secūdas ej-  
ciunt. Radix ē vino, vrinæ stillicidio conuenit.

Conyza. CAP. CXVI.

Vulgò  
pulica-  
ria.

**C**Onyze duo genera. quæ parua vocatur, cdo-  
re præstantior est: maior verò frutice altior  
& folijs laticribus, graui odore. Vtriusque folia  
oleæ similia, hirsuta, pingua. In maiore caulis bi-  
nūm cubitorum altitudine attollitur, in minore  
pedem æquat. Flos fragilis, lutei coloris, subama-  
rus, qui in pappum abit: radices superuacua. Suf-  
fitu substratuq; frutex totus serpentes fugat, cu-  
lices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter  
illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac vul-  
neribus. Flores & folia cum vino ad mēses par-  
tūsq; cūciendos bibuntur: item cōtra vrinæ stilli-  
cidia, arquatum morbū, & tormina: comitiales  
potā ex aceto adiuvant. Decoctum in defesioni-  
bus medetur vuluæ malis. Impositus succus abor-  
tum



tum facit. Ex oleo efficaciter horroribus \* obli- \* ἡρώα.  
nitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est &  
tertium conyzæ genus, caule crassiore, ac molli-  
re: solijs mediæ inter maiorem ac minorem am-  
plitudinis, minimè autem pinguibus: multò gra-  
uioris hæc est odoris & iniucundioris, sed ineffi-  
caciior. Prouenit locis non riguis.

Hemerocallis, siue lilium syluestre.

## CAP. CXVII.

**H**emerocallis folium & caulem habet lilij,  
porraceo colore: flores in caule per singu-  
los exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilij  
diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore per-  
quàm pallido: radix magna est atq; bulbosa: quæ  
pota, aut cum melle & lana in pessa apposita,  
aquam educit & sanguinem. Folia trita mam-  
marum inflammationes à partu contractas, ocu-  
lorumq; collectiones mitigant. Radix & folia  
igni ambustis vtilissimè illinuntur.

## ANNOTATIO.

Leucoion, si nominis etymon spectes,  
albam significat violam: solet tamè & pro  
lutea, cœrulea ac purpurea vsurpari. Nunc  
officinis Arabum ferè sequacibus, Cheiri  
nuncupatur.

Leucoium, siue viola alba.

## CAP. CXVIII.

**L**eucoion vulgaris est notitiæ, sed in floribus  
differentia quedam: nanq; aut cœrulei, aut



albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Luteæ  
verò precipui in medicina vsus. Huius aridi flo-  
res feruefacti in defensionibus, valent cōtra vul-  
ua inflammationes, & mēstrua expellunt: sa-  
nant oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas  
sedis. Semen duūm drachmarum pondere ex vi-  
no potum, aut cum melle inditum, menses, secun-  
das & partus extrahit. Radices cum aceto illi-  
te, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

## Cratægonum. CAP. CXIX.

Videtur **C**Rategonū, siue, vt alijs placet, crateonon,  
genus folijs melampyro simile est, multis calamis  
Persica- ex vna radice emicantibus, multorūmq; genicu-  
ræ, non lorū: semine milij: nascitur magna ex parte in  
macula- opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum  
tum. est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die  
post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis  
aque duobus mulier, ante cōceptū quadraginta  
diebus: & vir modo cōsimili, totidem diebus an-  
te coitum hauriat, virilis sexus partū futurum.

## Phyllum. CAP. CXX.

**P**hyllum, quod & elecphyllō vocatur, duūm  
generum est: quod autem thelygonū appel-  
lant, in saxosis musci modo gignitur, folio oleæ,  
sed magis herbaceo: caule tenui, breui: radice  
exili: florē albū profert: semen papaueris maiu-  
sculum. Sed arrhenogonū cetera huic simile, so-  
lo fructu distat: habet enim racemosum quiddam  
deflorentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon  
potu,



potu, masculis sexus facere partus, vt thelygonon  
feminei, proditur. Horum Crateus author  
est: sed huiusmodi historiâ tenus, mihi produxis-  
se visum est.

Testiculus.

CAP. CXXI.

**T**esticulus, quem Græci cynosorchin vocât, Offici-  
folijs circa imam caulis partem in terra nis falso  
stratis, leæ molli similibus, lōgioribus, angustio- satyriō,  
ribus, lauihus: caule dodrantali: floribus purpu- de quo  
reis: radice bulbosa: oblonga, oliuæ modo angu- seq. cap.  
sta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: in-  
feriore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices  
coctæ, vt bulbi: ex quibus si maiorem edant viri,  
mares generari dicuntur: si minorem femine,  
alterum sexū. Addunt, in Thessalia mollem mu-  
lieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos  
coitus: aridam verò, ad inhiilendos: & alterum  
alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sa-  
buletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea  
authore vocatur, quoniam radix ad multa vti-  
lis sit. folijs est porri, latioribus, oblongis, pingui-  
bus, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: flori-  
bus penè purpureis, radice testiculis simili: quæ  
illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpere  
eadem non patitur. Abolet fistulas, & illitu in-  
flammationes lenit. Aride radices nomas inhi-  
lent: sanantq; putredines, & oris vlcera cacoe-  
the: aliuñ sistunt è vino potæ. De hac, eadem quæ  
de testiculo canis, produntur.



## Satyrium. CAP. CXXII.

**S**atyrium aliqui trifolium vocāt, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nudum: florem lilij effigie, cādidum: radicem bulbesam, māli magnitudine, fuluam intus vt ouum, candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam: quā in vino nigro aūstero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendum eadum concumbendi incesit cupiditas, si quidem ea proniores ad venerē fieri affirmant. Est & alterum satyriū erythronium siue erythraicon, id est rubrū, semine lini, maiore, duro, leui, splendente: quod fertur, non secus atq; scincus, libidinem excitare. Cortice radicis gracili, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci, nō ingrato ori: in montosis & apricis enascitur. Venerē, vt produnt, si omnino manu teneatur radix, stimulat: eōq; magis, si bibatur in vino.

## Horminum. CAP. CXXIII.

**Vulgo Galli - H**orminum herba est, folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentie siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semē recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fuscūq; inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est vsus. Ad venerem stimulandam, cū vino bibi volunt. Purgat cū melle argemæus albuginēsq; et illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiā extrahit



trahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est il-  
litæ herbæ. Syluestre magis viribus pollet: quare  
vnguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. CAP. CXXIIII.

**H** Edysaron, quod vnguentarij peleciniũ, id  
est securidacam vocant, frutex est, folijs ci-  
ceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum  
modo adũcis, quod ancipitẽ securim æmulatur,  
vnde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho  
vtile in potu. Additur in antidota. Cũ melle an-  
te coitus subditũ, cõcipiendi spem adimit. Nasci-  
tur in segetibus & hordeis.

Onosma. CAP. CXXV.

**O** Nosma, \* oblonga folia habet, ad similitudi- \* οἱ ὄσ  
nem anchusæ, longitudine quatuor digito- μαλα.  
rum, & vnius latitudine, mollia, in terra iacen- οἱ ὄ φλο  
tia, sine caule, sine semine, sine flore: radice niti- νίτηρ. οἱ  
tur longa, tenui, infirma, rubescente: gignitur in δὲ ὄνο-  
asperis. Folia in vino pota partus extrahunt. νίη κα-  
Pregnans, si eam supergrediatur, abortum fa- λοῦσι.  
cere dicitur.

Nymphæa. CAP. CXXVI.

**N** Ymphæa nascitur in paludibus & sta- Nũc Ne  
gnatibus aquis, folijs fabæ Aegyptiæ, mi nuphar.  
norib⁹, & lōgioribus alijs in summa aqua, alijs  
demersis pluribus ex radice eadem prodeũtibus:  
flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente  
cũ defloruerit, vt rotundum malum, aut pa-  
paueris caput extuberat: nigro semine, denso &



lato, lenti gustus: caulis est levis, niger, minimè crassus, Aegyptiae fabae cognatus: radix nigra, scabra, clauae similis, quae autumno secatur. Sicca cū vino pota coeliacis, dysentericisq; auxiliatur et lienē absūmit. Radix stomachi ac vesicae doloribus illinitur, vitiliginēs ex aqua emēdat: imposita cū pice, alopecū medetur. Eadem contra veneris insomnia bibitur: siquidem ea prorsus adimit, pota assidue aliquot diebus, genitalēq; infirmat. Idem semen potū efficit. Nymphae nomen sibi vēdicasse videtur, quoniā aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Beotiae Aliarto. Est & altera nymphaea, cuius flos blephara dicitur, folijs antè dictae radice alba, scabra, flore luteo, nitēte, rosae simili. Huius semē & radix, cōtra faeminarū profluvia efficaciter ex vino bibūtur. Nascitur in Thessalia, amnē Peneo.

Androsaces. CAP. CXXVII.

**A**ndrosaces herba est amara, tenues spargens iūcos, sine folijs, folliculos in capitulis habēs, in quibus semen cōtinetur: gignitur in Syriae maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis urinam ciēt. Idem effectus est semini potō, & herbae decocto: podagris utiliter illinitur.

Asplenium. CAP. CXXVIII.

Ceterach  
officinis.

**A**splenū, aliqui scolopendrium vocant, aliū splenion, aliū hemionū, folijs est multis,  
scol



scolopendrea animali similibus, ab radice una  
 prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxiſq; ſi-  
 liceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec ſemē  
 habet: folia \* filiculae modo diuiduntur, ſubter fla \* Poli-  
 ueſcentia hirsutaq; , ſupernè viridia. Vim hanc podum.  
 habet folia in aceto ſeruſacta, vt per dies qua-  
 draginta pota, lienē abſumant: quibus etiā con-  
 tritis lienem ex vino illini oportet. Stranguria,  
 & regio morbo prodeſt, ſingultū ſedat, calculos  
 in veſica cōminuit. Cōceptum adimere creditur,  
 per ſeſe aut cum muli liene appenſa. Tradunt no-  
 ctu, ſilente luna, huius rei gratia effodiendam.

## A N N O T A T I O.

Ruellio & Fuchſio lingua ceruina nunc  
 appellata: quam alij, minus rectè fortaiſis,  
 Phyllitida ſuſpiciantur, de qua ſuprà Ca-  
 pite C I I.

Hemionitis.

CAP. CXXIX.

**H**emionitis, quam aliqui ſplenion vocant,  
 foliū emittit dracūculi, lune modo incur-  
 uum: radicibus coheret multis, tenuibus: nun-  
 quam flores, neq; ſemen, neq; caulem gignit: in  
 petroſis naſcens, aūſtero ſapore. Ea ex aceto  
 pota lienem abſumit.

Anthyllis.

CAP. CXXX.

**A**nthyllis duplex eſt: quaedam enim lenti-  
 ſimillima, folijs mollibus, rectis ramulis,  
 palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur  
 in ſaliſ terris, & à ſole illuſtratis, nō in ſulſo ga-



\* Cha- *stu.* Altera est folijs ramulisq; \* aiugæ similis,  
 mæpi- hirsutioribus tamē, breuioribus, & asperioribus:  
 tyi. flore purpureo, odoris admodum grauis: radice  
 cichory. Pota drachmis quatuor vrinæ difficul-  
 tati, renibusque plurimum prodest. Tritæ, vuluæ  
 pituitas emolliunt, cum rosaceo, & lacte imposi-  
 te, vulneribus medentur. Quæ autem aiugæ simi-  
 litudinē refert, præter alia, pota cum aceto mul-  
 so comitiales sanat.

Anthemis.

CAP. CXXXI.

Offici- *nis* *camo* *milli.* *Cuius* *no* *minum* *varietas* *ab inter* *prete* *missa* *est* *di.* *extenuandi* *q;* *potu,* *&* *in* *se* *ssione,* *pellunt* *mē-* *strua,* *partus,* *vrinam,* *calculosq;* *aduersus* *infla-* *tionem,* *&* *ilei* *t tormenta* *bibuntur:* *bilem* *suffusam* *expurgant:* *iocinerum* *vitia* *sanāt:* *decocto* *earū* *vesicæ* *foventur.* *Ex* *omnibus* *his* *generibus* *ad* *calculos* *efficacissima* *est,* *quæ* *florem* *purpureū* *habet,* *cuius* *amplitudo* *maiuscula* *est:* *hanc* *pro-* *priè* *beranthemon* *vocant.* *Ea,* *cui* *leucanthemo* *nomē* *est,* *item* *quæ* *chrysanthemon* *dicitur,* *vi-* *mentius* *vrinam* *ciunt.* *Aegylopijs* *illitæ* *meden-* *tur:* *commanducate* *ulcerum* *eruptiones* *in* *ore* *san*



sanant. Nonnulli in clysterilus ex oleo vtuntur, teristurq; in farinam, ad aligendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri: radix quoq; sicca ri, dūmq; ingruit necessitas, binæ partes herbae dari, modo floris aut radicis pars vna, modo contra floris partes due & herbae vna, permutatim duplicato pondere, alternis diebus: bibere autem oportet in vino mulso, diluto.

Parthenium.

CAP. CXXXII.

**P**Arthenium aliqui amaracon vocant, folijs *Vulgò*  
est coriandri, tenuibus: flore per ambitum *matrica*  
albo, intus melino, odore sutuiroso, sapore amara-  
ro. Siccatum cum aceto mulso, aut sale potū, non  
secus atq; epithymum, & bilem & pituitam de-  
trahit: suspiriosis prodest & melancholicis. Her-  
ba sine flore à calculosis, et anhelatoribus magna  
utilitate libitur. Valet decoctum ad insidendum  
in duritia vulvarum, & inflammationibus. Illini-  
tur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

ANNOTATIO.

Non sunt sequendi, qui Cotulam foetidam vulgò dictam pro hoc obtrudūt. Nam præter quàm quòd folia illius nullā aut saltem parvam cum fœniculo habeant similitudinē, flos eius nō totus luteus (quod in illo tamē requiritur) sed per ambitum albus, ac intus tātū luteus cōspicitur: quod haud dubiè Dioscorides, si Cotula illa ve-



rum esset Buphthalmum, minimè, vt nec in Parthenio, Narcisso, & Anthemidos, prima specie, silentio prætermisisset.

Buphthalmum. CAP. CXXXIII.

**B**uphthalmum (quidam cachlam vocant) tenues emittit cauliculos, mollesque: folia feniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, vnde nomen traxit circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores duritijsq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Pæonia. CAP. CXXXIIII.

**P**æonia siue glycysside, Græcis aliquibus penthoron dicitur: sunt qui ideos dactylos radicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas, folia in glandis habet: in femina verò, smyrnæ more diuiduntur. Summo caule siliquas emittit, veluti\* græcas nucas: in quibus, quæ dehiscunt, multa granula rubra, acinis puniceorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix maris [tenuis] digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba: femina radicibus cæu glandes circiter septem aut octo inherens, vt in hastula regia. Furminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses nucis græce magnitudine pota: sic ventris doloribus cum vino

auxil

\* Amygdalas intellige.



auxiliatur. Valet contra regium morbum, et renum, ac vesicæ dolores. Decocta in vino aluum sistit. Rubra grana rubentis menses sistunt, decem vel duodecim pota in vino austero et nigro: stomachicis & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorū eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, vulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut vino. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.

Lithospermum. CAP. CXXXV.

**L**ithospermon à seminis duritia nomen accepit: folijs est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorū speciem exhibent: folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & editis locis. Vim hanc habet, vt semine cū vino albo potu calculos frāgat, pellātq; vrinam.

Vulgo  
milium  
solis.

Phalaris. CAP. CXXXVI.

**P**halaris cauliculos emittit Zeæ culmis similes, à minutis ac nullius vsus radicibus, multos duūm palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamen ac dulces: semen candidum, oblongū, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mēsurā potū, ad eadem efficacē







guam, que ad labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulum: unde sibi cognomentum arrogauit: radix dauci. Nascitur in silientibus, & asperis. Radix ex vino pota urinā ciet. Altera est lonchitis, quā aliqui asperam lonchitin dicunt: folia scolopendriū emittit, sed asperiora maioraq; , ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

Althæa. CAP. CXXXIX.

**A**lthæa, quam alij iliscum vocant, in syluestriū maluarum genere est, cui folia vt cyclamino, rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. \* Althæa appellatur, quod inter primas sit utilis, et pluribus polleat remedijs. Decocta enim in vino aut aqua mulsa, et per se cum imponitur tusa, efficax est contra vulnera: itē ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflationes, nervorum rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit. & ad cicatricē perducit. Cocta, vt dictū est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthināve, vt malagmatis lētor fiat, facit ad vulnū inflammationes, præclusionēsq; in pēsis subdita. Decoctū eodem fungitur munere: onera vulnū, reliquiāsq; à partu extrahit. decoctæ \* succus ex vino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorū cruditati-

Vulgō  
Bismal-  
ua, &  
Malua  
uiscus.  
\* Ab αλ  
θηω,  
quod me-  
deri si-  
gnificat.

\* & si-  
hs.

bus



\* *sup*  
*offi.* bus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis: den-  
 tium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto  
 inde ore. Viride semen siccumq; tritū, vitiligines  
 in sale \* perunctas emendat: eodem cum oleo &  
 aceto peruncti, à venenatis non feriuntur. Valet  
 contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones,  
 aluiq; profluuium. In posca autem decoctum bi-  
 bitur, contra omnes vesparum, apum, similiūq;  
 aculeatos ictus. Folia cum olei momento, morfi-  
 bus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquā,  
 trita radice addita, sub diuo addensari.

Alcea.

CAP. CXL.

Herba  
 Simeo-  
 nis vul-  
 gō.

**A**lcea syluestrium maluarū generi assi-  
 gnatur: folia habet diuisa, verbenace  
 proxima. caules treis aut quatuor, cortice cāna-  
 lino vestitos, florem rosæ, paruum: radices albas,  
 latis, quinq; aut sex, cū plurimum cubitales:  
 quæ cum vino aut aqua potæ, dysentericis ru-  
 ptisq; medentur.

Cannabis.

CAP. CXLI.

\* Fortè  
 cupato-  
 riū vul-  
 gatum.

**C**annabis satiuā planta magni in vita vsus  
 ad robustissimos funes factitandos: felijs  
 fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus:  
 semine rotundo, quod largiore cito genituram  
 extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter  
 aurium doloribus instillatur. \* Syluestris cānabis  
 virgas fert althææ similes, minores, nigriores, &  
 asperiores, culti altitudinem æquantes: folio sa-  
 tiuæ, nigriore et asperiore flore lychnidis, subru-  
 bro:



bro.femine & radice althææ. Decocta radix, illatu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorū dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.

Anagyris.

CAP. CXLII.

**A**Nagyris \* frutex est arboris instar, perquàm gravis odore folijs \* agni, virgisque : flore brassicæ : semen in siliquis non breuibz gignit. subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durefcit vna mature- scente. Tenera folia trita tumores illitu repri- munt. si partus hæreat & secunda mensesq; mo- rentur, drachmæ pondere bibuntur in passo : sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino. Difficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciet.

Cepæa.

CAP. CXLIII.

**C**Epea portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in vino pota, vrine stillicidio, & vesicæ scaliæ laborantibus, opitulantur : maximè id præstat, si cum decocto radicū asparagi eius, quem myacanthon, hoc est, corrudam vocant, bibatur.

Alisma.

CAP. CXLIIII.

**A**lisma, \* alijs damasonion appellat. folia ei plātaginis, nisi angustiora essent, ciniosa, conuexaq; in terrā : caule simplici, tenui, adiecta.

\* οἰ ᾧ

ἀνὰ γυ-

ρὸν. ὅτι

ᾧ ἀνο-

ρὸν κα-

λοῦσι.

\* ῥιτι-

cis.

\* Vulgò

planta-

go aqua-

tica.

\* Vox

la ex Plin.

adiecta.

cub



cubito altiore : capitibus thyrſi : flore tenui can-  
dido, pallescente : radicibus tenuibus, vt veratri  
nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus : aquo-  
ſos amat tractus. Radix, ſi drachma vna aut  
altera bibatur, his conuenit, qui leporem mari-  
num deuorant, aut à rubetis ranis demorſi  
ſunt, aut opium hauſerunt : terminibus atq; dy-  
ſenterie, per ſe, aut cum pari modo ſeminis dau-  
ci, potui datur. Conuulſis, & contra vitia vuluæ  
prodeſt. Herba ſiſtit aluum, menſtrua pellit, tu-  
mores illita mitigat.

Onobrychis.

CAP. CXLV.

**O**nobrychis, folia habet lentis, longiora pau-  
lò : caulem dodrantalem : florem puniceū :  
radicem parua : naſcitur in vliginofis & in-  
cultis. Herba ſuapte vi, ſi trita illinatur, tuber-  
cula diſſipat : cum vino pota, ſtrāgurias ſanat :  
illita ex oleo, ſudores mouet.

Hypericum.

CAP. CXLVI.

Noſtra  
Perfo-  
rata.

**H**ypericum aliū androſemon, aliū corion, aliū  
chamæpityn appellant, quoniā ſemen odo-  
re refinam imitatur, ſurculaceo frutice, dodran-  
tali, ſubrubro, folio rute : flore luteo, qui digitis  
tritū ſanguineum ſuccum remittit, qua ex cau-  
ſa androſemon cognominatur : ſubhiſuta ſili-  
qua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudi-  
ne : ſemine intus nigro, reſinoſi odoris : gignitur  
in locis cultis et aſperis. Vrinā ciet, menſtrua pellit  
appoſitum : tertianis, quartanisq; cum vino po-

tum



tum liberat. Semen quadraginta diebus haustū,  
ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, am-  
bustat sanant.

Alcyron.

CAP. CXLVII.

**A**Scyrum siue ascyroides, hyperici genus  
est, magnitudine distans, fruticosius, ma-  
iores habēs ramos, surculosiores, rubentēsq; folia  
tenuia: flores luteos, & fructum resinofum, lype-  
rico nō ab simile: cuius attritu digiti ferē cruentā-  
tur, qua de causa androsēmū vocauere. Vfus semi-  
nis ad ischiadicos, potū in Hydromelitis sextario:  
nā biliosa recrementa amplissimē detrahīt: sed  
assiduē dare oportet, donec sanitati restituan-  
tur. Illinitur & ambustis efficaciter.

ANNO TATIO.

\*Vinoso succo. ] Marcellus sanguineo  
vertit, qui non vt Ruellius δινώδην, sed po-  
tius ἀμαρνώδην, vti capite de hyperico, legis-  
se videtur: quæ fortē lectio magis genuina.  
Nam & Plinius libr. 27. cap. 4. Androsæmi  
comam tritam sanguineo succo manare,  
tradidit.

Androsæmum.

CAP. CXLVIII.

**A**ndrosæmō ab hyperico, ascyroq; differt,  
quod fruticet ramulis surculis, ac te-  
nuibus: rubētibus virgīs, & folijs rube, triplo aut  
quadruplo maioribus, quæ trita \* vinoso succo  
manant: cōplureis alūhal et in cacumine, vtrin-  
que expensas, pinnatasq;: circa quas, flores pu-

v



silli, lutei: & in calyculis semē papaveris nigri, in-  
signe lineis. Huius comæ trite resinofum odorem  
reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum,  
biliosa alui excremēta pellit: ischiadicis maximè  
medetur sed à purgatione aquam exorbere oportet.  
Herba ambuclis illita medetur, vulneribus  
sanguinem cohibet.

## Coris. CAP. CXLIX

**C**Oris, quod aliqui hypericon vocant, frutex  
est folio ericæ rubro, pinguiore, ac minore,  
non altior dodrante. suavis, odoratus: acris. Potū  
semen menses trahit, & vrinas: cōtra phalāgio-  
rū morsus, ischiadicos, & opisthotonicos ex vino  
potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opi-  
sthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. Radix vi-  
no decocta potāq; defectis opē ferre creditur: sed  
laborantē interpotandum quā optimè cooperari  
licet: siquidem corpus totum desudabit, ex qua  
re pristinam agilitatem recuperabit.

Vulgo  
Ira ar-  
thritica.  
\* ωο-  
αυρ &  
i. sutcur  
na.  
\* πικρα,  
id est, sic  
quenti-  
bus.

## Aiuga siue chamæpitys. CAP. CL.

**A**iuga herba in terra repēs: \* incurva si-  
milis: folijs semperuiui minoris, multò to-  
nuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ra-  
mos \* densis, odore pinus, flore tenui, luteo, vel cā-  
dido: radice cichorij. Folia septem diebus in vino  
pota, regio morbo medetur: & quadraginta die-  
bus ex hydromelite, ischiadicos sanant: dantur  
peculiariter vrina difficultatibus, iocineris, &  
renum vitij terminosis profunt. Ea apud Hera-  
cla



eleam Ponticam, p[er]inde atque antidoto contra  
aconitum v[er]untur, bibentes decoctum. Ad ante-  
dicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta:  
trita in farinam & cum fico in pilulis sumpta,  
aluum emollit: excepta melle cum aris squama  
& resina deijcit: apposita ex melle, vuln[er]a vitia  
extrahit: mammarum duritias discutit: vuln[er]a  
glutinat: vlcera quae serpunt, cum melle illita, co-  
hibet. Alterum est genus aingae, cubitalibus ra-  
mis, in anchorae speciem incuruatis, praetenui-  
bus, coma. supradictae: flore candido: semine  
nigro: haec etiam pinum redolet. Tertia mas  
nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, pi-  
lofis, caule aspero, candido: luteis flosculis.

Semine iuxta alas. Resipit & haec pinum,

Haec duae vim superioris obtinent,

sed non vsque adeo  
efficacem.

## TERTII LIBRI

FINIS.

» 2





PEDANII

## DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medicinali materia,

LIB. IIII.

IOANNERVELLIO Sueßionensi

interprete.



**T**ribus aut libris, amantissime  
Aree, tradidimus odoramenta,  
ol'a, arbores, vngueta, anima-  
lia, frumenta, olera, radices. suc-  
cos, herbas, seminaq;. In hoc au-  
tem quarto differemus de radicibus, & eis, quæ  
restant, herbis.

Betonica. CAP. I.

**C**Estron psychotrophon vocitatur, quoniam  
frigidis locis inueniatur. Latini betonica  
appellat. Herba est, caulem ferens tenuem, cu-  
biti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia  
quercus, mollia, longa, in amitu diuisa, olera-  
ta, prope radicem maiora: in summis caulibus,  
semen velutisatureie spicatum inest. Decerpta  
huius folia siccantur, plurimos ad vsus. Radi-  
cibus nititur, vt veratri, tenuius. Quæ ex hy-  
dromelite in potu, pituitosam vomitionem euo-  
cant. Folia dari delent ruptis, conuulsis, mulieri-  
bus



bus vuluæ malo opportunis, & ad laxandos vteri strangulatus, denarij pondere cum hydromelite: tres in vini sextario drachmæ, contra serpentium morsus elibuntur. Herba magna vtilitate illatis à serpente vulneribus illinquitur: aduersus etiã venena drachma ex vino pota cõuenit: præsumpta ea, si venenum hauriatur, nil il nocebit: *vrinã ciet. aliu subducit: medetur comitialibus* & infans, pota ex aqua: & iocineris lienisq; vitis, drachmæ pondere in aceto mulso: cõcoctione adiuuat, si quis eã fabæ magnitudine secundum cœnam cum melle cocto deuorarit: modo cõsimili acida ructantibus propinatur. Stomachicis eam manducare & succu deuorare proderit si postea dilutum vinum sorbeatur: Datur sanguinẽ excreantibus, tribus obolis, cum diluti vini egelidi cyatho: *ischiadici, renum & vesicæ doloribus,* ex aqua: aquæ inter cutẽ binis drachmis ex hydromelite, si febricitat: sin aliter, ex mulso: regio morbo laborantes recreat, menses pellit, drachmæ pondere cum vino pota: aluum purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem cyathis. Facit cum melle ad tabem & purulentam excreationem. Folia sicca tritaque fictili vase reconduntur.

Britanica.

CAP. II.

**B**ritanica aut vetonica, folia habet syluestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu adstringentia: radicem tenuem & breuem:



caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris & consillarum vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lyfimachia. CAP. III.

**L**ysimachia, quam aliqui lytrō appellāt, caules emittit cubitales altioresve, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectionem supprimit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensum abundantiā sistit, in pello sanguinis profluvio subuenit, si nares ea herba obturentur: vulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, ceu polygonum.

CAP. IIIL.

Nūc Cē-  
tinodia.

**P**olygonum mas ramos habet teneros & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terrā, vt gramen, repunt: folia ruta, sed molliora longiora q̃; semine sub omnibus folijs turgescēte: vnde marem appellari volunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruenta excreationi, cholera, alui fluxionibus, & vrine stillicidio: nam vrinam apertē ciet. Cum vino potus, contra serpentium morsus



fus auxiliatur, datúrque in febris per horã ante  
 significationes: feminarũ profluvia impositu si-  
 stit: idem succus purulentis auribus\* instillatur. \* κρῖ  
 Facit eximie ad genitalium vlcera, cũ vino, ad- πρὸς ὠ-  
 iecto melle, decoctus. Stomachi feruori, sangui- Τελχίας  
 nis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus  
 sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus  
 vulneribus folia illinũtur. Sanguinaria femina  
 fruticat vno caule, arundi ni teneræ simili, densis  
 geniculis, & in se tubarũ modo farctis: articulos  
 in orbẽ cingunt apices, foliolis piceæ similes. Radi-  
 cis nullus vsus: nascitur in riguis. Huic quoque spif-  
 sandi refrigerandiq; natura, ad eadem valens,  
 sed inefficacior.

Polygonatum. CAP. V.

**P**olygonatum nascitur in montibus, frutice Vulgò si-  
 cubito altiore: folijs lauri, latioribus, & le- gillũ Sa-  
 uioribus. sapore mali cotonei, aut punici, cũ qua- lomonis.  
 dam adstrictione flores per singulos foliorũ exor-  
 tus promit, cãdidos, folijs numerosiores, incepta à  
 radice supputatione: radicem habet albam, mol-  
 lem, longam, crebro geniculatã, densam, graueo-  
 lentem, digitum crassitudine æquantem: quæ vul-  
 neribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas Est quã  
 in facie delet. Latini

Clematis. CAP. VI.

**C**lematis humi serpit: leto, pinguiq; solo pro- Vincam  
 uenit, viticulas spargens crassitudine iunci peruin-  
 exiguas: folio lauri figura & colore, multò mino- cam vo-  
 cant.



ra. Ea cum caulibus in vino pota, alui profluvia  
 & dysenterias sedant: subdita in pessa cum lacte  
 & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vulue medē  
 tur. Dolores dentium cōmanducata finit: imposi-  
 ta serpentium morsibus, iuuamentū præstat. Fer-  
 tur etiam contra aspidū iētus ex aceto pota opi-  
 tulari. Gignitur in terrenis. Est & altera clematis,  
 Flāmu- que viticū solū emittit ramulū, rubescentem,  
 la vulgò lentum: folium gustu admodum acre, ac exulce-  
 rans: repit per arbores, vt smilax. Semen tritum,  
 pituitā bilēque detrahit, in aqua aut hydrome-  
 lite potum. Folia eius illata lepras purgant. Cum  
 lepidio conditur ad cibos.

Polemonia. CAP. VII.

Polemoniam alij philateriam, Cappadoces  
 chiliodynamin appellant, ramis exilibus,  
 \* Poly- vtrique pinnatis: folijs paulo quā rutæ maio-  
 goni. ribus, ac longioribus, calaminthæ aut \* sanguina-  
 rie proximis, quibus in summis velut corymbi  
 \* Stru- dependent, nigro semine: radice cubitali albican-  
 thio. te, \* radicle simili: nascitur in montosis & aspe-  
 ris. Bibitur in vino radix contra serpentes & dy-  
 senteriam, & ex aqua aduersus vrinæ difficulta-  
 tem, & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto  
 drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis pla-  
 gæ alligatur. Tradunt, eum, qui radicem gusta-  
 nerit, à scorpione non feriri: eūque, si iētus sit,  
 nihil molesti passurum. Dentium dolorem mani-  
 fa mitigat.

AN



## A N N O T A T I O.

\*Flores lutei. ] Ne moueâre ficubi fortè,  
vt nos plerisque locis, candidis floribus cõ-  
spexeris: solent enim pro loci varietate in  
vna eadèmq; herba flores non rarò com-  
mutari: id quod Dioscorides etiam in Atræ-  
tylide, ac multis aliis plantis fatetur.

Symphytum, siue alus.

## CAP. VIII.

**S**ymphyton petraõ, id est alus, nascitur in pe-  
tris, ramis tenuibus, paruis, origano simili-  
bus: capitulis thymi: \* surculosum totum, odo-  
ratur, gustu dulce, saluam ciens: longa radi-  
ce, subrusa, digitali crassitudine. Decoctum in  
aqua mulsâ & potũ pulmonis vitia purgat: san-  
guinem reijcientibus, & renum malis, ex aqua  
datur: ad dysenteriam, rubraq; fœminarum pro-  
fluvia, in vino decoctum: ad cõuulsa verò & ru-  
pta, ex aceto mulso bilitur. Quin & cõmandu-  
catum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vul-  
nera recentia enterocelâsq; conglutinat, & illitu  
cohibet. Carnes autem cũ symphyto decoctæ coa-  
lescent. Est & alterum symphyton, quod aliqui  
pecton vocant: id caulem emittit bicubitalem,  
aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, vt son-  
chi inanem, circa quem breui interuacante spa-  
tio, folia exeunt angustâ, buglosso proxima, ob-  
longa, hirsuta: caule secundum angulos quosdã  
striato. folijs tenuibus ex alarum sinu prodeunti-

\* Ita

Plin.

Græcus

φυλῶδες

id est, li-

gnosum.

Nunc

Cõsolida

maior.



bus, in quibus \* flores lutei, & circa caule velut verbasci semina emicāt. Tam caulis, quàm folia, aspera lanugine horrent, tactūq; pruritum concitant radices demittūtur: foris nigrae, intus candidae, viscosae quarū est vsus. Tritae & potae cruentis excreationibus, ruptisq; proficiūt, recētia vulnera illita cōglutināt: carnes quoq; si cōcoquantur, cogunt additae: inflammationibus, praesertim sedis, cum senecionis folijs vtiliter illinuntur.

Holostium. CAP. IX.

**H**olostii herba est pusilla, tribus quatuorve digitis supereminens extra terram, folijs viticulisq; coronopo aut gramine proximis, gustu adstringentibus: radice alba, praetenui usque in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum: nascitur in collibus terrenis. Vsus eius adrupta, in vino pota: nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

Stoebe. CAP. X.

**S**toebe vulgaris est notitiae: cuius semē & folia stringunt: quapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoq; purulentis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis prosunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Clymenum. CAP. XI.

**C**lymenum caulem fert fabae, quadratū: folia plātaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, ut in iride, & polyporū cirrhis. Probatissimum est ē montibus. E frutice toto cum radice



dice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: coeliacos, rubraque; foeminarum profluvia, refrigerando infrenat. sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut siliqua recentibus vulneribus imposita, ea ad cicatricem perducunt.

## Periclymenum. CAP. XII.

**P**ericlymenon simplex fruticat, ex interval  
lis parua folia habens: ipsum amplectentia,  
subcandida, hederacea: inter folia surculi exeunt,  
in quibus baccae, hederæ similes: flos fabæ, candi-  
dus, aliquantum rotundus, & quasi in folium  
procumbens: semen durum, & quod difficile eu-  
latur: radice rotunda, crassa. Nascitur in arvis ac  
sepibus, convolvens se adminiculis, propter assiden-  
tibus. Semen eius postquam ematuruit collectum,  
& in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur  
in vino, quadragenis diebus, lienem absomit, las-  
situdinem discutit: sed urinam ciet, statim à sexto  
die cruentam. Orthopnoeæ, & singultui prodest:  
partum accelerat. Folia sunt eisdem viribus præ-  
dita, quæ tricenis septenis diebus epota, sterilita-  
tem facere produitur: perunctis ex oleo, febrium  
algores abigunt.

Vulgo  
Caprifolium,  
& Matri-  
sylvia.

## Tribulus. CAP. XIII.

**T**ribuli genus unum terrestris, folijs ad effi-  
giem portulacæ, tenuioribus, viticulis in ter-  
ra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris:  
iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum  
genus



genus, aquis familiare, quod in fluminibus natū  
comam exerit, aculeos condens: filiis latis, & pe-  
diculo longo: caule parte summa, quā ima cras-  
siori. Adsunt ei & capillamenta quædam spica-  
cea. Semen durum, ab altero nō abhorrens. Vterq;  
refrigerantis & inspissantis est nature: idē in-  
flammationes omneis cataplasmate adiuuat. Vl-  
cera in ore erumpētia, putredines, gingiuas, ton-  
sillās q; persanat. Succus ex his colligitur, ad ocu-  
lorum medicinas. Semen dum recens bibitur, cal-  
culosis iuuamentum affert. Drachma terrestris  
tribuli pota, illitā ve, ictos à vipera recreat: cōtra  
venena cum vino aptissimē bibitur. Decoctum  
eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Stry-  
mona amnem habitant, virenti tribulo equos sa-  
ginant, & è dulci semine & esculento panem,  
quo vescuntur, faciunt.

Limonium. CAP. XIII.

**L**imonium, folia habet beta, tenuiora & lon-  
giora, decem, sæpe plura: caulem tenuē, re-  
ctum, lilio equalem. Seminibus rubris scatentem,  
que gustata adstringunt. Semen tritum, & ex  
vino acetabuli mensura potum, dysentericis cœ-  
liaci q; prodest: rubra fœminarum profluvia si-  
stet. Nascitur in pratis & palustribus.

Lagopus. CAP. XV.

**L**agopus herba sistit aluū in vino pota: aut  
in febris, ex aqua. Eadem inguini alligatur,  
in inflammatione. Nascitur in segetibus.

Med



## Medium. CAP. XVI.

**M**edio in saxis & opacis nascitur. folia habet \* iridis: caulem tricubitalem, & in eo \* Alij florem grandem, purpureum, rotundum: semine seridu. cnici, minuto: radicem dotrantalem. crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinā, & ex melle decocta, rubros menses facinarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potum, menstrua pellit.

## Epimedium. CAP. XVII.

**E**pimedium, caulis est nō magnus, hedere folijs, denis atque duodenis, neq; florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammae incrementum non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post menstruas purgationes, quinque diebus in vino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

## Gladiolus. CAP. XVIII.

**X**iphion, alijs phasganon, alijs macheronion, Romani gladiolum, vocāt: nomen inde accepit, quid folium gladij præbeat specie. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo mucronatum, neruisumq;. In caule exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinē digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, vna pusillorum bulborū modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est superna



perna vberior: nascitur in aruis. Superior cū thure illita, admisto vino, spicula & aculeos è corpore extrahit. panos cū lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solet. Menfes imposita trahit. Superiori radice ex vino pota, venerē stimulari, & inferiore sumpta sterile, cere tradunt. Superiore quoq; vtiliter infantium enterocelis, cū aqua potui dare precipiunt.

Sparganium. CAP. XIX.

**S**parganiō, aliqui xiphidion vocant: folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia: in summo caule veluti pilule prominent: in quibus semen. Contra serpentis venena, radix cum vino datur.

Xyris. CAP. XX.

**X**yris, folia habet iridis, latiora, & in cacumine mucronata: quorum medio caulis erumpit, satis crassius, cubitalis, ex quo siliquæ triangulares dependent: in quibus purpureus flos, in medio puniceus semen in folliculis simile fabis, rotundū, rubrū, acre: radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis vulnera, fracta q; efficax est: aculeos & spicula omnia citra molestiā extrahit, adiecta floris aris tertia parte, & radice centaurij ac mellis quinta: tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passobilitur, ad conuulsa, rupta, coxendicō dolores stragurias & alui profluvia. Semen tribus obolis potū, urinā vehementius impellit: & cum aceto, lienē absomit.

Ana



## Anchusa. CAP. XXI.

**A**Nchusa, quæ alio nomine calys, aut onocleie appellatur, folia habet lactucae in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra multa, ab radice quoque uersum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate prouenit, ac manus inficit sanguineo colore: lato sole nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & vetera ulcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polëta medetur: lepris & vitiliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vuluæ indita. Eius decoctum renum vitæ, lienis, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt alium folia in vino pota. Radice pigmetarum vtuntur ad vnguentorum spissamenta. Est & altera, quam aliqui alciadiod, aut onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera, ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceum vergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, quæ mensibus sanguineum succum fundunt: in sabulosis nascitur. Vis ei folijsque inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime viperarum, auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu: nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, cum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen maducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum lyssopo & nasturtio pota, latus ventris tinsas excutit.

Lx



Lycopsis.

CAP. XXII.

**L**ycopsis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, folijs lactuce, longioribus, asperioribus, latioribusq; crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus: flore in ijs paruo purpurascens: radice rubra, & adstringente. nascitur in campastribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea ignibus sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Echium.

CAP. XXIII.

Vulgò  
lingua  
hircina.

**E**chium, folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamen, subrula, & pingua spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutæque utroq; latere folia, expensa, pinnataq; nigra, in summo caule breuiora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt: & radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo à serpentibus ex vino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia & semine idem præstāt munus Lumberum dolores sedat, in vino aut sorbitione sumpta, & lac extrahit.

Ocimastrum.

CAP. XXIII.

\* Melanthij.

**O**cimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos: siliquas hyoscyamo similes, semine, ut \* gith, nigro pregnantibus. Vim habet semine in vino potum, qua viperarum caterarumq; serpentium morsibus



sibus medeatur. Datur ischiadicis cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

Erinus.

CAP. XXV.

**E**Rinus nascitur apud fontes & flumios, folijs ocymi, sed minoribus, parte superna diuisis, dodrantalibus surculis quinis senisve, flore candido: semine nigro paruo & acerbo: folia & caules \* lacteo succo turgent. Semen drachmis \* Sic duabus, in quatuor mellis cyathis, oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & Graco nitro instillatus, aurium dolores sedat. *Plin. In Graco simpli-*

Gramen.

CAP. XXVI.

citer,  
Succo.

**G**Ramen geniculatis serpit ramulis, à quibus radices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata, dura, &, vt arundinis parua, lata, in exilitatem fastigiatur, eaq; iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & vrinae difficultatibus: calculosa etiam vesicae excrementa comminuit. Est & arundinaeum gramen, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, praesertim in Babylone, id, quod iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutuli: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, robustis, ac dulcibus. Succus si in vino cum melle pari, & myrrhae dimidio deco-



quatur, adiiciaturq; piperis & thuris tertiae por-  
 tiones, probatissimum erit oculorum medicamen-  
 tum: id in aerea pyxide reconditur. Decoctum radi-  
 cis idem, quod herba, praestat. Semen vehemens  
 urinam impellit, aluum vomitionesq; sistit. Natum  
 in Cilicia gramen, quod incolae cinnam appellat,  
 boues inflammat, si eo virenti saepe pascantur.

Sideritis.

CAP. XXVII.

Nunc **S**ideritin aliqui heracleam vocant: folia habet  
 herba marrubij, sed longiora, satis ad frondem quer-  
 Iudai- cus aut salviae accedentia, minora tamen, & aspe-  
 ca, & ra: caules edit quadratos, dodrantem altos, ac  
 Tetra- quandoque etiam maiores, non iniucundi gustus,  
 bil. aliquantumq; substringentis: in quibus per inter-  
 stitia orbiculata vertebrae, ut in marrubio, spe-  
 ctantur, & semen in eis nigrum: nascitur in pe-  
 trosis. Illita folia, suapte vi, vulnera sine inflam-  
 mationis periculo iungunt. Altera sideritis li-  
 num cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, nu-  
 meroso, utrinque per oras diviso: pediculo longo,  
 prodeuntibus ex summo alarum sinu surculis, lon-  
 gis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato,  
 aspero, in quo semen continetur, quam beta retun-  
 dius aliquantulum, ac durius. Huius vis, foliorumq;  
 ad vulnera, precipua est. Sideritin aliam esse tra-  
 dunt, quam Crataeas heracleam vocat, in mace-  
 rarijs, & vineis nascentem, folijs ab una radice mul-  
 tis, coriandro similibus, circa cauliculos dodran-  
 tales, teneros, laeves, subcandidos atque subrubi-  
 cundos:



cundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea vis est, vt quauis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

Achillea.

CAP. XXVIII.

**A**chillea, quibusdā Achillea sideritis, do-  
drantales aut maiores gerit scapos, fu-  
sorū effigie, minutulis folijs circumdatos, ex obli-  
quo crebras habentibus incisuras sectionibus co-  
riandro similibus, subfuluo colore lentis, odore  
multo, non insuauis, verū medicato: umbella in  
cacumine rotūda, floribus candidis [purpureis]  
& aurum emulantibus prouenit leto solo. Trita  
coma sanguinolenta glutinat, & ab inflamma-  
tionum periculo tuetur: erumpentem sanguinem  
inhibet, & cruenta vuluæ profluvia, in vellere.  
Decocto quoq; insident fæmine fluxione vuluæ  
laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

Rubus.

CAP. XXIX.

**R**ubus, nectiæ vulgaris. Vim habet siccan-  
di, & adstringendi: capillum tingit. Ra-  
morum decoctum, potu aluum sistit, & fæmina-  
rum profluvia, præteris morsui accommodatissi-  
mum. Gingiuas firmat, & eris vitijs folia com-  
māducata medētur, cohibētq; illita, vlcera quæ  
serpunt. Vlceribus in capite manantibus, oculisq;  
procidentibus remedio sunt, & condylomatis, &  
hemorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, &  
stomachi doloribus, trita conuenienter imponun-  
tur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq;



succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis, quàm optimè maturi succus, ad oris medicamenta cõuenit: sistitur aluus prematuri cibo, nec non flore in vino poto.

Rubus Idæus. CAP. XXX.

**I**dæus rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Ceterùm flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicis quæ ex aqua bibendus datur.

Helxine. CAP. XXXI.

**H**elxine cognomento cissampelos, folijs est hederae, minoribus ramulis exilibus, quibus complectitur quodcunq; contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, vinetis, & segetibus. Foliorum succus potu deijcit aluum.

Elatine. CAP. XXXII.

**E**latine folia habet helxine, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus & dodratalibus ramulis, quinis senisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

*Eupat*



## Eupatorium. CAP. XXXIII.

**E**upatorium, fruticosa herba est, vnicum effe-  
rens caulem, lignosum, nigricantē, rectum,  
tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum amplio-  
rem: folijs per intervalla quinquefolij, aut cāna-  
bis potius similibus, quinquepartitō aut amplius  
diuisis, nigricātibus, & ipsis per ambitum serra-  
tis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum  
spectans, quod siccātū vestibis inhæret. Contri-  
ta huius folia, & cum suillo adipe imposita, vlce-  
ribus, quæ ægrè cicatricem trahunt, medentur.  
Herba & semen in vino potum, dysenteria, ioci-  
neris vitijs, & serpentium ictilus, liberat. Nec  
desunt qui aberrantes \* argemonen hāc appella-  
runt, cū tamen longè alia sit, vti exposuimus.

## Quinquefolium. CAP. XXXIIII.

**Q**uinquefolium ramulos fert festucarum si-  
militudine, tenues, dodrantaes, in quibus  
semen: folia mēthæ, quina singulis pediculis, ra-  
rò plura, in ambitu serrata: florem ex candido  
pallescentem, auri æmulum. Nascitur in riguis,  
& aquarijs ductibus. Subrubram habet radi-  
cem, oblongam, veratro nigro crassiorē. Pluri-  
mis pollet remedijs. Ius radicis decoctæ ad ter-  
tias si in ore contineatur, dentium dolores sedat:  
putrida oris vlcera, collutione sistit: arteriæ sca-  
britias, gargarizatu lenigat: contra alui proflu-  
uia, & dysenterias auxiliatur: item articulo-  
rum coxendicūmq; cruciatilus potum. Cocta in

Est Offi-  
cinarum  
Agrimo-  
nia: earū  
autē Eu-  
patoriū  
fortē Cā-  
nabis syl-  
uestris,  
de qua  
præce-  
denti li-  
bro.

\*Græcus  
Artemi-  
siam ha-  
bet: sed  
esse, vt  
nunc vi-  
des, ar-  
gemonē  
legen-  
dum, ex  
anemo-  
ne (de  
qua li-  
bro ij.)  
non ob-  
scure co-  
gnoscas.



aceto, & illita, serpentia vlcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit: ignes sacros, reduntias, condylomata, psorasq; sanat. Teneræ radicis succus, cōtra iocineris, pulmonūmq; vitia prodest: item aduersum venena. Cum hydromelite autē, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, cōtra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternūm ramulorū: in tertiana verò, ternūm: in quotidiana, vnius. Ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrimè regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam vulneribus quàm fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

## A N N O T A T I O.

\* Spicam lolio similem. ] Non obscure hinc elicitor Lolium spica esse insignitum. ac proinde explodendam eorū sententiam, qui Nigellam vulgò cognominatam, cuius in segetibus vbique tam vber prouentus, id esse statuunt. Ea siquidem non spicam, sed purpureum florem emittit.

Phœnix.

CAP. XXXV.

**P**hœnix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, \* spicam lolio similem: calamos digitorū semūm, radici aduolutos: septenas octonāsve



nasve spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur. Harum virium compos, vt in vino austero pota, alui profluuium, & emanantem vulua sanguinem sistat, vrine impetus infrinet. Sunt qui adalligatam in puniceo vellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

Idæa radix.

CAP. XXXVI.

**I**Dæa radici folia sunt ea, quæ rusco: circū ea veluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his cōueniens, quibus adstrictione opus est. Pota, citam aluū, mensesque, & omnē abundantiam sanguinis sistit.

Rhodia radix.

CAP. XXXVII.

**G**ignitur Rhodia radix in Macedonia, costo similis, lenior, inæquabilis: quæ contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & tēporibus cum rosacei momento imponatur.

Equisetum.

CAP. XXXVIII.

**E**quisetum in riguis & scrobibus nascitur: cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se farcti, rubescences, leniter scabri, duri, & iunceæ circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, vicinos arborum caudices scandens, obuclutūque dependet, comis multis, nigris, vt equecrū cauda: radix lignosa, dura. Vis herbe spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in vino potus: vrinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinatur, tri-

Vulgò  
Cauda  
equina.



tis folijs, & illitis. Radix cum sua herba tuſſim, orthopnœam, ruptâq; adiuvat. Folijs in aqua potis, diſſectiones veſicæ et inteſtinorû, enterocelæq; in vnũ coaleſcere, cogiq; feruntur. Alterũ equiſetum caulis eſt rectus, æqualis, cubito maior, inanis: comis per interualla breuioribus, cãdidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritũ vulneribus remedio eſt, eadẽque fungitur facultate.

Coccum infectorium. CAP. XXXIX.

**C**occum, quo infectores vtuntur, frutex eſt ſurculoſus, paruus, cui grana ceu lentes adherent, quæ electa congerũtur. Optimum gignitur in Galatia, & Armenia, deinde Aſia, & Cilicia: vltimum ex omnibus Hispanicum. Vſu huic ſpiſſandi: vulneribus, neruiſq; præciſis, conuenienter ex aceto tritũ illinitur. Nascitur quoque in Cilicia, è quercubus, cochlearum exilium ſimilitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

Tragium. CAP. XL.

**T**ragium nascitur in Creta tantũ inſula, lentisco ſemine, folio, & ramis ſimile, ſingulis

\* Ita liſ tamen minoribus, \* ſuccus ei lacteus, gummi Pl. Græ non diſſimilis. Semen, folia, lacrymãq; illitu ſpicus co-cula è corpore eũciunt: omnia quoq; corpori index ſim-paſta, euocãt: pct a ſtranguriæ medentur, calcupliciter, los veſicæ frangũt, menſes trahũt. Modus in ſum ſuccus. ptione eſt, drachma vna. Fama eſt, ſylueſtres capras ſagittis conſoſſas, eius herbæ palulo ſpicula excut



excutere. Est & alterum tragium, quod tragoceros aliqui vocant, folia scolopendrij habet, & radicem sylvestris raphani, tenuē, candidam: quam crudam vel coctam esse dysentericis prodest. Folia autumnō, hirci virus olent: exinde sibi *Nomitracij* nomen adoptauit. Prouenit in montibus, nis causa & precipitijs.

sa.

Tragum.

CAP. XLI.

**E**st etiam herba tragos, quam aliqui scorpion aut traganon vocāt: maximē in maritimis nascens, palmū alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex vino poti, cœliacis, & fœminis fluxione vuluæ laborantibus, auxiliatur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti asseruantur, quibus vtuntur cū opus est.

Iuncus.

CAP. XLII.

**I**unci duo genera: vnum lauis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera: vnum sterile, reliquum fert semen nigrū, rotundum, & crassiore cōstat calamo, carnosiorēq;. Tertius est iuncus, qui vocatur oloschœnos, prioribus carnosior, asperiorq;, is similem supradicto fructum in cacumine parit. Semen vtriusq; tostum, ex diluto vino potum, sistit aluum, & rubra fœminarum profluvia: vrinam cit, capitisque dolores facit.



Qua proxima sunt radici folia tenera, cōuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine somnus illicitur sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen.

CAP. XLIII.

Officinis He-  
patica.

**L**ichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur, asperginosis petris adhaeret, vt muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptes, cum melle illitus: oris & lingua defluxiones inhibet.

Paronychia.

CAP. XLIII.

**P**aronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

Chrysocome.

CAP. XLV.

**C**hrysocome palmi altitudine fruticat: coma specie corymborū, hyssopo simili: radice hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum equante: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosi opacijsq; nascitur. Radix excalfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio malè habet: contra purgationes vuluae, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum.

CAP. XLVI.

**C**hrysogonum dense fruticat, querni folijs: flore coronarij verbasci: radix vt rapū extuberrat, intus ruberrima, foris nigra. Quae tri-  
ta cum



ta cum aceto, atq; imposita, muris aranci mersi-  
bus auxiliatur.

Elichrysum.

CAP. XLVII.

**E**lichryson quidam chrysanthemon, nonnulli *Alj He*  
& id amaranton vocāt, quo decorum simu- *liochry-*  
lacia coronāt: ramulum habet candidum, viren- *son.*  
tem, rectum, firmū: folia intercedentibus spatijs *Offici-*  
angusta, abrotono similia: coma aurea lucis in *nis Stæ-*  
orbē, umbella rotunda veluti siccis corymbis de- *chas ci-*  
pend: nibus, radice tenui: nascitur in asperis, & *trina.*  
torrentium alveis. Contra serpentium ictus, co-  
xendicū dolores, vrinae stillicidia, ruptaq; coma è  
vino pota opitulatur: ciet menses. Sanguinē con-  
cretum ventris ac vesicæ absomit, pota cū mul-  
so: ieiunis, trium obolorum pondere, sistit destil-  
lationes, data in vino albo diluto: vestibus inse-  
ritur, vt eas ab erodentium iniurijs tueatur.

Chrysanthemum.

CAP. XLVIII.

**C**hrysanthemon aut caltha, nonnullis bu-  
phthalmos: herba est tenera, fruticosa, leues  
proferens caules, & multifida folia: flores supra  
modum splendentes, luteos, orbem oculi imitātes,  
vnde buphthalmi nomen traxit: propter oppida  
nascitur. Cuius caules oleris vice mādūtur. Flo-  
res cū cerato triti, steatomata discutere produn-  
tur: regio morbo correptis, colorē breui reddūt, si  
sequēte longo balnei vsu, post exitum ebibantur.

Ageratum.

CAP. XLIX.

**A**geratō fruticosa herba est, palmari lōgi-  
tudine



tudine assurgens, simplex, humilis, origano maximè similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomē ei inditum est, quoniam diutissimè flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens: huius vstæ nidor urinam cit, & vuluæ duritias emollit.

Verbenaca.

CAP. L.

**P**eristèreō, siue verbenaca nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quòd columbæ circa hanc perquàm libenter versari soleant. Dodrātis altitudine, & interdū amplius adolefcit. folia è caule prodeunt incisa, & subalbida: ea singulari ramo, radicéque sola, constare sæpius inuenitur. Folia cum suillo adipe recenti, aut rosaceo imposita, vuluarū dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant: veteraque ex melle, ad cicatricem perducunt.

Sacra herba.

CAP. LI.

**S**acra herba, quæ & peristèreō nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex intervallis folia quercus, sed minora angustioraque, eisdē diuisuris in ambitu, colore aliquatenus casio: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cū radice in vino pota, illitave, aduersus serpentes pollent: eadem drachmæ pōdere cum thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur: veteres tumores



res & inflammationes mitigant: sordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, tonsillarum crustas abrumpit: oris nomas gargarizatu cohibet. Aiunt, si aqua spargatur tricliniũ, qua maduerit, letiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertiũ à terra geniculum, cum folijs circumstantibus, quartanis, quartum. Sacram vocat herbam, quoniam multũ ad amuleta, expiationesque commendetur.

Astragalus. CAP. LII.

**A**stragalus, parvus à terra frutex, folijs & ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotũda, raphani modo grãdi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, predu-ras, veluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. nascitur in ventosis, opacis, & in nivalibus. eo Memphis Arcadie scatet. Aluum sistit radix in vino pota: vrinam mouet: vetustis vlceribus, sicca efficaciter inspargitur: sanguinẽ supprimit: egrẽ propter duritiam tunditur.

Hyacinthus. CAP. LIII.

**H**YACINTHUS folia habet bulbi: dodrantalem caulem, leuẽ, minimo digito tenuiorẽ, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incuruam: radicẽ quoq; bulbaceam. Quæ, vt creditur, pueris cum vino albo illita, pubertatem coërcet, & non patitur erumpere: sistit aluum pota, & vrinam impellit, phalangiorũq; morsibus auxiliatur. Semẽ adstringentius



gentius est, theriacis expetitur: regium morbum emendat cum vino potum.

Papauer erraticum. CAP. LIIII.

\*Locum deprauatum esse manifestè apparet. Sunt enim herbæ quas hic cōmemorat Dioscorides, diuersa planè facie, ut vni eidemq; rectè cōparari nequaquā possint: quo modo autem instaurandus, peritioribus cogitandum relinquitur.

**P**apauer erraticum, quod rhæada vocant, vere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, vnde & nomen apud Græcos accepit. \* Folia erucæ, aut origano, aut ci. horio, aut thymo similia spectantur: sed longiora, diuisa, scabra: iuncus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdum albus: oblongū caput, sed quàm anemones minus: semen rufum: radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinque aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua mulsā pota, aluum leniter emolliunt: ad idem præstandum mellitis placentulis, & dulciarijs libis admiscuntur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant: eorundem folijs & perfusione, somnus allicitur.

Papauer satium. CAP. LV.

**E**satium papaueris genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui sanis in usu sit: eo etiam ex melle pro sesama vtitur: thylactin vocat. Capitulum habet longū, & semē candidū. Sylvestre verò, caput insidens demissūq; & nigrum semē, quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhæas dicitur, quoniam eius

scap



scapo lacteus succus emanat. Tertium magis syl-  
uestre, & ad medicinas valentius, multò his lon-  
gius, productiore capitulo. Omnium in commu-  
ne natura refrigeratrix: quare si capita ipsa &  
folia decoquantur in aqua, somnũ fotu concilia-  
bunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Caly-  
ces cum polenta triti, & cataplasmatibus admisti,  
ignibus sacris, & inflammationibus prosunt. Tun-  
duntur quoq; virides, & digerũtur in pastillos,  
qui siccati ad vsum reconduntur. Capita quoque  
per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterũmq;  
adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis  
lentore. Id medicamentũ in tussi, arterie fluxio-  
nibus, & coeliacorũ affectu, doloris leuamentum  
præbet. Efficacius tamen redditur, addito hypo-  
cistidis succo & acacia. Papaueris nigri semen  
tritum cum vino bibitur, contra citã aluum, &  
fœminarum profluvia: in peruigilijs fronti tem-  
porib;que illinitur, ex aqua. Opium eius magis  
refrigerat, inspissat, siccãtq;: sumptum erui ma-  
gnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum  
allicit: tussi, atque coeliacorum valetudini auxi-  
liatur: verũ si copiosius hauriatur, nocet, cũ  
lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capi-  
tis cum rosaceo perfusum efficax est. aurium do-  
lori, cum amygdalino, myrrha, & croco instil-  
latur: inflammationibus oculorum cum torrefa-  
cto oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus,  
cum aceto: podagris, cũ lacte mulieris & croco:  
somnum



**Opium** somnum accersit, subditiū sedi pro balano. Opti-  
 quod o - mum habetur graue, & densum, gustu amarū,  
 ptimū. odoratu soporiferū, quod facile aqua diluitur, le-  
 ue, candidum, neque asperum, neque grumosum,  
 quod inter colandum nō vt cera coëat, & in so-  
 le diffundatur: dein ad motum lucernis, non atra  
 luceat flamma: extinctū deniq; odoris vim cōser-  
 uet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris la-

**Eius** et uice succo, adulterant. Verū glaucio fucatū,  
 adulte- in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo suc-  
 ratio. co fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur:  
 gummi vitiatum, splendet, & infirmum est.  
 Nec desunt, qui eō dementie deuenerint, vt adi-  
 pem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad ocu-  
 lorum medicamenta, dum mollius, atque rufius  
 appareat. Diagoras, vt Erasistratus author est,  
 vsum eius damnauit, oculorū lippitudinibus &  
 aurium vitij infundi vetans, quoniam visus  
 aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit  
 Andreas, illitos eo protinus excecari, si nō adul-  
 teraretur. Mnesidemus vsum dūtaxat el factan-  
 di probauit, quoniam ad conciliandum somnum  
 cōueniret, alioqui nobis vt noxio interdicit. Quae  
 commentitia esse, experimento deprehenduntur:  
 siquidem effectus, virium huiusce medicamen-  
 ti, fidem faciunt. quare non alienum fuerit scri-  
 ptis mandare, quoniam modo is excipiat suc-  
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prae-  
 lo exprimunt, terentēque in mortario, digerunt

in



in pastillos: id meconium vocatur, multum opio ignauius. Porro opij faciendi ratio hæc est: Cum Opij col-  
ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellæ, ne ligendi  
penitus adigatur, ex obliquo in rectum summâ ratio.  
cutem incidere oportet, lacrymam exeuntem,  
digito in concham abstergere: nec multo post re-  
dire, vt concreta inueniatur: etenim quæ tum,  
aut postero die etiam offenditur, in vetere pila  
teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen incidi-  
tur, retrocedendum est, ne vestibus succus dera-  
datur.

Corniculatum papauer. CAP. LVI.

**P**Apauer ceratites, id est corniculatum, folia Vulgò  
papauer  
cornutū.  
habet candida, hirsuta, verbasco similia, in  
ambitu syluestris papaueris more serrata: caule  
non dissimili: flore pallido: calyculo fœnigræci, in  
corniculorum modum inflexo, vnde nomen mu-  
tuatur: semine papaueris, pusillo, nigroq; radice  
per summa cespitiū nigra, crassa: nascitur in ma-  
ritimis & asperis. Radicea vis inest, vt in aqua  
decocta ad dimidiū, coxendicum & iocineris  
affectus, potu sanet prodest his, qui crassa quæ-  
dam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt.  
Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua  
mulla poto. Crustæ emarginant illita ex oleo fo-  
lia florésq; & argema ac nubeculū iumentorum  
perunctas, abstergunt. Sunt qui glaucium, hoc  
papaueris genere facituri existimarunt, falco  
quadam foliorum cognatione.



## Spumeum papauer. CAP. LVII.

**A** Liud papaueris genus, aphrodes, id est, spumeū vocatur, ab alijs heracleū, caule dodrantali: folijs abmodū paruis, \* radicle simili-  
 \* Struthio. libus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba  
 \* Sic ex est, & spumea tota: \* radice in summo cassite. Le-  
 Theo- gitur æstate semē, cū integrè adoleuit, decidit-  
 phrasto. que exiccatum. Datum acetabuli mensura in  
 Videtur aqua mulsa, vomitione expurgat priuatim lu-  
 enim lo- in smodi purgatio: comitialibus prodest.

## cus in Hypecoum. CAP. LVIII.

Græco **H** Ypecoon, aliqui hypopheon vocāt: nascitur  
 Diosco- in segetibus aruisq; , folijs rute, exilibus  
 ridis co- ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.  
 dice cor- Apollinaris, siue hyoscyamus.  
 ruptus.

## CAP. LIX.

Nunc **H** Yoscyamus, frutex est caules emittens cras-  
 Insquia sos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsu-  
 mus. ta: flores e latere caulis, ordine prodeūt, tanquā  
 punicorū cytini, scutulis septi seminū plenis, vt pa-  
 paueris. Tres eius differentie: Vna semine nigro,  
 floribus penè purpureis, smilacis folij, citinis præ-  
 duris, & spinosis. Alterius semē sublauiū, vt iria-  
 nis: flores lutei: folia, & siliquæ simpliciores. Am-  
 to insaniam gignit & soporem, ideo in commu-  
 ni vsu damnantur. Tertiū genus, vt quod mitis-  
 simum esset, medici recepere: pingue, lanuginoso-  
 sum, molle, candidi floris seminisq; , in maritimis  
 rudribusq; nascens. Cuius occasio si non adsit,  
 rufum



rufum vſurpari oportet: niger, vt deterrimus, im-  
probat. Recenti ſemine, caulibus folijsq; tuſis,  
ſuccus in ſcle exprimitur, & excicato humore,  
vſus ad annũ vſq; prorogatur: nã facile corruptio-  
nem ſentit. Extrahitur etiã ex ſicco ſemine ſepa-  
ratim in aqua calida tuſo, & expreſſo. Liguamẽ-  
tum autem ſucco lacteo præſtãtius eſt, & magis  
dolores finit. Contuſa herba recens, addita trime-  
ſtri farina, digeritur in paſtillos, & reconditur.  
Liquamentum primum, & quod à ſicco ſemine  
exemptum eſt, collyrijs, quæ doloris ſenſum auſe-  
runt, commodiſimè inferi ſolent: contra acutas ca-  
lidasq; fluxiones, dolores auriũ, atque vuluæ ma-  
la, proſunt: cum farina autem aut polenta, oculo-  
rum, pedum, ceterarũq; partiũ inflammatio-  
nes placant. Semen eadem præbet: tuſi, deſtilla-  
tionibus, oculorũ fluxioni, & doloribus, efficax:  
contra menſium abundantiam, & rumpentem  
aliunde ſanguinem, oboli pondere cũ papaueris ſe-  
mine, & aqua mulſa, bibitur: podagris ſubuenit:  
teſtibus inflatis mãmĩſq; tumentibus à partu, tri-  
tum ex vino illinitur. Alijs quoq; cataplaſmatis,  
quæ doloris leuamentum præſtãt, admisceri ſolet.  
Folia omnibus medicamentis dolorem ſedãtibz,  
per ſeſe, & ex polenta, vtiliſimè imponuntur: re-  
centia, ad mitigãdos omne genus dolores, oblinũ-  
tur: cum vino terna, quaternãve pota, ſanant al-  
gidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum  
modo folia, ſi acetabuli menſura mādun̄tur, me-



diorem insaniam gignunt: idem efficere tridūt, si colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

*Psyllium.*

CAP. LX.

**P**syllion folijs coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa fœni modo, in totū herbula: ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve cōuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicū simili: vnde & nomē. in aruis & incultis nasciuntur. Vis ei ad refrigerandū, inspissandū, & molliendum cōueniens: articulorū morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitū auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cū rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti vmbilico, illitū ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aque sextario madafactum, vti concreuit aqua, illinitur: si quidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat. Cōtra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcera, & quæ cacoëthe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

*Hortense solanum.*

CAP. LXI.

Hodie solatrum corrupte.

**H**ortense solanum, frutex cibus idoneus, pulillus, multis concavus alis folio nigro, maiore quàm ocymi, & latiore: fructu rotūdo, viridi,



di, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit:  
herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi:  
quare folia vlceribus quæ serpunt, & ignis sa-  
cris, conuenienter cum polline polentæ illinun-  
tur: ægylopiæ, capitisq; dolores, trita & impositæ  
per se sanant: æstuantî stomacho auxiliantur. pa-  
rotidas, cū sale detrita, illitu discutiunt. Valet suc-  
cus eius aduersus ignem sacrum, atque vlcera,  
quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spu-  
ma: ad ægylopias cū pane: infanîum adustioni,  
quam syriæ sin vocant, cum rosaceo perfusus pro-  
ficit: in cellyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, cõ-  
tra acutas fluxiones illitus: aurî dolori instil-  
latus prodest. Mensium abundantiam sistit, in-  
vellere subditus. Succus fuluo gallinarum cortæ. *Officinis*  
lium fimo subactus, & linteo appositus, ægylopijs *Alke*  
presentaneo est remedio. Est & aliud solanum, *kengi*  
quod peculiari nomine halicacaton aut physali- *Arabu*  
da, id est vesicariam vocant, folijs antedicto si- *exemplo.*  
milibus; verum latioribus: cuius caules, postea-  
quam adoleuerunt, prona terram spectant: folli-  
culis orbiculatis vesiculis similibus: semine intus  
fuluo, rotundo, leui, acinorum vix effigie: quo  
coronarij vtuntur, corollis intorquentes. Vim  
vsûmq; hortensis solani habet: verum cibus nequa-  
quam expetitur. Regium morbum purgat, semine  
poto, & vrinam pellit. Ex vtraque herba suc-  
cus extrahitur, qui siccatus in vmbra, recondi-  
tur, ad eadem valens.



## Solanum somniferum. CAP. LXII.

**S**olanum somniferum, aliqui etiam halicaca bon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fracta contumacibus, pinguium foliorum, cotonéaq; mali similium plenis: flore grādi, rubro: fructu in folliculis crocato: radce grādi, sub rubro cortice vēstita nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in vino drachma pōdere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dātur: si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciūt. Remedio est aqua coprosa mulsā, potui data. Succus pastillis inferitur & medicamentis, quæ doloris leuamentū præbent: decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

## Manicum solanum. CAP. LXIII.

**S**olanū manicum, aliqui per sion, alij thryon appellauere. Huic foliū cruce simile, maius aliquantō, satis acantho, quem pæderota vocant, accedens: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, vlnæ altitudine adolefcētes: caput in cacumine, oliuæ figura, sed vt platani pilule hirsutius, verū maius, latiūsq; florem nigrum: postquam eo exuitur, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus hedere corymbis, vt vix mollibus: radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali: gignitur in mont



montibus, vento perflatis, & platanetis Radix drachmæ vnius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginēsq; non iniucundus obuersari: sed duplicatus hic modus, ad treis vsque dies mentis alienationē affert: quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & vomitione reiecta.

## Dorycnium. CAP. LXIII.

**D**orycnion Crataeas halicacabon, aut caleam vocat: frutex oleæ nuper prodeunti similis: nascitur in petris, nō procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris: flore cædido: siliquis in cacumine, ceu ciceris, dēsis, rotundis, quinis intus aut senis feminibus, exigui erui magnitudine, leuibus firmis, versicoloribus: radix ad digiti crassitudinē & cubiti longitudinem adolefcit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec defuere, qui dicerent, semen in amatoria expeti.

## Mandragoras. CAP. LXV.

**M**andragoram, aliqui antimalū, alij circeam vocant, quoniā videatur radix ad amatoria cōducere. Duo eius genera: niger, quæ femina existimatur, thridacis appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm lactuce, virosis ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pirorum radicibus inheret bene m a-



gnis, linis, ternisve, inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis, caule viduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullus. *\* Alijs* *\* norion* vocitatus: huius folia magna, alta, leuioria, leuia vt beta: malla quã alterius duplo maiora, colore in crecum inclinante, iucundè cum granitate quadã olentia: quorum pomorum cibo, aliquantum opiliones soporantur. radix, alterius similis, maior & candidior, orbata & hæc caule. Succus fit è cortice recentis radiceis tuso, & pralis subiecto: qui insolatus vbi concreuerit, fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquantò ignauior. Deliberatur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defecatum ius seruant: cyathosque vno vtuntur, in peruiigijs, & doloribus, & ante sectiones vstionesque ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilem atram pituitamque extrahit: verum potu largiore, vita adimitur. medicamentis ocularibus, & his, quæ dolores finiunt, pessis quoque emollientibus, admiscetur: semioboli pondere inditus, per se menses & partus expellit: subditus sedi probalano, somnificus est. Radix ebur emolire fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quã effingere optaueris, formam, ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus, quas vlcera citarunt, cum po-  
lent



lenta illinuntur: duritias omnes supperationes, strumas & tubercula discutiunt: stigmata siue exulceratione delent, si quini sen'sve diebus, sen'sim perficiuntur. Folia seruantur in murijs, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, serpentium ictibus ex melle aut oleo, medetur: strumas atque tubercula, cū aqua dissipat. articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit cōtra coctienem vinum ē cortice radicis, ad hunc modum: Ternæ minæ in vini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi ijs, qui secari aut amburi debent, vt antè dictum est: siquidē nullo tunc afficiuntur dolore, sed vetern o quodam pressi, torpescunt. Mala soporē afferūt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex eis succus: nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum vulvas purgat: appositūque cum sulphure ignem non experto, rubra fœminarum profluvia sistit. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erūpens lacryma, cauo vase recipitur. Liguamentum autem succo lacteo præstantius est: sed non vbique, vt experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatū: folijs albi mādragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambiētibus: quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemque crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, offa, obsoniove,



drachmæ pondere deuorata, vsum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu sensus impos, ternis, quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur, cum scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotum esse volunradicem, cum manico solano potam.

## Aconitum. CAP. LXVI.

**A**Conitū, aliqui pardalianches, alij cāmoron, alij thelyphonō, alij myoctonō, alij theriophonon vocant: folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta: caulem palmo altum: radix scorpj caudam emulatur, & alibastri modo splēdet. Torpescūt, vt fama est, scorpiones admota radice stupēntq;: qui rursum hellebori contactu excitantur. Oculorū medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur. Enecat pantheras, sues, lupos & feras omneis in carnibus obiectum. Est & alterum aconitum quod aliqui cynoctonon, alij lycoctonon appellant. Huius genera sunt tria: vnum, quo vtuntur venatores: alia duo in vsum suū vertere medici, è quibus tertiu, quod Pōticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iustinis exilit: à priore distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multò nigriora: caulem filicis pediculo similem, nudum, cubitali altitudine, aut ampliorem: semē in siliquis oblongis recondit: radices in modū squille marinæ cirrorum nigrescunt. Quil us ad venationem luper

\* Ita  
Plinius  
Græcus  
ῥωσπε-  
κίον, id  
est, sub-  
aspera.  
vtra au-  
tem le-  
tio po-  
rior, her-  
ba, si  
quādo se-  
se obtule-  
rit aspe-  
ctus in-  
dicabit.



porum vtuntur: insertæ siquidem crudis carni-  
bus, & deuorata, lupos enecant.

## Cicuta. CAP. LXVII.

**C**icuta caulem edit geniculatum, vt fœnicu-  
li, grandem, \* folia ferulæ, angustiora, gra- \* Pli-  
ui odoratu: rami, mox vntelle in summo pro- nius lib.  
deunt: flores quoque albicantes: & semen aniso 25. cap.  
candidius: radice non alta, concaua. Cicuta le- 13. Coriã  
thale venenũ inest, suaq; vi refrigeratoria necat. dro assi-  
Remedio est vini meraculi potus. Succus expri- milauit,  
mitur contusis cacuminibus, priusquã semina & cui pro-  
come siccescant: qui sole densatur in pastilos. pius sa-  
Multus ad medendi rationem vsus est aridi: cõmo nè, quã  
dẽ miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia ferulæ,  
temperantur: ignes sacros, & vlcera quæ serpũt, quæ fœ-  
illitu restinguit. Herba cũ coma trita, & testi- niculi cõ-  
bus circumlita, libidinũ imaginationes in somno, stat fo-  
compescit: sed genitale rescluit: lac puerperarum lỹs, Cicu-  
mammis apposita extinguit: in virginitate mã- ta omni-  
mas coercet, & increscere nõ patitur, pueris præ- bus ho-  
stat, vt eorum testiculi cibum non sentientes, in- die cõper-  
tabescant. Efficacissima vis Creticæ, Megaren- ta, vide-  
si, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti. tur acce-  
dere.

## Taxum. CAP. LXVIII.

**S**ilax à Grecis, taxus à Latinis appellatur  
arbor alietis magnitudine, & foliorũ eius-  
dẽ figura, in Italia & Narbonẽsi Galli: Hispa-  
niæ cõtermina nascent. Anicula quæ Italicæ ta-



xi baccas deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alui profluvio corripiuntur Narbone tam presentis est veneni, vt si qui dormiant sub ea, aut in eius vmbra subsideant, ledantur, & saepenumero moriantur: quare de taxo hac traduntur, vt ab ea caueamus.

Apocynum. CAP. LXIX.

**A** Pocynū, siue cynocrābe, brassica canina, frutex est longis viticulis cōstans, malè olentibus, lentis, vitiliūmq; modo obsequiosis, fractu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremū acutiore, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie, digiti lōgitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecāt, in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Nerium, seu rhododendrum.

CAP. LXX.

*Amygdale.*

**N** Erion aliqui rhododaphnen, alij rhododendron vocāt. frutex est vulgaris notitiæ, lōgioribus quàm amygdala folijs, crassioribūsq; flore in rosam cōformato: fructu\* nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem radice lōga, acuta, ligniosa, gustanti salsa: nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis venena sunt: hominibus verò cōtra



tra serpentium morsus praesidia, è vino pota: co-  
magis ruta addita: imbecillae etiam animantes,  
vt pecus & caprae, si aquam bibant, in qua folia  
ea maduerint, moriuntur.

Fungi. CAP. LXXI.

**F**ungorum differentia duplex: aut enim man-  
duntur, aut perniciales sunt. Multis de cau-  
sis veneni si gignuntur, vbi videlicet clauus fer-  
reus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfue-  
rit, aut si iuxta serpentis cauernā, arborēsve. quae  
priuatim pariūt noxios fructus, erumpāt. Conti-  
nent qui tales sunt, nescio quod strigmentū cōcre-  
tamq; pituitā, terrāq; eruti, quā celerrimē cōpu-  
trescunt, atq; marcore vitiātur. Sed qui veneno  
imbuti nō sunt, suauē in iuribus gratiam habēt:  
largius tamen sumpti nocent, & agrius concocti  
strangulant, aut choleram morbum citāt. Reme-  
dio est nitri potus, aut lixiuium cum acida mu-  
ria, aut feruefacta satureiae, aut origani iusculū:  
debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto,  
aut eiusdē delinctu cū melle multo. Corpus alunt,  
sed egrē dissoluuntur, cū magna ex parte inte-  
gri ipsi, cum recrementis alui reijciuntur.

Colchicum. CAP. LXXII.

**C**olchicon, aliqui ephemeron, sunt qui agre-  
stem bulbum vocant, autumnū exitu florem  
edit croci, candicantem ab eo tempore, folia bul-  
bi, sed pinguiora caulem palmo altum, ferentē ru-  
fum semen: radicem foris è nigra rufescentem,

Censetur  
Hermo-  
dactylus  
officina-  
rum.

que



que deliberata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atq; gustatu dulcis inuenitur: bulbus eius mediā habet rimam, fissuramq; qua flos erumpit: plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa fungorū more, strangulādo enecat. Hanc autē depinximus, ne à quoquā imprudenter pro bulbo deucretur: mirū enim in modum saporis voluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem, que fungis: bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaque cū adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

## Ephemerum. CAP. LXXIII.

Fortè no  
strū Li-  
liū cōual-  
lium.

**E**phemerum, aliqui syluestrem irin appellāt. Folia habet lilij, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum, amarum semen molle: radicē vnā, digitali crassitudine, lōgā, adstringentem, odoratā: nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus precipua, si decocto coluantur. Folia in vino cocta, discutiunt tumores, & tubercula, que nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est muralis herba.

## CAP. LXXIIII

Offici-  
nis Pa-  
rietaria.

**H**elxine nascitur in parietinis, sepibus, vineis & segitibus: folia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subrubētes, & circa eos veluti semina aspera, adherētia vestibus. Folia refrigerādi, spissandiq; naturā habēt, qua ex causa sanant illius sacros ignes, adusta, cōdylomata, panos incipiētes, tumores, inflammationisq; Suc-

C103



cus eius cum cerussa, ignibus sacris, & vlceribus  
quæ serpunt, commodè illinitur, imponiturq; poda-  
gris cum hircino adipe aut cerato ciprino: veterē  
tussim emendat instar cyathi haustus: tussillis  
inflammationem sentientibus vtiliter & garga-  
rizatur, & oblinitur: aurium dolorem cum rosa-  
ceo instillatus leuat.

## Alfine. CAP. LXXV.

**A**lsinē, aliqui anthylliō, nōnulli myosota Vulgō  
vocat, quoniā masculorū aures folia morsus  
imitatur. Lucis opacisq; gaudet, vnde alfine di- gallinae.  
cta est. Hæc erat eadem quæ helxine, nisi lumi-  
lior esset, & folijs minoribus, \* nec hirsuta. cūm \* Ex  
teritur odore cucumis reddit. ] Vim refrigeran- Plinio  
di adstringendiq; obtinet: oculorum inflamma adiecta.  
tionibus cum polenta illinitur. Succus auriū do-  
loribus infunditur: quin & emendat omnia quæ  
helxine, id est, muralis herba.

## Lens palustris. CAP. LXXVI.

**L**ens palustris, inuenitur in aqua nō fluen- Offici-  
te, muscus lenticulæ similis, refrigeratorie nis lenti-  
nature. Propter quod cōuenienter collectionibus, cula a-  
igni sacro, & pedagris, illinitur perse, & cum po quæ.  
lenta: glutinat & procidetia puerorū interanea.

Semperuium, seu sedum.

## CAP. LXXVII.

**S**emperuiū magnum ideò nominatur, quo-  
niā perpetuò folia vireant: cuius caules cu-  
biti altitudinem implent, interdum excedūt, pin-

gus.



\* Vox thymali modo insecti: folia pingua, \* carnosae, ]  
 addita magnitudine pollicari in cacumine linguae simi-  
 ex Pli- lia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia  
 mo. inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi:  
 nascitur in montibus, & testaceis: supra domi-  
 cilia etiam seritur. Fius vis refrigerare, & ad-  
 stringere: medentur igni sacro, nomis, ulceribus  
 quae serpunt, oculorum inflammationibus,ambu-  
 stis igni, podagris per se, & cum polenta illita fo-  
 lia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut  
 rosaceo perfunditur: datur in potu contra pha-  
 langiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluvia:  
 teretes tineas potus in vino, excutit: subditus in  
 vellere, mulierum abundantiam sistit: succus ocu-  
 lorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptis,  
 Vulgò inungitur. Semperuium paruum in petris, parie-  
 vermicu tinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nasci-  
 laris. tur, caulibus ab una radice multis, tenuibus cre-  
 brò foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus,  
 mucronatis: caule à medio emicante, palmum al-  
 to: umbellam herbidosq; flores, & tenues gerente.  
 Folia eisdem cum priore viribus praedita sunt.  
 Tertium videtur semperuii genus, quam aliqui  
 andrachnen agriam, aut telephion vocauerunt,  
 Romani illecebram, pusillis, crassioribusq; folijs,  
 hirsutis, portulacae proximis nascitur in saxis. Vis  
 ei ex calfaetoria, acris, exulcerans: illita cum  
 axungia strumas discutit.

Vmb



## Vmbilicus Veneris. CAP. LXXVIII.

**C**Otyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formã tornato, ineuidenter concavo, breui in medio cauliculo, in quo semẽ inest: radice oliue modo rotũda. Succus cum vino circumlitus, instillatũsve, cõtecta genitalia nudat: inflãmationibus sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorẽ refrigerat. Folia cum radice comesa, calculos frangunt, vrinam cient, hydropicis ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria. Est & alterũ genus eiusdem, cymbalion aliqui vocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularũ modo densis circa radicem medium oculi ambitũ describentibus, vt in maiore semperuiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem, quæ semperuiuum.

## Vrtica. CAP. LXXIX.

**D**vo vrtice genera: syluestris, asperior, latioribus, nigrioribũsque folijs: semine lini, sed minore. Altera non equè aspera, minuto semine. Folia vtriusq; illita: canis morsibus, addito sale, medentur: gangrenas, carcinomata, sordida vlcera, & quæ cacoëthe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant: lienosis cum cerato imponũtur: faciunt ad profluvia narium, cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt, eadem detrita cum myrrha, & imposita: procidentes vuluas, recen-

Z



tia contactu resiliere cogunt. Semen poiū ex passo, venerem stimulat, vuluæ ora patefacit: cum melle delinctū, orthopnææ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, vrinas mouent, inflationes discutiunt: decocta cum ptisana, vitia pectoris extrahunt: mulierum menses euccant, cum myrrhæ medico poiā. Inflammationem turgentem vnam gargarizatus succus reprimit.

Galiopsis.

CAP. LXXX.

**G**aliopsis frutex in totum caulem, & folia habet urtica, leuiora, & quæ grauem odorem trita reddant: flore purpurascente, tenui: nascitur circa sepes, ædificiorum areæ, ac semitas ubiq;. Folia, caules, semen, succusq;, duritias & carcinomata dissipant: strumas, panos, & parotidas discutiunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere: ad putrescentia gangrenas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Galion.

CAP. LXXXI.

**G**alion, nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat: ramulum foliūmq; habet aparine simillimum, rectum: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustus illinitur, sanguinis profusio sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, insolatū vsquedum albescat: lassitud



*lassitudines reficit. Radix venerem concitat. Nascitur in palustribus.*

Senecio. CAP. LXXXII.

**S**enecio cauliculo est culitali, subrubro, folijs com-  
muis, eruce modo per extremitates di-  
uisis, sed minoribus multò: luteis floribus, qui ce-  
leriter dissecti vanescunt in pappos. Nomen ve-  
rò sibi vendicauit, quoniam flores capillorum ri-  
tu, vere canescant. radice superuacua: nascitur  
maximè in macerijs, & circū oppida. Folia cum  
floribus refrigerant: quare illita cum vini modico,  
vel perse, testium & sedis inflammationes  
sanāt: quin & ex manna thuris medentur, cum  
reliquis vulneribus, tum ijs quæ nerui accepe-  
runt. illiti perse cum aceto pappi, idem munus  
præstant: verum recentes epoti, strangulant. To-  
tus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi  
dolores à bili contractos, persanat.

Thalictrum. CAP. LXXXIII.

**T**halictron folia coriandri habet, pinguiora  
paulò: cauliculum rute crassitudine, in quo  
folia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatri-  
cem perducunt. Nascitur maximè in cæpestribus.

Marinus muscus. CAP. LXXXIII.

**M**arinus muscus nascitur in scopulis, te-  
staceis que haud procul à mari, gracilis,  
capillaceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi  
vis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas  
refrigerare opus sit.



Phycus marinus. CAP. LXXXV.

**P**hyci marini generibus, quoddam latū, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta iuxta terram, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratoriā, non pedagra modo, sed etiā inflammationibus, in cataplasma ris efficaciter utilem: verum ijs uti humidis conuenit, priusquam exarescant. Nicander, puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fūco quidam putant mulieres suum calorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdē nominis, qua sese fucant.

Potamogeton. CAP. LXXXVI.

**P**otamogeton, folium betæ simile, hirsutum paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra veterum vlcera nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus, & aquosis enascatur.

Stratiotes. CAP. LXXXVII.

**S**tratiotes in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomen traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia: quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit à renibus, pota sistunt: vulnera, quæ inflammationem minantur, intumescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

*Vulgatū  
millefo-  
lium.*

Stratiotes millefoliū. CAP. LXXXVIII.

**S**tratiotes millefoliū exiguus frutex, palmæ altitudine, aut amplius assurgit: folijs auculicam



cularum pennas imitantibus, breui admodum dissectoque foliorum exortu. Folia syluestre cuminum simulant, praesertim breuitate atq; scabritia, breuiora paulo, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit, exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, praecipue circa semitas. Eximij vsus ad vlcera vetera, recentiaque, profluentem sanguinem, & fistulas.

Verbascum. CAP. LXXXIX.

**V**erbascum differetias summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas & foemina intelligitur. Foeminae igitur folia sunt brassicae, pilosiora multo, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut subpallidi: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti: nascitur in campestribus. Verbascum, qui mas appellatur, oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq; constaret folio. Syluestre folia fert salviae, altas virgas, & \* lignosas, & circa eas ramulos, quales marrubij flores luteos, auri-  
emulos. Sunt & phlomidēs duae, hirsutae, rotundis folijs, humiles. Tertia lychnitis appellatur: ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quaternis, vel paulo pluribus, hirsutis, crassis, pinguibsq; apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine

Tapsus  
barba-  
tus vul-  
go.

\* Sic  
Pli. qui  
φυλω-  
δης vi-  
detur lo-  
gisse.

Græcus  
codex  
Λυχνίτις  
δύς, id  
est, arbo-  
rescen-  
tes.



ludicrum talum æquet, in alui profluuiio, conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, cōuulsis, fractis, antiquæ tuſſi auxiliatur. Dentiū dolorem collutione mitigat. Verbaſcum, cui flos aureus, capillos tingit, et quocunq; abijciatur, blattas in ſe contrahit. Cocta in aqua folia, aduerſus tumores, inflammationes oculorum, ſyderata vlcera, ex vino & melle illinūtur: cum aceto quoq; vulneribus medentur: contra ſcorpionum iētus, ſunt auxilio. Sylueſtris folia ambuſtis igni, ſunt cataplaſmata. Aiunt in folijs eius, quam fœminam dicimus, arilos ficus omnino nō putreſcere.

Aethiopsis.

CAP. XC.

**A**Ethiopsis folia habet verbaſco ſimilia, perquam hirsuta, denſaque, in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, craſſum ac ſcabrum, ſimile apiāſtro, aut arctio, multis concavum alis: ſemen erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem caſpate numerosas, longas, plenas, glutinoſas guſtu, quæ ſiccæ nigreſcūt durantūq; ut cornua poſſint videri: plurima naſcitur in Ida monte Troadis, & in Meſſenia Auxiliatur purulentis excreationibus, iſchiadicis, pleuriticis, arteriæ ſcabritijs, decocta radix, & pota: quin & cum melle eclegmatis vicem præbet.

Arction.

CAP. XCI.

**A**Rction, aliqui potius arcturon vocant, ſimilis eſt verbaſco folijs, niſi quod hirsutiora,



sutiora, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulciq;. Decocta cum semine radix in vino, denum dolorē mulcet, si cōtineatur ore decoctū: ambusta pernionesque fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. CAP. XCII. *Vulgò*

**P**ersonata folia habet cucurbitæ, maiora & lappa hirsutiora, nigriora & crassiora: caulem al- maior, ticantem, quanquam & interdum vidua caule & Bar- reperiatur: radice grandi, intus candida, foris dana. nigra. Hæc drachmæ vnius pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extus sientibus auxiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum cōtractos, illitus sedat. Folia vtiliter antiquis vlceribus illinuntur.

Petasites.

CAP. XCIII.

**P**etasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande folium, galero modo amplū, ceu fungus dependet. Contra phagedenas, & vlcera, quæ cacoëthe vocant, efficaciter illinitur.

Epipactis.

CAP. XCIII.

**E**pipactis ab alijs helleborine, parua herba, exiguis folijs. Iocineris vitij vtilis, & contra venena pota.

*Offici-  
nis fu-*

Capnos, seu fumaria.

CAP. XCV.

**F**umaria fruticosa herbula est, pratenera, comus ter-  
riandris similis: folijs candidioribus, vndiq; ræ.



numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis de lacrymationemque: unde nomen traxit. Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba biliosam urinam trahit.

Lotus urbana. CAP. XCVI.

**L**otum urbanam alij trifolium vocant: nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasque caligines discutit.

Sylvestris lotus. CAP. XCVII.

**S**ylvestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & saepe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis: semine fœnigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasque cum melle peruncta expurgat: trita per sese aut cum malue semine, in vino aut passo bibitur aptissimè contra dolores, qui vesicam malè habent.

Cytisus. CAP. XCVIII.

**C**ytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubitales, saepe maiores in quibus folia fœnigraci, aut loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustataque cicer recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutiant, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope aluearia serunt.

Lotus



## Lotus Aegyptia. CAP. XCIX.

**E**st & in Aegypto lotus, quæ in campis flumine inundatis provenit, caule fabæ: flore parvo, candido, \* lilio simili, quem tradunt occi- \* κρινῶν, dente sole comprimi occludique, ad ortum autem non aperiri: adduntque, caput ipsum vespera aquis κρινῶν. condi, & ad exortū Solis emergere. Caput quale papaveris, maximum: & intus grana ceu milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogūt. Radicem lotos hæc habet, mali cotonei similitudine, quæ cruda coctaque manditur: decoctaque lutei oui qualitatem exhibet.

## A N N O T A T I O.

Aliud est à nostro Millefolio, quod paulò ante stratiotem millefolium esse monuimus.

## Millefolium.

## CAP. C.

**M**Yriophyllum, siue millefoliū, caulis est tener, singularis, vnica nixus radice: plurimis folijs, leuibus, fœniculo similibus: vnde nomen accepit. Caulis flavescit, varius, ac veluti ex industria delimatus: nascitur in palustribus. Vulnera recentia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel siccum ex aceto, oblinatur. precipitatis in potu cum aqua & sale datur.

## Myrrhis.

## CAP. CI.

**M**Yrrhis, simillima est cicuta, caule foliisque: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuavis. Quæ pota in vino, pha-

℞ 5



langiorum morsibus auxiliatur: cit menstrua,  
 & partus secundos: purgatq; à puerperio femi-  
 nas: subuenit & phthisicis cocta in sorbitiore.  
 Aiunt quoque eandem bis tēve die potan ex  
 vino in pestilentia salutarem esse, & ne norbi  
 contagia sentiantur, obstare.

Myagrum.

CAP. CII.

**M**Yagron, aliqui melampyron vocāt, her-  
 ba est surculacea, folijs rubia, pallidis, tri-  
 pedanea: semen oleosum, \* fienegraco simile.  
 Quod contusum igni torrent, perunctis que vir-  
 gis ad lucernarū lumina vtūtur: hoc pingui, sca-  
 britias corporis lenigari, atque expoliri constat.

Onagra.

CAP. CIII.

**O**Nagra, siue onothera, aut onuris, frutex est  
 arboris instar, prægrandis, amygdalino fo-  
 lio, sed latiore, lilio nō dissimili: flore rosaceo, ma-  
 gno: radice candida, longa: cūm siccata est, vinū  
 olente: nascitur in montibus. Aqua, in qua ra-  
 dix maduerit, in potu data feras mitigat, & ci-  
 cures facit: illitu quoque tetra vlcera mulcet.

Cirsium.

CAP. CIIII.

**C**IRsium, caulis est tener, duorum cubitorum,  
 triangulo similis: ab imo foliola, rose spe-  
 ciem referentia: anguli spinosi, per interualla  
 molles: folia buglosso similia, \* maiora, sub-  
 candida, modicē hirsuta, partibus extremis acu-  
 leata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum,  
 in quo capitula in summo purpurea, que sol-  
 untur



uuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

Aster Atticus, seu inguinalis.

CAP.

CV.

**A**ster Atticus cauliculus lignosus, florē in cacumine habens purpureū, luteū m-  
re, per ambitū, anthemidis capituli modo diui-  
sum, foliolis stelle modo radiatis. quæ autē caule  
circundant folia, oblonga sunt ac hirsuta. Feruētī  
stomacho, oculorū inflammationibus, proci-  
duæ sedi, ac inguinibus i' ltu auxiliatur. Tradūt pur-  
pureū florē, si ex aqua bibatur, anginis, & pue-  
ris comitiale malum sentientibus, opitulari. In-  
guinum inflammationi recentem illinire conue-  
nit. Si aridus flos sinistra dolentis manu decer-  
patur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyrum.

CAP.

CVI.

**I**sopyron aliqui phasiolon ob similitudinem  
vocat, quoniam folium, quod est aniso simi-  
le, in pampinos torquetur: capitula sunt in sum-  
mo caule tenuia, plena seminis, melanthij gu-  
stum imitantis. Contra tussim, & cætera pecto-  
ris vitia, semen ex aqua mulsa bibitur: hepati-  
cis, & sanguinem excreantibus vtile.

Viola purpurea.

CAP.

CVII.

**V**iola purpurea foliū habet hedera minus,  
tenuius ac nigrius, nec multò dissimile: cau-  
liculus à radice medius prodit, in quo floscu-  
lus,



lus, suauissimè olens, purpureus : opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sedique procidenti.

Cacalia.

CAP. CVIII.

**C**acalia, quæ leontice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferēs robori aut oleæ similem: nascitur in montibus. Radix in vino madefacta, vt tragacantha, delinctu aut manducatu per se tuſibus, scabritijs arteriæ, medetur. Grana, quæ post excussum florē innascūtur, trita, & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Bunium.

CAP. CIX.

**B**unium caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutus folijs ac floribus scatent : folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi : semen odoratū, hyoscyamo minus. Urinam ciet, excalfacit, secundas euocat : lieni, vesicæ, renibus vtile. Tam humidi quàm sicci, expressi quæ succi caulibus, folijs, radicibus quæ, vsus inualuit ex aqua mulsa. Pseudobunium palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulos quæ napi ferens, acri gustu. Tormina, atq; stranguriam, laterum quæ dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua: illiti quo quæ cum sale & vino, tepentes, strumas discutiunt.

Cham



Chamæcissus.

CAP. CX.

**C**hamæcissos, folio est hedera, tenuiore, longiore, ramulis à radice quinis senisve, drantalibus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili: nascitur incultis. Bibunt convenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis quateragenisve diebus: eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Non est, quannus id sonet Græca - nica di- elio, he- dera ter restris vulgò

Chamæleuce.

CAP. CXI.

**C**hamæleuce lumborum doloribus propitia est, herba virens, incuruis folijs, surculisque: flore rosaceo.

nomina- ta: quod eam pau- lò studio- sius cum

Buglossum, seu lingua bubula.

CAP. CXII.

**B**uglossum nascitur in campestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam, quæ treis thyrsos emittit, cum semine & radice tritam, potamque, contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. herbâ abscessibus vtilem esse volunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in vinum deiectum, animi voluptates auget.

descri- ptione confe- rens, li- quido co- gnoscet. Vulgaris Borago.

ANNOTATIO.

Nostrum Cynoglossum caulem & purpureos flosculos edens, nō esse verum ac legitimum, historia eius apertissimè indicat.

Cynog



## Cynoglossum. CAP. CXIII.

**C**ynoglosson folia latifolia plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur: prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe veteri, medentur morsibus canum, alopecijs, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herbe ex vino petum.

## Phyteuma. CAP. CXIIII.

\* Stru-  
shij.

**P**hyteuma folia habet\* radicle, minora: copiosum semen, perforatum, radicem parua, tenuem, per summa terre nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

## Leontopodium. CAP. CXV.

**L**eontopodium duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum quaternumve digitorum, hirsuta, que iuxta radicem lanosiore floceo canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo stissa lanugine inuolutum est, ut sepe fallat: radice parua coheret: quam tradunt appesam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

## Hippoglossum. CAP. CXVI.

**H**ippoglosson, frutex est folia habens rusci tenuis figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguæ a folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succusque admiscetur.

**A**ntirrhinum. CAP. CXVII.  
Antirrhinon, alij anarrhinon vocant, herbam



*bam caule & folijs anagallidi similē: flore albæ violæ, purpureo, minore tamen, ideoque syluestris lychnis nominata est: semine vitulinarium simili. Tradunt perunctos ea, cum oleo lilino, venustiores fieri: nec vlllo medicamento ladi posse, si quis appensum gesserit.*

Catanance.

CAP. CXVIII.

**E**X eo genere vna, folia coronopi habet, longa, radicem iunci modo prætenuem: capitula sena, septendecim, in quibus erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milui exanimati. Altera mali parui magnitudinem explet, radice exiguae olivæ magnitudine: folijs quoque olivæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen, ut cicer, minutum, in virgulis dependet, puniceæ coloris, multis foraminibus pertusum. Viranque narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his uti traduntur.

Tripolion.

CAP. CXIX.

**T**Ripolion in marinis nascitur locis, quæ alludit vnda, recedensq; dimittit, neque in mari, neq; in sicco: folio glasti crassiore palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, sero puniceï conspiciuntur. Radice allæ, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in vino pota, aquâ, vrinamq; per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ venena arcent.

ANN



Officinarum Capillus Veneris. Est enim earum Adiantum, non quod hic Dioscorides, sed Plinius lib. xx. cap. xxj. depinxit, & candidum vocauit: non quin & ipsum, uti suspicamur, fuscus obtineat coliculos, sed quia Trichomani, quod illi nigrum est adiantum, comparatum, album potius, quam nigrum, appareat.

Adiantum.

CAP. CXX.

**A**dianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, pretenues, palmum alti: radice superuacua: neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Decoctum herbae potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & urinae difficili. Calculos fragit, aluum sistit, serpentium moribus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas vias, & menstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit: furfures, et mania capitis vlcera, ex lixiuio emendat: defluentes capillos continet cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, vinoque. Decoctum eius cum lixiuio & vino infusum, idem praestat: coturnices, & gallinaeos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Scribitur gratia utilitatis pecorum circa ouilia.

*Vmbrosis,*



*Vmbrosis, & paluſtribus, circa parietum aspergines, & fontium ſpecus enaſcitur.*

Trichomanes. CAP. CXXI.

**T**richomanes naſcitur eiſdē in locis, quibus *Officinis*  
*adianton filici ſimile, ſed exilius: folijs lenti-* *polytri-*  
*cula, tenuibus: in ordinem vtrinque digeſtis, ad-* *chō quod*  
*uerſis in ſe, in ramulis tenuibus, acerbis, fuſco colo* *idē tamē*  
*re ſplendentibus. Eadem quæ & adianton præ-* *cū Adi-*  
*ſtare poſſe conſtat.* *anto.*

Xanthium, ſiue Lappa. CAP. CXXII.

**X**anthiū naſcitur læto & pingui ſolo, & la *Vulgò*  
*cubus exiccatis, caule cubitali, anguloſo:* *lappa mi-*  
*pingui, prodeuntibus ex eo crebris alijs: folia atri-* *nor.*  
*plicis habet, inſecta, naſturtium odore imitātia,*  
*fructum grandis oliuæ modo, rotundū, & vt pla-*  
*tani pilula, ſpinoſum, qui contractu veſtibus ad-*  
*hæreſcit. Is antè collectus quā perfectè ſicceſcat,*  
*tunditur, & fictili vaſe reconditur. Flauos autē*  
*facit capillos, ſi acetabuli inſtar tepida aqua ma-*  
*deſcat, mox caput, nitro antè perfrictum, illina-*  
*tur. Alij in vino tundunt, & ita aſſeruant. Se-*  
*men aptiſſimè tumoribus imponitur.*

Aegilops, ſiue feſtuca. CAP. CXXIII.

**A**egilops herbula folia tritici habens, ſed  
*moliora, in ſummo capite ſemina bina*  
*ternāve, rubra, quibus ariſte quaſi capillaceæ*  
*exerūt. Illita cū farina herba ægylopijs medetur, Marcel*  
*duritias diſcutit. Succus farine admiſtus, ſicca-* *lo ſuppo-*  
*nur, & eorundē gratia reponitur.\* Bromus her-* *ſititia.*

A



ba egilopi similis, exiccatoriā vim habens, decoquitur cū sua radice in aqua ad tertias, & iuricolato per modus mellis adijcitur: rursus incoquitur, dū liquidi mellis crassitudo fiat. Linteū eo humore imbutū, & narribus inditū, contra graneolentiam vlcerum efficax est. Aliqui tritā alcen addunt, & eo modo vtuntur. Cum siccis rosis cocta in vino, grauem oris halitum emendat.

Glaux. CAP. CXXIII.

**G**laux cytiso aut lenticule folijs similis, quæ supernè virèt, auersaque cālidiora spectantur: ramuli à terra exiliūt quini senāve, tenues ab radice, dodrantē alti: flores violæ albe, purpurei exeūt, minores tamē: nascitur iuxta mare. Coquitur cū hordeacea farina. sale, & oleo in sortitione, ad reuocandam extinctilactis vbertatem.

Polygala. CAP. CXXV.

**P**olygala palmi altitudinem petit. folijs lenticule. gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundantiam facit.

Osyris. CAP. CXXVI.

Censetur  
Linaria  
vulgo ap-  
pellata.

**O**Syris, frutex est niger, ramulos ferēs tenues, lentos, fractūq; contumaces: & in his folia, quaterna, quina, senāve, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

Aspera similax. CAP. CXXVII.

**S**milax aspera, folia habet periclymini: samenta tenuia, multa, rubi modo aut palustris

ac.



aculeata: arbores scandit ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt. gustumq; leniter mordent. Nasitur in palustribus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia & acini, & ante & post epoti, venenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucē editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiā ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus venena arcentur.

Læuis smilax. CAP. CXXVIII.

**L**æuis smilacis folia hederæ similitudinē habent, molliora, leuiora, tenuiora: huius sarmenta nullis horrent spinis: concluditur arboribus, ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exiguum: flores circumquaque exiliunt cādidi, copiosi, orbiculati. Hac smilace, quadā topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam factitantur: folia per autumnum decidua. Semine cum dorycnio poto, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

Ruscus. CAP. CXXIX.

Offici-

**S**ylvestris myrtus, aliquibus oxymyr sine, nis Brabant myrtacantha, Latinis ruscū appellatur: scus. foliū fert myrti latius, in formam lanceæ mucronatum: bacce per maturitatē rufescent, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus, nucleo: cubitales ramuli ad radice exeunt, vitiliū modo lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis

A 2



simili, acerba, & subamara. Folia & bacca in vino pote urinam cient, menses pellunt, vesicae calculos frangunt, stillicidio urinae medentur, dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & precipitibus locis enascitur. Decoctum radice in vino potum, eosdem praebet effectus. Cauliculi recetes, asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinam mouent.

Laurus Alexandrina. CAP. CXXX.

**L**aurus Alexandrina, folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra, dodrantes, interdum longiores: radice\* sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci: & stillicidio urinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

\* Rusco.

Daphnoides. CAP. CXXXI.

**D**aphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq; multis, inde sursum versus foliosis: cortex supra modum viscosus ramos vestit: folia lauri graciliora & molliora, fructu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur. Flores candidi: bacca, cum emarturuit, nigra: radix inutilis: nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens vel aridum in potu, menses ciet & vomitus: caput inanit commanducatum, sternutamenta mouet. Bacca quindecim pote aluum resolvunt. *In h. ram. ontu*

Vulgò  
Laureo-  
la.

Cha

p. 388.



## Chamædaphne. CAP. CXXXII.

**C**hamædaphne virgas emittit cubitales, singulari ramulo cōstantes, rectas, tenues, læues: folia lauri similitudine, lauiora multò, ac viridiora: semen rotundum, rubens, annexū folijs. Illinūtur capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores mulcēt: ad sedanda tormina cū vino bibūtur. Potus cum vino succus, menses & vrinā ciet: idem facit pesso appositus.

## Veratrum album. CAP. CXXXIII.

**H**elleborum album, Latini veratrū album vocant, fert folia plantaginis aut betæ syluestris similia, sed breuiora, & nigriora, \*rubescentia: caulem cauiū, quadrantalem, tunicis cōuolutū, quas abdicat cum arefcere incipit: radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo & exiguō capite caparum modo exeūtibus: nascitur in montibus & asperis. Radices messitus colligendæ. Optimum habetur candidū, friabile, carnosum, modicè extensū, nec tamen iunci modo mucronatum, quod frāgendo puluerem emittit, & tenuē habet medullam, gustu nō admodum feruēs, neque saliuam subinde ciens, (huiuscemodi autem strangulat.) Primatum Cyrenaicū tenet. Galaticum autem & Cappadocium, cādidiora, & puluere quodā obsita, celerius strāgulatus mouent. Vomitione autem varios extrahit humores. Collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutit. Partus impositum necat, menses pellit, ster

\* Plin.  
canaliū  
dorso ru  
bescētia.

A 3869



nutamenta excitat, mures interficit cū melle & polēta subactū, absumit carnes si coquatur vnā. Datur per se ieiunis, & cum sesama, aut ptisane succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cū pane, & ita inassatur. Preparatio corporū, ac victus ratio, diligenter tradita est, cū ab his qui de medica eius potione scriptitarūt, tū maxime à Philonide Siculo Enensi, cui nunc assenti mur: quippe longū nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicā curā di rationem exponere. Dant nōnulli in pultis sorbitione, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari precipientes, statim veratrum offerūt, iis præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis non intempestiuè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subdite ex eo balani, cum aceto.

Veratrum nigrum. CAP. CXXXIII.

**H** Elleborum nigrum, appellatur melampodion, quoniam caprarum pastor, nomine Melampus, furentes in se Prætidæ, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, plurib<sup>9</sup> diuisuris incisa: caulis asper: flore: purpurei, candidi: racematim coercentes: semen cucini, quod in Anticyra sesamoides vocant:



cant: quo deiectiones moliuntur: radicibus cohaeret nigris, tenuibus, à capitulo cepae simili confibratis. quarum est vsus: in collibus, asperis, & siccis locis enascitur. Optimum est, quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu feruensque: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia natum: attamen Heliconium praecellit. Veratrum nigrum purgat ventrem, detrahit bilem pituitumque, datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue drachma salis: decoquitur vel cum lente & iusculis, quae purgationis causa sumptitantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. Menses inditum trahit partus necat, purgat fistulas impositum, & tertia die detractum. Item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum aut etiam tertium diem esse sinitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur: dentium dolorem collutione mitigat: erodentibus medicamentis commiscetur: hydropicorum ventri vtilissimum imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma: coctum proximè radices vitium, vinum purgandi facultate donat. Huius resparsum domos expiari arbitrat: quare inter fodiendum stantes, Apollinem,



Aesculapiūmq; precātur, ac vitant aquile volatus: aduolare enim nō sine periculo tradūt: nanq; si auis effossionem hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter effodiat̃ur oportet, quoniā halitu caput aggrauat. quapropter, ad id arcendum, fossuri alium præsumere, & vinū bibere consueuerūt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesamoides magnum. CAP. CXXXV.

**S**esamoides magnum, in Anticyra helleborū vocant, quoniā albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut rutæ: longo folio: flore cādido: radice gracili, ignaua: semē gustu amaro, cetera sesamæ simile. Ventrē detrahit: datur tritum ad bilis pituitaq; deiectiones, quantū tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquibelo, ex aqua mulsā. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dotrātales: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorū cacumine capitula, florū penē purpureorū, medio eorum albo: semen sesamæ: fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasq;, semen ex aqua mulsā potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Vulgò

Syluestris cucumer. CAP. CXXXVI.

Cucumer asinus.

**C**ucumis syluestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque sarmen



menta sativi refert: radice cãdida, magna: nasci-  
tur in sabuletis, et ruderibus, frutice in totũ ama-  
ro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori cõ-  
uenit. Illita ex polẽta radix, veterem omnem tu-  
morẽ discutit: imposta cũ resina terebinthina,  
tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: poda-  
gras discutit, decocta ex aceto, & illita. Eius de-  
cocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina  
impetiginem, lepras & vitiliginem absterget: ni-  
gris cicatricibus colorẽ reddit, & in facie macu-  
las expurgat. Radicis succus sesquiboli pōdere,  
& item cortex, acetabuli quarta parte, bilem pũ-  
tuitamque deiciũt, praesertim in hydropicis: (de-  
iectiones autem citra stomachi iniuriam mouet)  
radicis selibra, in vini praesertim Libyci hemina  
conteritur, dantũrque ex eo terni cyathi triduo,  
dum tumor abundẽ deprimi cernatur. E fructu  
huiusce cucumeris, fit medicamentũ, quod elate-  
rium vocatur, ad hunc modum: Decerpti cucu-  
meres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur no-  
ste vna: post tridie imposito supra craterem ra-  
riore cribro, vtrisque manibus prehensi, sigilla-  
tim supino cultro, sursum versus aciem habente,  
finduntur, atque per cribrum humor in subie-  
ctum vas exprimitur: simulque carnosum quod  
haesit cribro, quò facilius excidat, eliditur, quod  
ita pressum est, residere sinitur, atq; in vicinam  
peluim demittitur. Coaceruata autem in cribro  
segmina, dulci aqua perfundũtur, et denuò pres-

Elate-  
rium.



sa abiciuntur. Humor in pelui agitatur, & linteo opertus Soli exponitur: dumq; steterit, tota supernataus aqua cum humore concreta, effunditur. Hoc verò identidem fieri solet, donec, existens aqua liquecat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium cauantes, triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumque in pila, ut dictum est, conterunt. Alii pro dulci aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alii in nouissima lotionne, mulsam aquam respergunt. Elaterium optimum esse constat, leue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumq; si turbidum spectetur, atque erui cinerisq; plenum sit, graue & vitiosum esse solet. Nec desunt, qui cucumis succo amyllum immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. A limatu ad decennium deiectionibus utile est. Integer modus, obolus est: minimus, semiobolus: pueris, chalci duo: siquidem copiosius, periculum adfert. Bile ac pituitam utraque parte extrahit. Optima suffiriosis est purgatio. Quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & siliij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia dato, postea  
cyat



cyathus vnus aquæ tepidæ sorbeatur: ad citâdas  
tamen vomitiones aqua diluens elaterium, subie  
ctas linguae partes penitissimè penna oblinito:  
quòd si quisquam difficilius euomat, oleo aut vn  
guento irino resoluito, somnũ inhibeto. Porrò his  
qui eximiè vacuantur, continuè vinum, & oleũ  
dari cõuenit: etenim vomendo restituũtur. Quòd  
si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polëta,  
posca, poma, & quæ stomachum densando corro  
borant, offerenda sunt. Ciet elaterium mēses, &  
partus enecat, in pēssõ subditum: morbo regio me  
detur, cū lacte naribus infusum, & diurnis ca  
pitis doloribus liberat: efficacissimè anginis illini  
tur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. CAP. CXXXVII.

**S**taphis agria, siue herba pedicularis, folia ha  
bet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, mol  
le, nigrósq; fert florem glasti, & folliculos viri  
des, similes ciceri, & in his nucleum triangulum,  
scabrum, ex nigro subfuluēscētem, intus album,  
gustū acrem. Grana quindecim, si trita in aqua  
mulsã dētur, crassum humorem per vomitũ pur  
gant: sed qui hauserunt: ambulare debent: prudē  
ter tamen attendere oportet, & aquam mulsam  
continuò potui dare: quoniã pericula strāgulatio  
nis inferunt, & fauces adurūt. Trita, & ex oleo  
illita phthiri, si prodest: item prurigini & psoris.  
Ciet plurimam pituitam commanducata: decocta  
in aceto, dentiũ delori, collato cre, sul uenit: rheu  
mat



matismū gingivarū sistit: vlcera oris manātia,  
cū melle sanat. Vrētibus malagmatis imponitur.

Thapsia. CAP. CXXXVIII.

**T**hapsia nomen ideo accepit, quòd in Tha-  
pso eiusdem nominis Insula primū inuen-  
ta sit. Tota verò natura ferulæ similis est: graci-  
liore caule folijs: fœniculi: umbella anethi in ca-  
cumine, à singulis surculis erūpēte: flore luteo: se-  
men quale ferulæ, latiusculū, sed aliquantò mi-  
nus: radix foris nigra: intus candida, longa, a-  
cris, crassiore libro vestrata. Lactis extrahēdi ra-  
tio hæc est: Facto in ambitu scrobe, cortices inci-  
duntur: aut radix in fornicis speciem in se exca-  
uata, cooperitur, quòd merus succus cōfluat: oportet illuc sequenti die se conferre, & congestū suc-  
cum extrahere. Tunditur etiā radix in pila, &  
succus organo per quallū expressus fictili cras-  
so insolatur. Aliqui folium vnā terunt: sed in-  
validior huiusmodi succus. Hoc autē interest,  
quoniam qui ab radice manauit, grauius olet,  
& humidus permanet: è folijs autem extractus,  
exiccatur, atq; teredinum iniuriam sentit. Qui  
succum colligit, stare debet non obuersus vento:  
aut potius, cū dies apricus est, & à flatu silet:  
quoniam ob halitus acrimoniā facies vehemen-  
ter intumescit, nudaq; corpora inuadūt pustule:  
ob id prius liquido cerato, & adstringēte, nudas  
partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cor-  
tex radici, quā succus, purgandi vim habent,  
& lact



& lacteus succus in aqua mulsa potus: nā vtrin-  
que bilē extrahūt. Radicis modus, quaterni obo-  
li, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, ter-  
ni oboli: lactis, obolus vnus, quod eo amplius assu-  
mitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio con-  
uenit suspensiosis, & diuturnis laterum doloribus,  
reiectionibúsque, datur in cibis aut obsonio, qui-  
bus difficile sit vomere. Tam radix, quàm succus  
omnium maximè, quæ pares cū eis vires adeptæ  
sunt: vim habent extractoriam ex alto, vbi ex  
imo aliquid euccandum est, aut meatuū laxitas  
aliò transferēda est: vnde succus illitione, aut ra-  
dix recēs affrictu, alopecias explent. Radix suc-  
cúsque cum æquis ceræ thurisque portionibus, su-  
gillata liuorésque tollunt: sed non plus binis horis  
dimittantur: locus deinde aqua maris calida fo-  
ueatur. Vitia cutis in facie emendat, cum melle il-  
litus succus: lepras tollit: tubercula discutit, per-  
unctus cum sulphure. In diuturnis pulmonū, la-  
terum, pedū, articulorūque valetudinibus vti-  
liter illinitur. Valet ad integendam colis glandē,  
ijs qui natura, non circuncisione, curti sunt: tu-  
morem enim excitat, qui pinguium fotu emolli-  
tus, præputij iacturam resarsit.

## ANNOTATIO.

\*Sine foliis, ] Spartium, vt in agro Monf-  
peffulano eius feracissimo sæpe obseruauī  
(à G. Rondelletio eius loci clarissimo Me-  
dico primū admonitus) cū primū erum-  
pit,



pit, plurimis foliolis turget, quibus omnibus cum ad consistentiam peruenit (quo solo fortassis tempore visum Dioscoridi) exiit, adeo ut ramuli eius iuncea deinde appareant. Est tamen hoc diuersum plane ab eo, cuius Plinius lib. x i x. cap. i i. meminit. Ceterum an spartiū hoc loco depictum, sit idē cum genista Latinorum, malo equidem dubitare cum Plinio, quam eorum iudicio subscribere, qui diuersi generis plantas esse contendunt: & pro genista fruticem quendam rebus alligandis (quod in illa tamen requirit Plinius, & Maro in Georgicis, cum lentam appellet satis innuit) parum idoneum ostendant.

## Spartium.

## CAP. CXXXIX.

*S*partiō frutex est, longas ferens virgas, \* sine folijs firmas, fractu contumaces, quibus vites vincuntur: semē lenticulae, in folliculis phasiolorum modo nascens: florem, ut albae violae, luteum. Purgant per superna vehementer, hellebori vice, citra periculū flores, & semina, quinque obolis in aqua mulsa pota. Semē deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus: ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidā marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere: strimenta autem elicit cruenta.

Sik



## Silybum. CAP. CXL.

**S**ilybon, lata spina est, folia ferens chamæleonis albi. Hæc recens cum sale oleoque cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus, vomitiones ciet.

## Glans vnguentaria. CAP. CXLI.

**G**lans vnguentaria, fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellane nucis, cuius nucleus græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad pretiosa vngueta pro oleo vitæ tur: nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæa. Prefertur plena, reeens, candida, quæ faciliè delibretur. Ea drachmæ pondere pota, linem absomit: cum lolij farina, & aqua mulsa, podagricis illinitur: psoras lepræque decocta in aceto, vitiligines & nigras cicatrices cum nitro, emendat: & cū lotio lentigines, varos & papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit: verum tuse & expressæ succus abstergentibus medicamentis adijcitur, quæ aduersus pruriges & scabritias idonea sunt.

## Narcissus. CAP. CXLII.

**N**arcissum sunt qui ut lilium, liriū appellant, folia porro similia, tenuia, multò minoræ, & angustiora: caulis vacuus, & sine folijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus

eroc



croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrum, longum: probatissimus nascitur in montibus suavi odore: ceteri porrum imitantur, atque herbacium virus olent. Radix cocta, siue estur, siue bibitur, vomitoria est: ambustis igni prodest, cum exiguo melle trita: praecisos nervos illitu glutinat: luxatis melleolis, diuturnisque articulorum doloribus, trita ex melle & imposita, subuenit: vitia cutis in facie, vitiliginisque cum semine vrticæ, & aceto emaculat: cum eruo & melle, ulcerum sordes expurgat: abscessus rumpit, concoctioni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Hippophaës. CAP. CXLIII.

**H**ippophaes, quo fullones vestes interpolat, in sabulosis, maritimisque nascitur. surculaceo frutice, undique denso & largo folijs oleæ, longioribus, mollioribusque: inter quæ candicantes spinæ emicant, sicce, angulosæ, interstitio quodam distantes. flores hederae corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescens: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustati: ex qua perinde ac thapsiæ, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, siccatur, & ad usum reconditur. Syncerus, pituitas, bilem, aquasque detrahit, oboli pondere: erui verò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa. Frutex cum radicibus



dicibus siccatus tunditur, & cum aquæ mulse dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depromitur, vti in thapsia: huius in purgationibus modus est drachma.

Hippophæstum. CAP. CXLIII.

**H**ippophæston, id, quod aliqui hippophaës appellat, nascitur eisdem locis, quibus hippophaës, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs parvis, spinosis: radículas habēs molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis, in aqua mulsæ, aquâ pituitâsq; detrahit: priuatim comitialibus morbis, nervorum vitijs, & orthopnææ conuenit huiuscemodi purgatio.

Ricinus. CAP. CXLV.

**C**ici, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine: arbor prouenit parvæ ficut altitudine, folio platani, maiore, leuiore, & nigriore: ramis, caudicibusq; cauis, in arundinis morē: semine in vuis asperis, quod corticibus exutam, ricinū animal representat: ex quo oleum, nomine cicinum, exprimitur, cibis fœdum, lucernis emplastrisq; vtile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt: vomitionesq; mouent, sed inuicunda admodū est, & molestā purgatio: siquidem stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varosq; expurgat.

Vulgò  
Catapu-  
tia ma-  
ior.

B.



Folia cum polenta trita, inflammationes oculorū,  
tumoresq; leniunt: rigentes mammæ colibent.  
eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Tithymali.

CAP. CXLVI.

**T**ithymali genera septem, quorū masculus,  
characis appellatur, ab aliquibus amygdala  
loides: alter, myrtites, qui fœmina existimatur,  
eūmq; myrsiniten aut caryiten vocant: tertius,  
paralius, quē tithymalida appellant: alius he-  
lioscopius: quintus, cyparissius: sextus, dendroi-  
des: septimus, platyphyllos dicitur. Characie cau-  
les supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri,  
lacteō succo atque acri madentes: folijs oleæ cir-  
cum ramos, angustioribus, & longioribus: ra-  
dice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus cau-  
lium, coma iunci, sub qua caecole foliolis balnea-  
rum similes, in quibus semen cōtinetur. nascitur  
in asperis, & montibus. Succus aluum purgat:  
trahit pituitā bilēmq; binis obolis in posca sum-  
ptis: & cū aqua mulsa, vomitiones mouet. Ap-  
petente vindemiarum tempore, succus congestis  
ramulis, mox dissectis, & vase conclusis, excipi-  
tur. Aliqui adyiciunt farinā erui. & in pastil-  
los digerunt, qui erui magnitudinem impleant.  
Alii in aridas ficos, ternas quaternasve guttas  
instillant, ut cum his inarescant: quæ ad vsus  
recondunt. Per se etiā tusus in pila, & in pastil-  
los coactus reponitur. Porrò cū extrahitur lac,  
neque quò ventus aspiet, stare quenquam, neq;  
manus



manus oculis admouere conuenit. sed antequam colligas, corpus, præsertim faciem, collum, scrotumq; genitalis, adipe aut oleo cum vino perungere. Fauces autem exasperat: quapropter catapotia, cera aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari: binæ tamen ternæve ficos, purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunelos in sole capillos euellit, renascentesque flauos, & exiles efficit: denique omnes perimit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguā vitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes verrucas, pensiles, & quæ thymi florem representant. Valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedenas ulcerum, gangranas, fistulasque. Legitur semen autumnis, & siccatur sole leuiter tunditur, feruefactumq; loco mundo reponitur. Folia itē siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admixto cum lacte lepidio, & caseo confuso. Radix drachma pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore. Fœmina, quam myrsiniten, aut caryiten vocant, similis suapte natura daphnoidi: solus myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantales: fructum fert alternis annis, nuci similem, mordaci gustu: nascitur & hæc in asperis. Suc-



cus, radix, semen, folia, cōsimilem antedictō sortiuntur facultatem: sed ad citandas vomitiones inualidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur paralios, quē tithymalida, aut mecona aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmū altis, quinis semisve à radice exeuntibus: folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in versus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semen, vt eruum, vario colore emicat: flos albus. Frutex totus cū radice lacteo succo turget. Similes ad vsus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacæ, tenuioribus, rotundioribusque: ramulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitulis incluso. Helioscopi nomē accepit, quoniā coma cum sole circūagat: circa oppida nascitur, potissimū in ruderibus. Colligitur succus semēq; vt aliorū. Eadem quæ superioribus vires, nō tamen vsque adeo valide.

Ciparissias in caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subrubrum: ex quo folia piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & in totum nascentem piceam æmulatur, vnde nomen traxit. Candido succo madet, cui eadem vis quæ superioribus. In petris nascens, dendroides cognominatur, ampliter opacat, in cacumine frondesam spargens comā, succo lacteo pragnās, cauliculis rubentibus: folijs myrti tenuioris: fru-

Etia



*Et characice. Eiusdem effectus, cuius superiores, similiq; modo reconditur. Platyphyllos, verbasco similis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tusus, & aquæ inspersus. Reliqua tithymalorum genera, quæ suprâ scribuntur, idem efficiunt.*

*Pityusa.*

CAP. CXLVII.

**P**ityusam specie à cyparissia differre constat, etsi tithymalorū generi assignetur. caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut purpureo: semine instar lenticulæ, lato: radice crassa, candida, succo referta. quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluū radix, drachmis duabus data in aqua mulsa: item seminis drachma: succi cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur: modus foliorum drachmæ tres.

*Lathyrus.*

CAP. CXLVIII.

**L**athyrus, quam aliqui tithymalum appellant, eamq; tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit culiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem gignūtur in cacumine ale, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & leuiora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora cōspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructū summis surculis gerit, triplici loculamento insignē, rotundum, ceu capparin, in quo gra-

Offici-  
nis Ca-  
taputia  
minor.



na intercusantibus membranis inter se distincta continentur, eruis maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis vsus. Totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex aut septem in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda: trahunt autem bilem, pituitâ, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia decoquuntur ad eisdem effectus.

Peplus.

CAP. CXLIX.

**P**eplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut rute, paulò latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs rotundo, minore quàm candidi papaueris: pluribus scatet auxilijs. vnicam radicem habet, superuacua, ex qua fruticat: nascitur inter vires, & in hortis. Colligitur messibus: ficcatur in umbra, & continuè versatur. Fructus tussus & feruesfactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyathopoto: obsonijs inspersa cõturbat aluû: muria conditur.

Peplis.

CAP. CL.

**P**eplis, quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maximè nascitur, latè opaco frutice, cãdidi succi pleno: folijs satiniæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in  
peplo,



peplo, feruente gustu: radice singulari, supernacua, tenui. Colligi, & reponi ac dari, uti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet vires.

Chamælyce.

CAP. CLI.

**C**hamælycen aliqui sycen nominant. Ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terrâ deiectos: folia lentis, parua, peplum planè referentia, tenuia, quæ à terra nō attolluntur. Semine sub folijs rotundo, ut in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, supernacanea. Rami ex vino tritici vulue dolores sedant, in pessa appositi, tollunt tumores ac verrucas omnium generum illiti: decoctorum cibo, aluus resoluitur. Succus simili effectus prodest: illitus contra scorpionis ictum auxiliatur: aduersus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosisque nascitur.

Scammonia.

CAP. CLII.

**S**cammonia, ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant: folijs helxinae, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite excepto radice in testudinis speciei cultro excavatur, quo fit ut in cauum confluat succus, qui cochlis demum ex-



cipitur. Alii scrobes in terra cōcamerato sinu fo-  
diunt, in quos subiectis iuglandium folijs, profun-  
dunt succū, siccātūmq; extrahūt. Laudatur au-  
tem scammoniū leue, nitidum, rarum, & colore  
quā simillimum taurino glutini, fungosum, te-  
nuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiae de-  
portatur. Nec attendere solum pars est, si linguae  
tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod  
admixto fit tithymali lacte) sed longē magis an-  
tea narratis. Item si non vehementer linguā ex-  
urat, id quod mixti tithymali argumentum est.  
Natione autem Syriacum & Iudaicū deterri-  
ma habetur, grauiā, densa, erui farina & tithy-  
malo vitiata. Succus drachmae vnius aut qua-  
ternū obolorum pondere hauſtus, ex aqua pu-  
ra vel mulsā, per inferna bilem & pituitam ex-  
trahit. Ad resoluendam aluum binos obolos cum  
sesama, aliōve semine, sumpsisse satis est. Dantur  
efficacioris purgationis causa, succi tres oboli, cū  
duobus veratri nigri & aloēs drachma vna.  
Fiunt purgatorij sales, drachmis viginti succi  
scammonie, in senosalis cyathos adiectis. Horū  
modus proportionē virium: integer quidem, tria  
cochlearia: medius, duo: minimus, vnum. Radicis  
drachma vna aut altera purgat, cum ijs quae  
retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt.  
Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina te-  
ritur, cataplasmate ischiadicis vtili. Partus ene-  
cat succus: vuluae in lana subditus: tubercula di-  
scutit



scutit cum melle aut oleo illitus: decocto in aceto peruncta lepræ abiguntur: diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

Chamælea.

CAP. CLIII.

**C**hamælea surculosa fruticat, ramis dodran- Offici.  
talibus: folia oleæ similitudinem habent, te- nis Me-  
nuiora & amara, quæ gustata linguâ mordent: xereon,  
& arteriâ deradunt. Detrahit pituitâ bilémq; Arabû  
folijs præsertim in catapotio deuoratis: nâq; duæ more.  
absynthij partes, adiecta chamælea vna, hydro-  
melite excipiuntur, & in catapotia coguntur: ea  
autem in ventre non liquefcunt: siquidem quot-  
quot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cum melle  
tritris sordida vlcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa.

CAP. CLIIII.

**T**hymelæa est, quæ granum gnidium, quod Granû  
est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apo- Gnidiû.  
linum vocant, quoniam satiui lini frutex suapte  
natura similitudinem referat. Virgas edit per-  
pulchras, multas, tenues, binum cubitorum altitu-  
dine: folijs chamæleæ, angustioribus, & pingui-  
oribus, viscosis, gummosisque, si mordeantur: flore  
candido: fructu myrti in modum rotundo, qui in-  
ter initia viret, & tandem rubescit: inuclucrum  
fructus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per  
inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahit, si vi-  
ginti granorum pars interna libatur: verum fau-  
ces adurit. Itaq; cum farina aut polenta, aut in vne  
acino dari debet, aut melle cocto obductum deno-



rari. Qui agrè desudant, trito semine cum nitro & aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter cneorum appellantur, per menses colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere convenit. Illitum acetabuli modo, cum diluta vini portione, aquâ extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut contritis cleribus. Thymelææ farina vna acerba succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposta necat. Nasclitur in montibus & asseris. Hallucinantur, qui coccon quidum fructum esse chamæleæ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

Sambucus.

CAP. CLV.

**S** Ambuci duo genera: vnum in arborē assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia iuglandis, ternæ, quaternæve, ex intervallis circa ramos exeunt, grauiâ odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorū cacuminibus cauliculisq; circinate umbellæ, quæ florē candidum pariunt, mox acinum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, vinosūmq;. Alterum genus, chamæacte vocatur, Romanis ebulum, longè humilior est, magisq; herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs amygdalæ, ex intervallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq; graucolētibus,

118



in ambitu serratis: muscario sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem vtriusq; vis, & vsus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum more coquuntur, ad pituitam bilémque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiuvat: prodest viperarum moribus, eodem pota modo: vulvas emollit insidentium decocto, patefacit earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti. Folia si prætenera ac mollia ex polenta illinātur, inflammationem mitigāt: ambustis & canis moribus illitu profunt: vlcera que dehiscunt in fistulam, agglutinant: ijs, qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino profunt illita folia.

## Pygnocomum. CAP. CLVI.

**P**Ygnocomon constat eruce folijs, acrioribus, scabris & crassis, caule quadrangulo: flore ocymi: semine marrubij: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente: inuenitur in saxosis locis. Semen graua somnia, & tumultuosa facit, drachma instar potum: tumores discutit, illitum cum polenta, & spicula, adactosq; corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tubercula, panosque discutiunt. Radix eius in aqua mulsā duūm drachmarum pondere, aluum soluit, & bilem extrahit.

Apios.



Apios.

CAP. CLVII.

**A**pios ramulos duos siue tres iuncea-  
 spargit, rubres, tenues, qui à terra pa-  
 rum attolluntur: folijs rutæ, oblongioribus tamē  
 & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radi-  
 \* Aspho ce \* hastule regie, in formā pyri turbinata, ro-  
 deli. tundiore tamē succi fecunda, intus habet corpus  
 candidum, extrā cortices nigros. Superior pars  
 eius vomitione bilem pituitasque extrahit: infe-  
 rior, per aluum: tota vtrunque purgationes mo-  
 uet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili  
 mergitur, & agitata aqua, quod supernatat  
 penna selectum, exiccatur. Purgat vtraq; par-  
 te is succus, sesquibolo potus.

Colocynthis.

CAP. CLVIII.

Colo - **C**olocynthis sarmenta foliaq; satiui cucume-  
 quinti- ris emittit, per terram repentia, diuisa, fru-  
 da offi - ctum in speciem mediocris pile conglomeratum,  
 cinis. vehementer amarum: quem legere oportet, cū  
 coeperit in pallidum colorē permutari. Medulla  
 fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli  
 cum aqua mulsa, melle cocto, myrrha & nitro  
 excipiatur, & cogantur in catapotium. Arefa-  
 ctæ pile teruntur, & infusæ clysteribus prosunt  
 nervorum resolutioni, coxendicum doloribus, &  
 coli vitijs, vt quæ bilem, pituitam & strigmēta,  
 interdum etiam cruorem eliciant: fœtus admotæ  
 enecant: dentium dolorem tollit, si vna repurge-  
 tur & luto oblita cū aceto & nitro inferuescat,  
 hoc



*hōcq; iure decocti dentes colluātur: si aqua mul-  
sa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo  
refrigescat, potu crassum humorē & strigmenta  
alui detrahēt: stomacho supra modū aduersatur:  
subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur.  
Virentis succo vtilissimè ischiadici perficiantur.*

Epithymum.

CAP. CLIX.

*E* Pithymon, flos est è thymo duriore, satureiæ Aliud à  
similis: capitula habet tenuia, & leuia, & nostro  
in eis caudiculas, quasi capillamēta. Potum cum Epithy-  
melle detrahit pituitam bilēque atram, per in-  
ferna. Priuatim prodest melancholicis, & infla-  
tis, acetabuli mensura, ad quatuor drachmas,  
cum melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in  
Cappadocia & Pamphylia gignitur.

Alypum.

CAP. CLX.

*A* Lypon surculosa herba est, subrubra:  
gracilibus ramulis: tenuibus folijs, flore  
molli, leui, & copioso: radice betæ, tenui, referta  
acri succo, semine epithymi: gignitur in mariti-  
mis, maximè Libyæ, quàm largissima: quāquam  
alibi quoq; plurima prouenit. Semen atrā bilem  
deijcit, si mensura epithymo pari cū sale & aceto  
sumatur: verū interanea leniter exulcerat.

Empetrum seu calcifraga.

CAP.

CLXI.

*E* mpetron aliqui \* phacoides vocant, nasci \* Gale-  
tur in montibus, & maritimis, salso gustu, nus pra-  
sed quò propius terreno fuerit, amariius sentitur. foides.

Trahit



Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis sylvestris. CAP. CLXII.

**V**itis sylvestris sarmēta vitis modo praelonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensis solani, longioribus ac latioribus: muscoso flore, & capillaceo: fructu exiguis uvis simili, post maturitatē rubente: rotunda est acinorum facies. Feruē facta radix in aqua, & in cyathis duobus vini aqua marina diluti, pota, humorē alui ciet: idē hydrepicis datur. Vna eius, vitia cutis in facie, et maculas omnes expurgāt. Enascentes viticule, cibi gratia, sale cōdiuntur.

Vitis alba. CAP. CLXIII.

**Offici.** **V**itis albam aliqui bryoniā vocāt. Folijs, viticulis, pampinisq; salinā vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea, quos prope se nacta sit frutices, suis claviculis cōplectitur: fructus rubens in vna dependet, quo coria pilis spoliantur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cilo, aluū & urinā ciet. Folia, fructus, radix, acrem vim sortiuntur: itaq; vlcera phagedenis gangrenis, chironis, putrentium viliarū tadio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat: vitia cutis in facie, varosq; lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & fenogrecō. Eodem effectū prodest decocta in oleo, usque dum liquecat: sugillata tollit, & reduvias

comm



committit : inflammationes discutit illita ex vino : suppurationes rumpit : medicamento aptè immiscetur, quod carnē exest : infracta ossi extrahit, trita & imposita. Datur comitialibus in potu drachma pondere, quotidie, anno toto Prodest attonitis, & vertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra viperarū ictus pota drachmis duabus, auxiliatur : partus necat, mentem interdum subvertat : feminarū locis apposita, partus secundasque morantes trahit : cit vrinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficilē spirantibus, strangulatu oppressis, tussientibus, vulsis, ruptis, & laterū doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto, triginta diebus, consumit : illinitur ad eadem cum fico. Ad muliebres infessus decoquitur : siquidem vulvas purgat, sed abortū facit. Succus ē radice vere exprimitur, qui trahit pituitā, cum aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras, semen efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus eius, si cum tritico decocto sorbeatur.

Vitis nigra. CAP. CLXIII.

**N**igra vitis, quam aliqui nigrā bryoniam vocant, folia fert hederae, smilaceis proxima, sed maiora : caules etiam cognatos capreolis suis arbores, quasi adminicula, comprehendit : fructus racematim coheret, qui inter principia virent, & post maturitatem nigrescunt radix foris nigra, intus luteo colore. Viticulae, quae primo germinū partu erumpunt, in clera recipiuntur :



tur: menses pellunt, vrinas cient, lienem absu-  
munt, vertiginosis, comitialibus, neruorum reso-  
lutione tentatis, prosunt. Radix eadem, quæ vi-  
tis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino  
exulceratis iumentorum ceruicibus commodissi-  
mè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Filix.

CAP. CLXV.

**F**ilici folia sine caule, sine fructu, sine flore,  
ex vno pediculo, cubitali longitudine exeunt,  
multifida, & lateribus pennata, subgravi odore:  
radice per summa cæspitum nigra, oblonga, fili-  
ces multas fundente, subadstringente gustu. na-  
scitur in montibus, & saxosis. Radix latas tineas  
excudit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mul-  
sa: melius si cum scamonie aut veratri nigri to-  
tidem obolis detur: sed qui sumunt, allia prægusta-  
re debent. Laborantes lienis incremento recreat.  
Radix & potu & illitu cum axungia vulneri-  
bus sagitta arundinea factis, est auxilio: cuius rei  
probatio talis fertur: Peribit filix, quam per am-  
bitum sata copiosior arundo coronet: & contrà,  
evanescens abilit arundo, quam obsepiens multa  
filix in orbem cinxerit. Filix femina folijs est fi-  
licis, surculosis, altioribusq; & quæ non singula-  
ri, vt illa, pediculo fulciantur: radicibus longis,  
pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flau-  
scunt. aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur. Pel-  
lunt lata interaneorum animalia, cum melle, ecle-  
gmate sumpto: pota cum vino, drachmis tribus,  
teretes.



teretes tineas eijciunt: datae faeminis, sterilitatem faciunt, & praegnantibus abortu, si supergrediantur. Farina humidis vlceribus & cicatrici repugnantibus inspargitur: iumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia, in oleribus cocta mendantur vt ventrem emolliant.

Filicula, siue polypodium.

CAP. CLXVI.

**F**ilicula nascitur in muscosis petris, & vetustis arboru caudicibus, praesertim quercuu, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta. non tenui perinde diuisura: radix pilosa, in qua continetur cirri, ceu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Aride farina aquae mulsae insparsa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas, quae inter digitos fiunt.

Dryopteris. CAP. CLXVII.

**D**ryopteris nascitur in veterum roborum musco, filici similis, multo minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur.

C



## Cnicus. CAP. CLXVIII.

Offici-  
nis, Car-  
tamus.

**C**Nicus folijs cōstat oblongis, per ambitum di-  
uisis: asperis, spinosis: caule sesquipedali: capi-  
tulo magnitudine grandis cliuæ: flore croci: semi-  
ne cādido, alioqui rufo, lōgo, anguloso. Huius flo-  
re in obsonijs vtuntur. Seminis tusi & expressi  
succus cū aqua mulsæ, vel iure gallinacei aluum  
purgat, sed stomacho aduersatur. Ex eo autē fiūt  
offula, quæ placētulus vocāt, adiectis succo amy-  
gdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum  
emolliūt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ  
nucis iuglandis magnitudinem impleant: è qui-  
bus ante cœnam duas vel tres sumpsisse satis est.  
Ratio temperandi hæc est: Cnici candidi sexta-  
rius, amygdalorum tostorum & delibatorū cya-  
thi tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drach-  
ma vna, cum carnibus triginta caricarum. Semi-  
nis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ  
alui facultate donat.

## Mercurialis. CAP. CLXIX.

**L**YNOXOSTIS, aliqui parthenion, alij hermubo-  
tenion appellāt: folijs cōstat ocymi, helxinæ  
cognatis, sed minoribus: ramulis duplici genicu-  
lorum nodo cinctis, alarum cauis multis: fructu  
fœminæ, copioso, quandam racemorum speciem  
præbente: mari, è foliorum sinu dependente, par-  
uo, rotūdo, cœu binis testiculis vnâ coherentibus:  
frutice dodrantali aut maiore. Vtraque in oleri-  
bus manditur, ad aluum ciēdam: cocta in aqua,

epo



epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat vt mares gignatur, hunc facere: vt femine, illam, si à purgatione libantur, & trita folia genitalibus admoveantur.

## Cynocrambe. CAP. CLXX.

**C**ynia aut cynocrambe, cauliculum binum dodrantum altitudine emitit, mollem, subalbidum: folia mercuriali aut hederæ similia, certis interstitijs subalbida: semen folijs adheret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum cient: oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam & bilem aquamque detrahit.

## Heliotropium. CAP. CLXXI.

**H**eliotropio magno flos est effigie scorpionis caudæ, vnde scorpiuro ei nomen: & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropiõ dicitur. Folia ocymi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora ramuli à radice terni, quaterni, aut sepe quini exiliunt, multis alis cõcaui: flos in cacumine cãdidus, aut subfulvus incuruatur vt scorpionis cauda: radix tenuis est, & inutilis. nascitur in asperis. Decoctũ herbæ ex aqua, fasciculo manus plene, potu pituit. à bilémq; per aluũ extrahit, contra scorpionũ ictus ex vino potũ, & illitum prodest: ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam vnã ante accessiones, seminis grana quatuor cum vino quartana sinire: tria verò, tertiana. Illitum semen formicantes verrucas pensilẽsq; & thymos, & epinyctidas exic-



cat. Folia infantium de stillationibus, quas syri-  
seis vocant, podagris, luxatisq; utilissimè illinun-  
tur: menses cient: partus trita & imposita pellūt.  
Heliotropion parvū nascitur in palustribus, iu-  
xta lacus, folijs, antedicto proximis, rotundiori-  
bus: semine, acrochordonum verrucarum modo,  
pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, ad-  
iecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas ti-  
neas teretēsque excutit. Pensiles verrucas,  
quæ crochordones vocantur, cum sale illi-  
ta tollit. Scorpicides herbula est, folijs  
paucis. semine caudæ scorpionis  
effigie. Illita scorpionum  
ictibus presenta-  
neo est au-  
xilium.

QVARTI LIBRI  
FINIS.



PEDANII  
**DIOSCORIDIS**  
 ANAZARBEI, DE  
 Medicinali materia,

LIB. V.

Ioanne RVELLIO Sueßionensi  
 interprete.



*Superioribus quatuor libris, amicissime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, vnguentis, & earundē lacrymis ac fructibus, itē animalibus. melle, lacte, adipe, cerealibus, oleribus, necnō de omni radicū. herbarum. succorū. seminūmq; ratione. In hoc autē totius operis quinto differemus de vinis & metallicis, à vite nostram commentationem auspicati.*

*Vitis vinifera.*

CAP. I.

**F**olia vitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigant, & inflammationem stomachi ardorēque, compulenta: folia etiam perse, vt que refrigerent & adstringant imponi solent. Potus eorum succus dysentericis, sanguinē excreantibus stomachicis, & grauidarum malacie medetur. Eadem efficiūt madefacti in aqua capreoli & poti. Lacryma vitii, quæ veluti gummi in caudicibus concrefcit, ex vino pota calculos

C 3



pellit: illita lichenas & psoras leprāsque nitro prius perfrictas sanat: eadem cum oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet: maximèque sanies, quam accensa sarmenta vitium viridia exudarunt: qua & peruncte verrucarum infor- micationes extrahuntur. Cinis sarmentorum & vinaceorum, detractis in cede condylomatis, & thymijs, illitus ex aceto medetur: prodest luxa- tis & viperarum morsibus: contra lienis inflam- mationem illinitur, cum rosaceo & ruta & ace- to. Labrusca duorum generum est: alterius vua non maturescit, sed flore tenus ænanthen nomi- natam perducit. Altera ad frugem peruenit, parvis acinis, nigra, & adstringens. Folia, cau- les, & clauicula, quibus repunt, vim habent cul- tæ viti similem.

Vua.

CAP. II.

**V**Ve recentes aluum turbant, & stomachū inflant: innocentiores, quæ decerptæ diu pependere, (ideo quòd in eis copia humoris exicca- tur) utilisque sūt stomacho, agrisque, atque cibi aviditatē excitant. In vinaceis & ollis servatæ, ori & stomacho grate sunt: aluum sistunt (sed vesicam & caput tentant) & sanguinem excre- antibus conueniunt. Similesq; quæ in musto fue- re. Sapa aut passò conditæ, stomachum magis in- festant. At quæ solem prius passæ in aqua cale- sti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosæ, ar- dentibus & longis febribus salubres. Reconditi  
vin



vinacei inflammatis māmīs, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysentericos, coliacos, & feminas fluxione vulvæ laborantes inuat infusa: ad defecationes, ac fetus assumitur. Nuclei acinorū adstringendi vim obtinent, stomacho vtilis sunt: inspargitur farina tostorum, polenta modo, dysentericis, & coliacis, & solutis stomacho. Vva passa alba adstringentior est: prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis: & decocta in patinis cum melle, admixta milij ac hordei farina & ovo, valet ad purgandum caput: eiusdemque gratia cum pipere commanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos epinyctidas, carbunculos enatas in articulis putredines, & gāgrenas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat: podagra convenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita, celerius extrahit.

Oenanthe.

CAP. III.

**O**Enanthe vocatur vitis sylvestris fructus, cum floret. Recondi debet fictili non picato, collecta q̃; substrato linteo, in umbra siccatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœnice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho ac cunctæ vrine utilis: aluum sistit, ac sanguinis excretiones: contra fastidia, & acorem stomachi, sicca & illita efficax est: capitis doloribus tam viri-

C 4



dis, quàm sicca, ex aceto & rosaceo perfunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipiētes egypas, oris vlcera, & genitaliū nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflā matione vindicat. pessis miscetur, ad sistendum sanguinem: cōtra oculorum delacrymationē, & stomachi ardores, cum polline pollentē & vino illinitur Cinis crematē in seſta, candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta: reduuias & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentāsque, cum melle sanat.

Omphacium. CAP. IIII.

**O**mphacion, succus est acerbe vuæ, nondum matureſcentis, è Thasia vite aut Aminæa. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro are, linteo cooperto, insolare, vsque dum cogatur, semp̄rque quod ceruici vasis cōcretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctūque à subdialibus locis in lectum referre: quandoquidem nocturni rores ipsum cōcrescere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, vuam, vlcera oris, humida gingiuarum vitia, purulentas aureis, cum melle aut passo: itē ad fistulas, vetera vlcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, & mulieribus fluxione vuluæ laborātibz clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritie, & erosionibus angulorum conuenit,

Bib



Bibitur ad recentē sanguinis excreationem, etiā si rupta parte aliqua contingat. sed pauco, & a-quatiore est vtendum: valde siquidem exurit.

Vini natura.

CAP. V.

**V**Ino vetere nerui leduntur, & reliqui sensus, quod tamē gustu suauius est: quare cauendū ijs, qui intestinae alicuius partis imbecillitate sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutū, innoxie sumitur. Nouū inflat, egrē coquitur, insomnia parit graua, & vrinam ciet. Aetate medium, vtraq; vitia fugit: quare ad victus sanorum egrorumq; vsurpatur. Album, tenue, stomacho vtile est, ac facile in mēbra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctu difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, vtpote quod medium est, medias inter vtrunque vires habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vina sapore distāt: siquidem dulce crassis partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat: aluum & interanea, vt mustum, turbat: sed minus inelriat, renibus & vesicae aptissimum. Austerum, per vrinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & cæteras fluxiones colibet, minusq; vrinam expellit. nouū nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum: stomacho aduersatur: sitim stimulat, ner

C 5



uos infestat, aluo aptum, à valetudine se recolligentibus inutile. Passum, quod vuis sole siccatis in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut prammion, aut protropon: & sapa, quæ sit musto igni decocto, Græci sirion aut hepsema appellant: nigra quidem, & quæ dicuntur melampsythia, crassa sunt, & corpora multum alunt: candidum, tenuius: & heluola inter hæc media, medijs sortiuntur vires. Omnia tamē adstringunt, & pulsus reuocant: faciunt aduersus venena, quæ exulcerando necant, ex oleo pota. & vomitionibus reddita: contra cicutas, meconiū, pharicō, toxica & concretis in grumos lac: item contra renū, ac vesicæ pruritibus, rosiones, exulcerationesq;. Inflant tamen, & stomacho aduersantur. Priuatim, prodest melampsythium, si venter reumatismum sentiat. Album, magis ceteris emollit aluum. Gypso conditum nervis officit, caput aggrauat, & incendit, ac vesicæ aduersatur: contra venena ceteris aptius. Picata, aut resinata, excalfaciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus inimica. Quæ verò aparachyta vocant, vt quæ admistam supam recipiunt, caput implent: temulentiam gignunt, egrius in halitum expirant, stomachum malè habent Inter Italica vina Falernum principem locum obtinet, quod inueteratum perquā facile coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstringit, stomacho vtile: sed vesicæ nocet, atque ijs: qui visus



isus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros  
minimè idoneum. Albana crassioribus constant  
partibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem  
emolliunt (sed concoctionem nõ equè adiuuant,) &  
& nervosa minus infestant: vetustate, eadem  
austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum  
sit dulce, est & Albano crassius: corpus & co-  
lorem alit: agrè tamen coquitur. Surrentinum,  
valde austerum est: quare intestinorum & sto-  
machi fluxiones colibet, & cum tenue sit, ca-  
put minus tentat, inueteratũ suavius redditur,  
& stomacho vtile. Adrianum & Mamertinũ  
in Sicilia equè crassis partibus gignuntur: mo-  
dicè adstringunt, & ocysimè inueterantur, mi-  
nusque, ob suam tenuitatem, nervos tentant. Pa-  
retypianũ, quod ex Adriatico sinu defertur, odo-  
ratum ac tenuius est: quare liberaliter epotum  
fallit. diu seruat ebrietateem, & soporẽ adfert.  
Istricum, Paretypiano simile est sed urinam ve-  
hementius pellit. Chium tamen antedictis mol-  
lius, & aptum potui est: bene alit, & minus ine-  
briat. fluxiones colibet, oculorum medicamentis  
vtile. Lesbium facilè membra subit, Chio leuius,  
& alio idoneum. Ephesium eandem vim habet,  
quod Phygelites nominatur: verũ Asianum è  
Imolo monte. Mesogites appellatum, capitis do-  
lores ciet, & nervos ledit. Coum verò & Cla-  
zomenium, quoniam multam sibi maris aquam  
vendicant, facilè corrumpuntur: flatibus movent,  
aliũ



aluum turbant, neruis officiunt. Vinum omne (vt  
reliqua in commune dicantur) merum ac synce-  
rum, & sua natura austerū, excalfacit, facile in  
membra distribuitur, stomachum adiuuat, appe-  
tentiam ciborum inuitat, vires alit, ac robur au-  
get: somnum conciliat, & commendat colorē. Po-  
tum liberalius auxilio est contra assumptam ci-  
cutam, coriandrum, pharicum, ixiā, meconiū,  
argenti spumam, taxū, aconita, fungos ve: cōtra  
serpentium morsus, & omnium ielus, quæ refri-  
gerendo necant, aut stomachū in vomitiones ef-  
fundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesque  
præcordiorum, ac distetiones, stomachi resolutio-  
nem, & si venter aut interanea rheumatismum  
sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus cor-  
pus immodico sudore digeritur, maximè alba, ve-  
tera, & odorata. Quæ tamē vetustate dulcescūt,  
renibus ac vesicæ accommodatiora redduntur:  
vulneribus, inflammationibusque in succida lana  
imponuntur: tetra vlcera, & phagedenica, &  
fluxionibus obnoxia, cōmodè persfunduntur. Quæ  
marinam non receperunt, austera & alba, ad sa-  
norum victus vsurpantur. In his præstāt Itali-  
ca, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signi-  
num, & permulta Campania, & Paratypia-  
num ab Adriatico sinu, & Siculum, quod, Ma-  
mertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Les-  
bium, & Phygelites ex Epheso. Crassa verò &  
nigra, stomacho negotium exhibent, inflationem  
par



uariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouet, nervosq; largius pota tentat. In media etate, ut à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini definiatur. Non sitire, & modicè cibos proluere, optimum est preceptum. Nocet ebrietas omnis, & maximè assidua: siquidem obsessos nervos quotidie remittit: largiorque potus, acutorum morborum adfert initia. Mediocris tamè vinolentia, aliquot diebus, maximè post aquæ potus, utilis: namque modo quodam ex alto euocat, sensibilisq; expurgat excretus, & per ceca corporis ducit spiracula. Sed aqua post vinolentiam libere oportet: si quidem valetudinis alicuius gratia factæ temulentia remedium adfert frigida. Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acrivua, paulò ante maturitatè decerpta, triduo aut quatrinduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; vinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet: prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malaciæ, & crudis: in pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos hibi possunt. Lora, quam deuteriam, alij potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ, in vinacea, quibus triginta vini metr



metretæ extractæ fuerint calcatis vinaceis, expressioq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios modicius, qui remansit, binis salis sextarijs, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum vtendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit agris, quibus timemus noxam vini, coacti sape desulterijs eorum obtemperare: item à longa valetudine se recolligentibus. Fit & vinum, quod adynamon vocant, loræ vires habens hoc modo: Pares aquæ, & musti mensuræ coquuntur molli igne, donec absumatæ aqua: quod ubi refrixerit, elutriatum: picato vase reconditur. Alij marinæ, & cœlestis aquæ, mellis & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insciant: quo ad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syluestri ruæ nigrum adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus, & cæteris, quibus cōstrictione, & contractione opus est.

Vinum melitites. CAP. VI.

**M**elitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt: namq; alui leuiter emollit, urinam eiet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs: odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso, quod fit è vino vetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quò  
magis



magis ad efferuescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cūque efferuere desierit, in alia vasa transfunditur.

Mulsum.

CAP. VII.

**M**ulsum è vetere vino austeroque, & bono melle factū, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in vsum venit. Vetus corpus alit: media ætate, aluo prodest, vrinam pellit: à summo cibo sumptum nocet: & inter initia potum, implet: deī appetendi aviditatem reuocat. Fit mulsum duabus vini metretis, admista vna mellis. Aliqui, quò celerius præberi possit, mel cum vino coquunt, & ita transfundunt. Alij vtilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, vnum mellis adiiciunt: & vbi ferbuerit, vase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsa.

CAP. VIII.

**A**qua mulsa easdem quas mulsum vires possidet. Cruda vtimur, cū moliri deiectionē, aut vomitionem incitare volumus: vt ijs, qui venena hauserūt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescētis pulsus, quos ibi dixere microsplyctos, tussietibus, peripneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Itā paratum conditiuumque, quod aliqui hydromeli propriè vocant, media ætate adynamo vino, aut lora in recreandis viribus, respondet, & similem vim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lora prodest. Inueterati tamē  
vsum



usus damnatur, inflammatis, aut constrictis: sed laboranti stomacho, aut cibū fastidienti sudatoribusve conuenit. Fit, duabus pluuiæ aquæ veteris ad vnā mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanā aquā adijciunt, & ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt, qui hydromeli appellant, quod à melle elutis aqua fauis confici ac seruari soleat: sed meratius confieri conuenit: aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

Aqua.

CAP. IX.

**D**E aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cælum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in precordijs commoratur, ad hæc, quæ & facili via fertur, & citra molestiā, nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris: stomacho aduersatur (aluum enim conturbat) pituitam expellit. Si verò calida ad fœtus adhibeatur, elicit & discutit: neruorum vitijs, & pernionibus, ante vlcera prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouēdas deiectiones tepescit infunditur, & ad tormina: calida, psoras, pruritus, impetigines, lentes, & mammæ rigen-

tes



tes, foveri vtile est: liuores fotu discutit: ad venenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maximè scorpionum, phalangiorum, aspidumq; etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur. Et malo habitu confectis iam diu corporibus, nervisq; balnea ex ea vtilis: hydropicos, capitis dolores, aurium gravitates, feruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis aque mixtione reposita, virus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino, aut melle: verum post deiectionem, dant gallinæ aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

## Thalassomeli.

## CAP. X.

**Q**uod thalassomeli vocatur, vehementer purgare constat. Temperatur autem equis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defecatis, & picato vase per Canis æstus insolatis. Alij ad binas marine coctæ singulas mellis adiungunt, & vase condunt: huiusmodi moderatius est aqua marina & mitius.

## Acetum.

## CAP. XI.

**A**cetum refrigerat, & adstringit: stomacho vtile, & appetentiâ excitat: erumpentē undecumq; sanguinē, potu in se sive sistit: prodest alui fluxionibus coctū cum citis: cruentis vulneribus inditur & inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum reprimat

D



procidencia sedis, vuluæq; itē abscedentes gingi-  
uas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignē  
sacrum, vlcera quæ serpunt, lepras, imperigines,  
pterygia, cum aliquo cōuenienti efficax est. pha-  
gedenas vlcerum, nomasque fotu continuo cohi-  
bet: podagricis calido fotu, cū sulphure auxilia-  
tur. sugillationes rapit, cū melle illitū. Contra ca-  
pitis ardores cum rosaceo in succidis velleribus,  
aut spongia imponitur. Ad aquā inter cutē, gra-  
uitatem aurū, & sonitus, sibilosq; feruentis va-  
por proficit: instillatum queq; aurium vermes  
necat. Panos cū ercet tepidi fotus, aut si imbuta  
aceto spongia admoueat, & pruritus permul-  
cet. Contra venenatos serpentū ictus, qui refri-  
gerando nocent, calidū cōmodē fouetur: & frigi-  
dum, vīs, quæ exurens virus ei aculitur. Cali-  
dum potum, atq; vomitionibus redditū, aduersus  
omnia venena efficax est, presertim contra me-  
conium, & haustam cicutam, congelatum in  
ventre sanguinē, lac coagulātū, fungos, ixiam,  
taxūmq; cum sale. Hautu voratas hirudines, si  
sorbeatur, eūcit: tussim veterem mitigat, & re-  
centem lacefit. In orthopnœa calidum commodē  
sorbetur, gutturis fluxiones gargarizatum inhi-  
bet, anginis & vna procidenti conuenit: contra  
dentium dolorem, calidum colluitur.

Acetum mulsum. C A P. XII.

**A** cetum mulsum, quod oxymel vocant,  
hoc modo temperatur: Aceti heminas  
quinque,



quinque salis marini pondo, mellis minas decem, aqua sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescete cortina: atq; ubi refrixerit, diffundito. Sumptū crassos humores extrahere, & ischia-  
dicis, comitialibus, & articulorū morbo cōflicta-  
tis prodesse creditur. Cōtra morsum eius viperae,  
quam sepa vocant, haustum meconii, ixiām ve,  
auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Acida muria. CAP. XIII.

**A**cida muria, quam Graeci oxalmen vo-  
cant, cōtra nomas fetu, putrida vlcera,  
canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur.  
Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si  
statim calida in vulnus iniiciatur, & prociua  
sedem reprimat: dysentericis, si nomas sentiāt, in-  
funditur: oportet autem ex lacte instillare. Hi-  
rudines sorbitione aut gargarizatu necat: fur-  
fures & manantia capitis vlcera exterget.

Thymoxalme. CAP. XIII.

**T**hymoxalme veteres vtelantur, dabantq;  
laborantibus imbecillitate stomachi, ternos  
quaternosve cyathos, aqua calida dilutos in ar-  
ticularibus morbis, & inflationibus. Crassos hu-  
mores, atrosq; trahit. Hoc modo facitatur: Thy-  
mi triti acetabulum salis idem modus, ruta, pu-  
legij, polentae, singulorum exiguae portiones in  
vas coniiciuntur, aqua terni sextarij, & aceti  
terni cyathi infunduntur, & circumposito lin-  
teo sub dio madescunt.



Scillinum acetum. CAP. XV.

**S** Scillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quae candida fuerit, expurgata cōciditur, traiecitq; lino segmenta modicis intervallis, ne se contingant, siccātur in umbra quadraginta diebus: mina eorū in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & vase diligenter operto septenis diebus in sole madescit: post eum numerū dierū scilla eximitur, & expressa abijcitur: defecatum acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui scillae minam, quinque aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationē repurgantes, parem mensuram adiiciūt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multo magis humorum lentitias digerit: gingivas humore praegnantibus collutione stringit firmatq;, & motos dentes stabilit: putredines oris, & graves halitus tollit: durat fauces sorbitione, & callosas facit: vocem expedit, & limpidam canorāque reddit. Datur stomachicis, aegrē cibum cōcoquentibus, melancholicis, comitialibus, vertiginosis, mente captis: item vulvarū strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischia dicisq;. Imbecillos admodum recreat: corpus sanum reddit, & bonum colorem praestat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque aurium infusione purgat. In summa, ad omnia efficax. Cavendum tamē intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut nervorū vitijs. Datur quotidie ieiunansorbandum, inter initia exiguum, paulatim



latim adaugendo, ad cyathum vsque. Nonnulli  
binos dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. CAP. XVI.

**S**cillinum vinū fit hoc modo: Dissectam, vti  
dictum est, scillam, & sole siccata cotundi-  
to, minam eius tenui cribro incernito, & linteo  
raro illigatam, in videnos sextarios musti recen-  
tis ac boni demergito: vbi trimestri spatio madue-  
rit, elutriatum vinum, obstructo diligenter va-  
se, recondito. Licet quoque sic humida scilla vti:  
In orbiculos, rapi modo, dissectā duplicato pon-  
dere, quadraginta diebus insolari oportet, &  
valde inueterascere. Aliā parandi ratio: Scille  
dissecte & repurgate tres minas, in Italicā me-  
tretam musti demittito, & senos menses in vase  
obstructo macerari finito: post id tempus defeca-  
tum & excolatū vinum recondito. Vtile est con-  
tra cruditates, & ciborū corruptiones: item ijs,  
qui reuomunt cibum, & si pituita in ventre, aut  
stomacho coierit. Prodest lienosis, malè habitis  
corporibus, aquæ inter cutem, regio morbo, diffi-  
cili vrina, torminosis, inflationibus, resolutioni  
neruorum, horroribus longis, vertiginosis, &  
vulsis. Menses pellit, minimèq; nervos infestat.  
Hoc vinum vetustate fit melius. Cauendus in  
febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

Marina vina. CAP. XVII.

**M**arina variè factitantur: Aliqui enim  
statim quum decerptæ sunt vne, aquam



maris admiscant. Alij in area vva. sole siccant: quibus calcatis, marinam adiungunt. Alij passus prius vvas in delijs marina aqua macerāt, mox calcatis exprimunt: id magis passi generibus adscribitur. Quae tamen austeriore gusta temperantur, contra febrium aduentatium indicia valent, si modo meliora non adsint: aluum subducunt: prosunt purulenta extusis et tibus, aut si diura aluus exerceat. Quae ex Aminaeis vuis fiunt, caput tetat, stomacho aduersantur, flatu creat. Verum quod plenior habeatur historia, ijs, qui huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse videamur, quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quaedam ex ijs factitia, minoris cure ac impendij, quae cadunt in usus: ut quae ex cotoneis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

Cydonites.

C A P. XV III.

Cydonites nomine alio melites appellatur, & ita fieri conuenit: Mala cotonea exemptis feminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pondo, in musti metretā, triginta diebus macerantur, postea defecatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum pressorumq; adycere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenteriae,



rie, hepaticis, renum vitis, & vrine difficultati. Melomeli. quod & cydonomeli nominat, sic fit: Cotonea mala seminibus suis castrata, in qua plurimum mellis, quo penitus demersa cõtegatur, conijciuntur: id post annum mitescit, mulso non dissimile. Prestat eadem, quæ superior cõpositio.

## Hydromelum. CAP. XIX.

**F**It hydromelon duabus mensuris aquæ cõtecte, & sub Caniculæ sydus insolatæ, additis ad vnâ melomelitis facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

## Omphacomelites. CAP. XX.

**O**mphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acer bẽ vræ adhuc immature, & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes mellis optimi despumati singule partes adijciuntur, & insolatur in vasa transfusum. Vim reprimendi ac refrigerandi habet: stomachicis celiacisq; conuenit. vsus post annum est.

## Apijtes. CAP. XXI.

**F**It & è pyris, pẽrinde atq; cotoneis, vinum, Apijtes nomine sed ita vt pyra nõ magnopere maturescant. Ex filiquis etiam, mespilis, sorbis, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerba sunt, & adstringunt: stomacho vtilia sunt, atq; intestinas fluxiones cohibent.

## Oenanthinum. CAP. XXII.

**F**It è feraci vite syluestri, quod vocatur cẽnãthinum: Sicci flores minis duabus musti ca-



do macerati: post triginta dies mutantur, mox colatum vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, caliacos, & dysentericos.

Rhoetes.

CAP. XXIII.

**F**It è punicis malis maturis quod rhoeten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluvio exortam: stomacho vtile: adstringit aluum, & vrinam mouet.

Rhodites.

CAP. XXIIII.

**R**hodites sic fit: Rosarum siccarum tufarumque minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defecatum vinum transfundens, recondito. Vtile ijs, qui febre carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidum aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli vocant, quod arterie scabritijs conuenit.

Myrtites.

CAP. XXV.

**M**Yrtites sit, baccis nigris, quæ maturitate excefferint, tuis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torret, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aque heminas adiiciunt, & vini veteris parem modum postea exprimunt, & seruāt. Magnopere adstringit



adstringit stomacho vtile, fluxionibus ventris ac stomachi prodest: & contra intestinas vlcerationes, & profluvia: denigrat capillos.

Myrsinites.

CAP. XXVI.

**M**Yrsinites sic temperatur: Rami nigre myrti cum suis baccis & folijs tusi, decem minarū pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certè dimidiū: id vinum colatū ad vsus reconditur. Contra fures, vlcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est: sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

CAP. XXVII.

**L**Entiscinum similiter vt myrsinites temperatur: nec secus terebinthinum. Nanq; baciferi eorum rami sumi debent. Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicæ, & stomachi, et sanguinis profluvio: vlcera omnia fluxionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt: fluxiones vuluæ ac sedis in se sione cohibent.

Palmeum vinum. CAP. XXVIII.

**P**Almulas maturas, quas vocant chydeas, in vrceolum imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittito: lino foramē sit obturatū, et quadragenis sextarijs ternos aque congijs infundito: quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congijs infudisse satis est: post de-

D 5



cem dies detracto ab arundine linteo assumito  
vinū crassum & dulce, & reponito. Suave illud  
quidē, sed capiti noxiū: cōtra fluxiones, propter  
adstrictoriā vim, efficax: stomachicis, celiacis,  
sanguinē expuentibus cōuenit. Aliqui idem ad-  
dita aqua iterū capiūt, & tertio, quarto, quinto,  
sexto ve faciunt: quod tandem acore vitatur.

Catorchites.

CAP. XXIX.

**C**Atorchites, aliquibus sycites vocatur, in  
Cypro fit, ita ut palmeum: sed hoc interest,  
quoniā pro aqua tantūdem humoris adiūciūt, in  
quo recenter pressa vinacea maduerint. Carice,  
quæ chelidoneæ aut phœniceæ appellantur, præser-  
tim nigre, macerātur, uti diximus, et post decem  
dies humor excipitur, atq; iterū aut tertio, idem  
modus aque, in qua vinacea maduerint, infun-  
ditur: simili modo intercedēte spatio, quarto aut  
quinto assumitur. De maceratarū liquor non se-  
cus acore cōtrahit, & aceti vsum præbet. Id te-  
nue est: flatu gignit, stomacho aduersatur, fa-  
stidiū parit: aluo tamē prodest, urinā ciet, menses  
trahit, lactis vbertatē facit, vitiosum sanguinē  
creat, et elephātiāsin adfert, ut potio, quā xzythō  
appellamus. Aliqui sex amphoris, decē salis sex-  
tarios adiūciūt. Alij murie amphorā: quod non  
facile vitatur, & aluo idoneū fore censent. Alij  
thymū et fœniculū imo subiūciūt, & caricas su-  
perponūt: et ita vicissim, donec vas expleuerint.  
Fit & è jycomorīs eodem modo vinū, sed in ace-

lum



tum acre degenerat: quoniā non ita praeualet vis eorū, vt fluētis liquoris dulcedinē retinere possit.

## Resinatum vinum. CAP. XXX.

**R**esinatum vinum populatim faētitari solet: copiosum in Galatia: quoniā vinū illic coacescat, vna non maturescente, ob calī algore, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tunditur, et amphorae dimidiata hemina permiscetur. Aliqui, vbi efferbuit, excolant, separātes resinam: alij relinquūt. Hae vina vetustate dulcescūt. Omnia capitis dolorem, & vertigines faciūt: concoctionem tamen adiuvant, & urinā cient: tussietibus, ac destillatione vexatis cōueniunt: item celiacis, dysentericis, & hydropticis, et foeminis fluxione vuluae laborātibz: altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

## Strobilites. CAP. XXXI.

**S**trobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisq; praebetq; resinati effectus. Si quis madefactas nuces pini musto decoquat: potum affatim conuenit ijs, qui tabitudine conficiuntur.

## Cedrinum vinum. CAP. XXXII.

**C**edrinum, iuniperinum, cupresinum, laurinum, pineum, aut aliegnum, simili ratione sunt. Dinisos recenter ramos, cum fructū edūt, aut soli, aut balneo, aut igni, admonere oportet, vti consudent, congiōq; vini minam vnā permiscere



scere, & post duos menses transfundere, & antequam recondantur, in solare. Factitiorum vinorum vasa impleri debent: nanque non plenis vasis, vina in acore corrumpuntur. Medicata autem vina, rectè valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt, urinā cient, & substringunt. Laurinum tamen vehementius excalfacit. Fit quoque è fructu cedri maioris vinū, congio musti, adiecta tusarum baccarū selibra: diebus quadraginta in solari debet, & defecatum in vasa transferri.

Fit etiam vinum è baccis iuniperi, non aliter quàm cedrites, & ad eadem valens. Cedrites hoc modo fit: Cedriam dulci aqua lavant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus vini excalfacit, extenuat: tussi antiquæ utile sine febre, pectoris laterumque doloribus, torminibus ventris, & interaneorū vlceribus, purulentis excreationibus, mulieribus vulvæ causarijs, hydropicis que: facit aduersus ventris tineas & horrores: contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum vinum. CAP. XXXIII.

**P**icatum ex liquida pice & musto temperatur. Picem autē primū marina aut muria tantisper eluere oportet, dum in albuerit, & syncera maris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda: cōgijs octo musti, vncia picis vna aut altera adijcitur: ubi efferbuerit, et cōstiterit, in vasa diffunditur.



ditur. Hoc genus vini ex calfacit, concoquit, purgat, abstergit: vtile doloribus pectoris, alui, iocineris, lienis & vuluæ, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in altū recedentibus, tussi, suspirijs, cōcoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositū.

Absynthites. CAP. XXXIIII.

**A**bsynthite faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs. Italicarū amphorarū, admistam absynthij Pontici librā decoquūt ad tertias: & vbi infunderint sex aceti sextarios, & absynthij selibrā, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in vas: dūmq; cōquieuerit, defecāt. Alij absynthij minā in amphoram demittunt, tufāmq; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant, binis mensibus. Alij absynthij quadrantē, alij trientē, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cassiæ, floris iunci odorati, calami, clatæ, palmarū singulos sextantes inijciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis, ternisve mensibus dimittunt: postea defecatū vinū transfundunt ad vsus. Alij addunt in musticadum, celticæ nardi drachmas quatuordecim, & absynthij drachmas quadraginta, linteo innolutis: & post quadragesimum diem elutriāt. Alij in senos sextarios musti, absynthij librā, & sicce pini resine sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stoma-

cho:



cho: vrinam cit: tardam concoctionē a. celerat:  
 hepaticis, regio morbo, et renū vitis auxiliatur:  
 fastidia discutit: vis prodest, quibus stomachus  
 negotium exhibet: valet contra longam precor-  
 diorum distentionem, & inflationes, teretesque  
 ventris tinea, & remoratos menses: contra hau-  
 sta iuxta venena quā plurimum potum, & vo-  
 mitionibus redditum, auxiliatur.

Hyssopites.

CAP. XXXV.

**H**ysopites ē Cilicio hyssopo maximē lauda-  
 tur, sitq; similiter, foliorum hyssopi tusorū  
 libra in amphoram musti coniecta, lintculo raro  
 cum quibusdam lapillis, folia inuoluuntur, vt  
 degravatus pondusculo fasciculus sidat: vinum  
 post quadraginta dies defecatum elutriatur.  
 Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, ve-  
 terem tussim, & suspiria prodest. vrinam cit, tor-  
 minibus, & horroribus februm circuitu repetē-  
 tibus auxiliatur: menses mouet.

Ex diuersis plantis facta.

CAP.

XXXVI.

**S**imili modo chamedrytes fieri solet. Excal-  
 facit, discutit: conuulsis, regio morbo, vulua  
 inflationibus, tarda concoctioni, incipienti aquae  
 inter cutem, subuenit. Inueterascēs melius red-  
 ditur. Stæchadites non secus temperatur. Con-  
 gus sex, stæchadi minam addere oportet. Cras-  
 sitiem, inflationes laterū, nervorūq; cruciatus,  
 & perfictiones discutit: comitialibus commodē  
 dat



datur, cum pyrethro & sagapeno. Fit ad eadem acetū ē stachade herba, vt paulo antē diximus, aceto macerata, quod eosdem implet effectus. Fit vinum ē betonica, quam cestron psychotrophon appellant. Herbā semine maturo pręgnātem, cū suis ramulis minę pondo, congijs duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum vitia, vt frutex ipse, pollet. Et vt in vniuersum dicatur, facilitia vina, sibi mēturarum vires adsciscunt: quare non difficile fuerit ijs, qui illarū naturas norint, vinorū vires coniectura quadam cōsequi: verū tamen vinorum vsus febricitantibus abdicādius. Fit etiamnum ē betonica acetum, ad eadem vitia vtile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem trāsfusis. Prodest torminibus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, spiritū discursationi, aegris concoctionibus. E' nāpis fit vinum, nomine bunites, drachmis duabus tusi nāpi in sextarios duos musti additis, et ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hęc vinum



vinum pectoris vitij, & omnibus, quibus mar-  
rubium. Thymitusi & cribrati vncias centum  
linteo colligatas, in amphoram musti adijcito.  
Valet contra aegras coctiones, fastidia, dysente-  
riam, neruorum & precordiorum dolores, hyber-  
nos algores, & venenata animalia, quorum mor-  
sum frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili  
modo estatureia vinum sit, quod eadem quae thy-  
mites praestat. Sic quoque origanites ex heracleo-  
tico origano conficitur cum supradicto. Facit ea-  
dem quae thymites. E calamintha, pulegio, &  
abrotono vina fiunt eodem quo thymites modo.  
profunt stomachicis, cibum fastidientibus, & re-  
gio morbo: quod urinam moueant. Fit item conyza  
vinum, contra venenata ante alia efficax.

Aromatites. CAP. XXXVII.

**A**romatites ita fit: Palme, aspalathi, ca-  
lami, nardi gallici, singulorum quatuor  
sextarios sumito: postquam contrinueris, passosubigi-  
to, coactis ingentibus ossis, & in sextarios duode-  
cim austeri musti deiectis, operculato vase, qua-  
draginta diebus quiescere finito: deinde ubi fece  
expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Ca-  
lami vncia, plus drachme septem, costi drachme  
duae, nardi Syriacae drachme sex, casiae vncia,  
croci drachme quatuor, amomi drachme quin-  
que, asari drachme quatuor: omnia simul trita  
& linteo colligata in cadum musti demerguntur,  
& postquam vinum deforbuerit, transfunditur:  
Facit



Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores: difficili vrina, horroribus, retardatis mensibus, atq; ijs, qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituita crassitiem extenuat: colorem alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum & vesicae vitij auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta.

## CAP. XXXVIII.

**F**It & vinū ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coit: myrrhae duae drachmae, piperis candidi drachma vna, iridis drachma sex, anisi drachmae tres: omnia plenius tusa: & linteclo inuoluta in sex vini sextarios coniunguntur: vinū post triduum colatur, & in lagenam reconditur. Datur post deambulationē, meraculū, cyathi vnus mensura. Fit quoque nectarites ex helenio herba: Radice sicca podo quinq; drachmarum linteclo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitia: vrina pellit. E syriaca nardo, et Celtica, malabathroq; vinū factitatur, hac ratione: Singulorum selibra in binos musti congios mittito, post menses duos colato. Datur cyathus vnus cū tribus aquae. Hoc vinum efficax est cōtra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinae difficultatem: prodest stomachicis, atq; ijs quos pallore colorat. Alij vnciam, aut sextantē acori, & celticae nardi quadrantem, in musti ampho-

E



ram adiūciunt. Asari quadrantē in fencs musti sextarios itidem demittito. Id vini genus vrinā ciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus hepaticis, ischiadicisq; conuenit. Radicis syluestris nardi recentis & trita cribrateq; bessem, in congiūm musti coniūcito, duos menses quiescere sinito. Vtile est hepaticis, difficili vrine, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis facta.

CAP. XXXIX

**R**adicis dauci centusæ drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vulue menses pellit. ructus ciet, & vrinam: prodest tussi, ruptis, vulsisq;. Saluie vnciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa, & suppressos menses. Panacis vnciam in musti congiūm mitto, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, contusis, orthopnœa: lienis crassitiem extenuat. contra tormina, coxendicum dolores, efficax est: tardas conceptiones accelerat: menses & partus extrahit: aquæ inter cutem, & serpentium iclibus auxiliatur. Vrina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorū vnciis octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, &

777



vrinam mouent. Semini apij recētis, maturi & cribrati vncie nouem in linteocolligata in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat: stoma. hieis, & difficili vrinae auxiliatur: faciles spiritus facit. Ex feniculo, anetho, & petroselino, vna eodem modo sunt, & ad eadem efficacia. Fit & è flore salis vinum, muliò ad purgandum efficacius, quàm vinum aqua marina temperatum. Fauces, vesicam, renes, & stomachum infestat: quare neque in secunda, neque aduersa valetudine predest. Fit etiam vinum quod phthorion vocant, quoniam partus necat, & abortus facit: veratro, aut scammonia, aut syluestri cucumere iuxta radices vitium sate. si quidem vites sibi illorum vires adsciscunt. Id vinum partus enecat. datur ieiunis mulieribus, quae antè vomuerunt, cyathorum octo mensura, dilutum. Ramorū thymelae cum suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec congiū duo supersint, defecatumque recondito. Aqua pura excrementa, & lienem alsumit. Chamalea dum floret, cum folijs tusa & cribrata decē drachmarū pondere, in musti congiū additur. Post duos menses vinum in vsum transfertur. Aqua intercutē, hepaticis, & lasi tudine confractis, efficax est: item mulieribus, quae à partu egrè purgantur.

Chamaepityinum simili modo fit, ad eadem conueniens: vrinam quoque ciet. Librum radiceis



mandragoræ concidito, segmenta lino trañcito, quod selibram aequat in musti cadum demittito, ibiq; esse finito admēses treis, deinde trāsfundito. Media potio, hemina dimidiū: bibitur, passo in duplum addito. Aiunt heminam vini congio mīstam, potu soporem adferre: cyathus vnus cū sextario vini potus, enecat: mediccris vsus eius, doloris sensum aufert: fluxiones incrassat: olfactu potūque, & cum inditur, idem pręstat. In congiū musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri veratri triti in linteo mundo, mittito: dūmq; efferbuerit, in marine aque congios quatuordecim aut quindecim, vbi pleniusculē fregeris, inñcito: post aliquot dies colato, & vtilior. Dato ciathū vnū ex aqua balnei in potu, ad aluum soluendā, iis qui euomuerunt à cœna. Alia ratio: Veratri drachmas viginti, iunci odorati vncias duodecim, spicę Syriacę vncias tredecim, cribratas, & linteo colligatas in septem vini. Coi sextarios diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato: dabis in potu sesquiheminam. Aliter: Decoctę marine aque ex alto petite sextarios duodecim, veratri candidi libras sex, in musti amphora quadragesimo die, quāmadefeceris, collato, & vtilior. Alia ratio: Veratri drachmas duodecim, et aphronitri quaternas, in senis musti sextarijs diebus quiniſdenis macerato, mox colato: & semestri exacto, vtilior. Id vini genus abortus facit, & partus necat. Aut

vna



*ruus* in sole siccatus imposito in musti metretam  
(implet autē metreta congios duodecim) & gyp-  
sum in vinū mittito pōdo drachmarū viginti, &  
biduo residere finito, conijcito veratri nigri dra-  
chmas triginta, iunci odorati, calami, singulorū  
drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios  
duos & trientem, myrrhæ & croci singulorū dra-  
chmā, inuoluens linteolo diebus quadraginta ap-  
pendito, postea colato. Dabis heminas treis, aut  
duas dilutas. Purgat à partu, & abortu fæmi-  
nas: fœtus extrahit, cōtra strāgutatus vuluæ effi-  
cax. Scāmonites sic fit: Radicis scāmonie per mes-  
ses effossæ, tritæ, & linteo colligatæ drachmas  
quinq; in musti congiū mittito, ad dies trigin-  
ta. Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

Metallica omnia, & primū Cadmia.

## CAP. XL.

**E**X cadmie generibus optima est Cypria, bo-  
tryitis nomine, densa, modicè grauis, & in-  
leuitatem magis declinans, racemosa facie, colore  
spodij, quæ fracta cinerulenta est, & æruginosa.  
Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior,  
internatis venarum discursibus, onychitæ lapidi  
similis, cuiusmodi sunt, quæ è veteribus metallis  
effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est, cru-  
stosa dicitur segmentis quibusdam périnde quasi  
Zonis cincta, ob quod eam Zonitin appellauere.  
Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna  
ex parte nigra. Sed quæ testaceā faciem habet,



terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychitis, vtilis reliqua ad amplastra, & farinas, quae cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia verò, Thracia, & Hispania delate improbantur. Cadmia effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exicare, corporis meatus infarcire, excrescentia in carne coërcere, crustas creare, & vlcera, quae cacoëthe vocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex are in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus camerisque fornacum inherente. Praegrandes autem ac ferreae sunt rudes, ab officinis appellatae acestides, per summa fastigia cōuexae & cōcameratae, ut quae ab are iectantur sursum corpuscula cohereant, & inibi detineantur: quae cum spissius insident, in corpus concrescunt, & modo genus vñ eius, modo duo, modo omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte, qui Solis incumbit, cremato lapide, cui pyrite cognomen est: in quo etiam monte quedam quasi venae chalcitis, misyos, foreos, melanteriae, caerulei, chrysocelle, atramenti sutorij, diphrygisque inueniuntur. Nec desunt, qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falsi quidam lapidum cognatione: qualis inuenitur & apud Cumas lapis, nullam suam vim ostendens. Ideo deprehenduntur, quod sunt cadmia leuiore, nullumque alicuius mandentibus sapo



saporem exhibent: commanducatus item lapis, dentes offendit cadmia, vi pote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinā detrita, & acclosulacta, atque in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Ite tritus & igni arpositus lapis profilit, & fumū igni similem ei aculat: cadmia verò quiescens manet, fuliginēq; luteo colore aut aereo splendens expuit, vario Zonarū disursu. Insuper lapis ignem expertus, atq; refrigeratus, colorem mutabit, ac leuier multo fiet: sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa sed viribus nequaquam comparanda erariæ. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoreis modo bullet: mox extinguitur vino Amineo, quæ ad emplastra preparatur: sed quæ ad psoriarum medicamenta preparatur, aceto. Alii hoc modo exustā conterunt in vino, rursūq; sicili crudō torrent, donec pumicea videatur: iterūq; tritam ex vino, tertio vrun, donec prorsus in cinerem redigatur, nil ille scabritie retinens: hac spodiū vice vtuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa, inde aqua, dum sordidum nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx. CAP. XLI.

**P**ompholyx speciesola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodios nigricat, & ple-



rumque ponderosior est, palearum pilorumque plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab arariarum officinarum pavimentis & fornacibus eueritur: pompholyx verò pinguis est, & candida, usque adeò levis, ut in auraseuolare possit. Cuius duo fluxerunt genera: vnum ad aeris colorem vergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamque leuitatem natum. Candida sit pompholyx, quoties in perficiendo aere, fabri praestantiores facere volentes, detritam cadmiā cumulatius insperserint. Namque tenuissima fauilla, quae effertur, in pompholygen coit. Ceterum pompholyx non ex aeris modo materia, & fabril industria factitatur, sed ex cadmia quoque, ad giugnendam ipsam, eximie follibus proflata. Cuius faciunda ratio haec est: In domo gemina contignatione operta, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatū à supernis partibus pateat: domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam follis narem: ostiū mediocre habeat, pro exitu ingressūque artificis fabricatum: domuncula altera huic cōiuncta sit: in qua & folles, & flator suo munere fungantur: deinde carbonibus in camino succensis, assidēs artifex cadmiā particulatim fractā inspargit, à locis supra infurnibulū extructis: idem negotiū obit infernè artificis minister, simulque carbones adūcit, usque dum indita cadmix copia prorsus absumatur. Itaque egesta  
suffitu



suffitu tenuis pars, & levis materie in summam domū euolat, & parietibus, tectis, fornicisq; adherescit: conflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementum capeffens, glomusculis vellerum simile redditur. Penderosius autē in ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento cobaret. Quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multū terre collegerit, & spurcitia in aceruatiōe referciat. Sunt qui hoc modo tantū fieri spondiū arbitrantur, de qua antē dictū est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum aeris præstat, colore aliquantū piceo, sapore cœni horrido: & si fraudem non experta, flagranti carbone inferuescit, aëreum colorem contrahit. Antedictis autem notis diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crimatis grossis, & quibusdam cōsimilibus. quod facile cognitu fuerit, quippe nihil in ijs probādis inuenietur eorum quæ antē dicta sunt. Pompholygem in commune ita lauari oportet: Ligatā linteo mūdo modicēq; raro, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrem contineat, & huc atque illuc fasciculū deferens, immergito: ita enim limosa pars eius ac utilis, effluet, & omne sedimentū in linteolo remanebit. Postea residere sinēs, aquā cum cinere colis incernito, & nouam infundens,

E S



agito, & effundito: mutata tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil sidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur: deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quò facilius trāseat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumofum, quod traiectum est, & supernat in vasi, con hoc excipiunt, & fictili nouo ad vsus recondunt. Quod verò resedit, sensim cribratum, in aliud vas transfundunt, relicto arenoso, quod pessum ierat: rursus lapidosa fidere patiuntur, & in vas aliud excolant: hoc identidem faciunt, donec cinis merus & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauiatos, pessum ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attelli. Caterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, vt cadmiā, eluunt. Quinetiam lauatur vino Clio marina aqua diluto, modis, quos suprā diximus: & ita redditur adstringentior, quā aquis elota. Vis pōphelycis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obducunt. Quod si spondiō torrere libet, diligenter tritam, & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nouo, sub iectis leuibus



bus prunis, orbiculos cōtinuò versabis, dum assic-  
cati fuluescant. Neque ignorandum, ex auro, ar-  
gento, plumboq; fieri spondion: verum post Cypriū  
plumbeum maximè commendatur. Quoniā spo-  
dios sæpenumero desideratur, necesse est ostende-  
re, quæ simili virtute polleant, vt in spodiū locum  
suffici possint, antispodia vocant, quoq; modo su-  
mi debeant. Folia itaque myrti, cum floribus,  
& baccis immaturis, in fictile crudum coniecta,  
indito operculo cōtinua foramina habente, vruntur  
fornacib. donec figlinum percoquatur: ite-  
rum in fictile aliud crudum transferuntur, quod  
ubi perassatum fuerit, exempta lauatur ad vsus.  
Idem quoque fit è termite syluestris oliuæ, si ha-  
beatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut ma-  
lis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gal-  
lis, aut laceratis linteolis: item ex moris immatu-  
ris, id est cādidis, in sole prius arefactis, aut iere-  
bintho, aut lentisco, ænanthe, aut mollibus rubi fo-  
lijs, vel buxi coma, vel pseudocypero cum flore.  
Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodē  
modo parant: alij taurinum glutien: alij succidas  
lanas asperas, pice aut melle irrigatas: quæ o-  
mnia in spodiū vicem vsurpantur.

## AES VSTUM. CAP. XLII.

**A**ES vstum probatur rufū, & quod cō-  
tritu colore cinabarim imitetur: nigrū  
verò plusquam deceat exustum est. Fit autem è  
clauis solutarum navium, fictili crudo cōpositis:  
sub



subperso sulphure cum sale pari, omnibus vicissim insparsis, fictile circumlito figulari creta spirameto, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidem pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies vrunt. Alij sulphure solo vtuntur, fuliginē tamen excutiunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos vrunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locū tenet, in Memphide cōbustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit: vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, excrementa in carne consumit, nomas cohibet, vomitus ciet, cum hydromelite potum, aut cum melle delinctum, illitūmve. Lauatur vt cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercoſve quam scoriam vocant, eodem modo lauatur: & eandem vim, sed imbecillioſiorem, habet.

Flos æris.

CAP. XLIII.

**F**los æris, quem nonnulli clauorum veterum pſegma, quasi reſegmen aut ſegmentum, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu fulueſcens, milię effigie, & numero, breuis, ponderoſus, modicē ſplendens, atque cōstringens, qui delimitam æris ſcobem non recepit, qua ſape adulteratur. Sed id facile deprehenditur, cū denti illiſu di



su dilantantur ramēta. Fit autem, cū es forna  
cibus fusum, in receptacula delabatur, per cola fi-  
stularum ad ea pertinetiū: tum huic negotio ad-  
dicti ministri, sordes expurgantes, aquam claris-  
simam infundunt, refrigerandi proposito: itaque  
repentino concretu, ac addensatione, velut expui-  
tur, & erūpit antedictus flos. Adstringit & ex-  
crescentia coercet: offusam oculis caliginē emen-  
dat, sed magnopere mordet. Quaternū ebolorū  
pondere datus, crassum humorem extrahit: carno  
sanariū & sedis vitia absūmit: eruptiones papu-  
larum cum vino cohibet. Candidus contra diu-  
turnas auriū grauitates tritus, in eas per fistu-  
lam flatu impellitur: vnam, tussillasque repri-  
mit, farina eius cum melle admota.

Squamma æris. CAP. XLIIII.

**S**quamma æris excussa ex Cyprūs officina-  
rum clauis, crassa quidem ipsa præstantior,  
quæ belitis, id est clauaris, nominatur. sed ex vi-  
li promiscuōq; ære, aut candido, vitiosa intelli-  
gitur: quam vtpote tenuem, & inuolidam damna-  
mus, maximè approbantes crassam, rufam, præ-  
sertim si aceti respersu æruginem contrahat. Vim  
habet adstrictoriā, extenuantem, reprimentem,  
& erodentē: nomas coercet, vlcera ad cicatricem  
perducit: pota ex aqua mulsa, aquam trahit.  
Aliqui farina subactā, dant in catapotio. Ad-  
ditur ad oculorū medicamēta, quod genarū sca-  
britiam absūmit, & fluxiones exiccat. Lauatur

hoc



hoc modo: Sicca æris squammæ expurgatæ seli-  
bra, cum nitida aqua in mortario manu diligen-  
ter cōturbatur, quæque pessum ierit: abijcitur  
quod sul sedit, & effusa aqua hemina celestis im-  
bris adijcitur, & distenta manu, squāmā quasi  
destrigenda sit, vehementer cōfricatur: dūmque  
lentorem emittere cōperit, aqua cēsīm ad sex he-  
minas vsq; superinfunditur, terēdo validè: squā-  
mā ad latus mortarij colligitur, ibique appri-  
mitur: quo factō, expressus humor pyxide ex ære  
rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut flos  
squammæ valens viribus, & ad ocularia medica-  
menta cum primis efficax. Inutile imbecillumq;  
quod superest, lauatur donec nullam profus len-  
titiā excernat, & linteo apertum biduo con-  
quiescere sinitur, effusaq; extante aqua, ubi sic-  
catū erit, reconditur pyxidicula. Alij vt cadmiā  
lauant, & reponunt. Squammæ ex acie aut mu-  
cronibus decussa, quam vocant stomoma, eadem  
vis. Lauatur modo simili & reconditur: sed ad  
moliendam alui deiectionem inefficacior est.

## Aerugo rasilis. CAP. XLV.

**A**erugo rasa fit his modis: In cadum, aut  
aliud cōsimile vas acetū quā acerrimū  
infunditur: superponitur inde inuersum æneum  
vas, presertim concameratum: sin minus, pla-  
num: si q; obstructum, nullūmq; habeat spiramē-  
tum: exempto, quo doliolū obturaueris, opercu-  
lo, decimum post diem insidens ærugo deraditur.

Auz



Aut eris lamina in cadis super acetum ita suspēditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula eris, aut lamina vna plurēve, vinaceis nō recētibus, sed iam acescētibus cōduntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex delimitata eris scribe æruginem facere licet, necnō è laminis, quibus bractee auri cōclusæ malleo ducuntur: si quis eas aceto respargat, & ter aut quater verset, donec æruginem centralant. Tradunt æruginem in Cyprūs metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil eris latentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntq; per Canicule ætus è quodam specu manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidē, & boni coloris, sed vitiosam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autē modis adulterāt aliqui pumice admisto, alij marmore, alij atramentofutorio. Sed deprehendemus pumicem aut marmor, dum pollice sinistræ manus madefacto, æruginis partiūculam altero atterimus: siquidē eam diffundi constat: marmoris autē pumicisq; partes cœunt non dissipatæ, demūq; tractatione crebra & humoris cōplexu dealbecunt. Quin & dentium appressu, si quidem syncera cedit lenis, & sine asperitate. Atramentū verò futorium igne coarguitur: namque si fictile, aut lamina, adulterata æruginē illinatur, & feruenti cinere aut carbonibus incalascat alterutrum, mutabitur, rubescētq; id, quod atramentum futorium acceperis



acceperit: quod id vstum suapte natura talem  
 sortitur colorem. Aeruginis, quam vocant scole-  
 ciam, duo sunt genera: quædam fossilis est, altera  
 factitia ad huc modum: In mortario Cyprij aris  
 dimidiam heminam aceti albi acrisq; pistillo cu-  
 preo conterito, donec strigmenti crassitudinem  
 imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam  
 vnam, cum salis fossilij, translucetis, aut marini  
 quam albißimi. solidiq; aut certè cum nitri pari  
 pondere terito in sole, æstuosissimis diebus, sub sy-  
 dus Caniculæ, donec colorem æruginis cõtrahat,  
 & cõcretu strigmẽtosum fiat: vbi autẽ se in ver-  
 miculorum Rhodiæ similium speciem coegerit,  
 recõdito. Efficax & valde boni coloris redditur,  
 si duæ partēs vrine veteris cum vna aceti adie-  
 ceris, et alia, quæ dicta sunt, peregeris. Sunt qui  
 æruginem rasilem, quæ in apparatu non respon-  
 dit, gummi misto digerāt in formas, & ita ven-  
 dant: quod genus, vt vitiosum, improbatur. Fit  
 & quædam ærugo ab aurificibus, mortario &  
 pistillo Cyprij aris, cum vrina pueri impubis,  
 qua aurum ferrumināt. Antedicta æruginũ ge-  
 nera, vsto ari omnino respõdent, sed magis effe-  
 ctu valent. Sciẽdum fossilẽ scoleciã præstan-  
 tissimã esse: derasam sequi: postremo loco facti-  
 tiam. Mordacissima tamen est hæc, & magis  
 adstringens. Aurificum autẽ ærugorase respon-  
 det. Aerugines omnes adstringunt, extenuant,  
 excalfaciunt: oculorum cicatrices emendant, la-  
 crymas



crymas cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur. Vlcera ex cleo cerâque ad cicatricem perducunt: callos & sordida vlcera purgant, cū melle coctæ: callum fistularum erodunt, cū ammoniaco, collyrij modo in eas adaectæ. Ad gingiuarū autē excrementias, & extuberationē vtilis. Magnopere extenuant genarū crassitiē, cum melle illitæ: verū post illitionem sponsia ex aqua calida locus fovendus est. Resina terebinthina exceptæ, cum are & nitro lepras abigunt. Vritur ærugo, quacūq; velis, minutissimè fracta comminutâque, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: versaturque donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam vrant, vt dictum est: sed non prorsus eundem colorem cimenta reddit.

Rubigo ferri. CAP. XLVI.

**R**ubigo ferri restringit: sistit scæminarum profluvia, admota, potūque præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquā vtilis ad scabritias genarū, reduuiis, & pterygia: condylomatis prodest, gingiuas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquæve, in qua cādens ferrum sit restinctum, potu caliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam scoriam vocant, eadē potest quæ rubigo, sed ineffica-

F



cuius. Aconito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

Plumbum elotum. CAP. XLVII.

**L**otura plumbi sic fit: In mortariū plumbeū aqua iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: linteolo deinde colato, aquā superfundens, quò facilius quicquid est resolutū incerni possit. Hoc iterū facito, vsquedum satis tibi habuisse videatur. Vbi cōsederit, priore aqua effusa, nouam adiciens, vt cadmiā lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mūdi plumbi lima quesitam, mortario pastilloq; lapideis terūt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta ficiant, donec nigrescat: mox vbi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. Nam tritum vehementer, cerusse simile redditur. Alij elimate scobi medicam plumbaginē adiciūt, affirmātes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere caua, sistere oculorum fluxiones, & vlcerū excrementia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis vlcera, cōdylomata, & hemorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea, quæ egrè cicatricem ducunt: & in totum spodi effectus prebet, nisi quòd non obducit crustas. Syncerum plumbum affrictu, marini scorpionis draconisque plagis auxiliatur.

**V** Plumbum vstū. CAP. XLVIII.  
Ritur plumbum sic: Super quàm tenuissi-

71.15



mas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur  
inspargito, additisq; alijs rursus laminis, interie-  
cto semper sulphure, vsq; dū vas expleueris, suc-  
cēdito: flagrante autem plumbo, ferrea rude ver-  
sato, donec perfectē redigatur in cinerem, nihilq;  
ē plumbo non vstum hēserit: tum demum, ob-  
structis naribus, eximito: alioquin halitus plum-  
bi noxius sentitur. Aut elimatā plumbi scobem  
in olla sulphure vrito. Alij laminas in fictili cru-  
do, vt dictum est, imponunt fornaci, aut foco, &  
circunlinentes operculum, dato exili spiramento,  
vrunt. Alij pro sulphure cerussam aut hordeum  
inspargunt. Alij integras laminas imponentes,  
acri igne vtūtur, & rudicula ferrea cōtinuē mo-  
uent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis hu-  
iusmodi vstio: & si vehemētius vratur, contra-  
hit spume argenti colorem. Magis tamen nobis  
placet prima vrendi ratio. Plumbum vstum la-  
uatur vt cadmia, & reconditur. Eosdē effectus  
habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores.  
Recrementum plumbi, quod scoriam vocāt, opti-  
mum est, densum, fractu cōtūmax, cerussam pla-  
nē representans, nihil plumbosil abens, quod ad  
luteum colorem accedit, & vitri splendorem imi-  
tatur. Eadem, quæ plumbum exustum, potest,  
sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infu-  
sa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ lu-  
teum colorem duxit: idq; sæpius, dum recremen-  
tum absumatur. Dein vbi consederit crassamen



tum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoides lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremēto vim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium.

CAP. XLIX.

**S**timmi optimum, quod splendidissimū est, modōq; nitedularū emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habēs, friabile, quod sibi appellant, alij platyophthalmon. Vis eius adstringerē, meatus obstruere, refrigerare, ex crescentia in carne cohibere, vlcera ad cicatricē perducere, sordes & vlcera oculorū expurgare. Sistit & sanguinē è cerebri mēbrana profluentem: & vt in vniuersum dicatur, vis vsto plūbo similis est. Priuatim, ambusta igni, in postulas erumpere non patitur, cum adipe recētū illitum: crustas exulcerationes ad cicatricē perducit, cum cera & exigua cerussa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutū, donec carbunculetur crusta, exemptūq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatū, quoad igni deflagret: si enim paulo magis concremetur, plumbum fit. Lauatur, vt cadmia & es. Sunt qui vt plumbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. CAP. L.

**M**olybdæna optima est flaua, argēteæ spumæ emula, modicè splēdens, cum teritur rufa. cocta cum oleo iocineris colorem trahit. Vitiōsa



riosa est, quæ aërem aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, ad Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa nõ sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremẽto plumbi similem. Vritur lauaturque eodem modo. Miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atq; emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

Argenti recrementum. CAP. LI.

**R**ecrementum argenti, quod scoriã vocant, aut helcysma, aut encauma, molybdanæ vim habet: quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducunt, vtpote cùm adstringat, extrahatq;

Spuma argenti. CAP. LII.

**S**puma argenti quædam gignitur ex arena, quam molybditin vocant, in fornacibus conflata, donec perfectè igni incādescat. Altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda, Hispaniensis: hæc sequitur quæ fit Dicaarchie, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia: plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyris: quæ ex argen-



to, calabritis. *Vs* autem adstringere, mollire, ex-  
plere caua, excrescentia in carne reprimere, ad  
cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. *Vri*  
tur argenti spuma, con fractis partibus ad magni-  
tudinem iuglandium, prunæ superpositis: ita ac-  
censa foliis, vt conflagret: abstergitur insidens  
spurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto aut vi-  
no restinguentes, rursus vrunt, & eadem profe-  
quuti, reponunt. Lauatur vt cadmia. Vt argyri  
ridi nominatæ, aut, si desideretur, alteri candor  
detur, ea in parteis magnitudine fabarum con-  
fracta, chœnicis Atticæ mensura, fictili nouo su-  
perfusa aqua, addito candidi tritici pari ponde-  
re, priuatimq; pugillo hordei, linteolo puro, raro,  
ansulis vasis alligato, coquitur, donec hordeum  
fractum dissiliat: deinde omnia in nouum crate-  
rem oris ampli transfunduntur: triticum abiici-  
tur, spuma argenti vehementer manibus affricã-  
do infusa aqua lauatur, assiccataq; in Thebaico  
mortario teritur, affusa feruente aqua, donec so-  
luta fatiscat: excolata aqua, iterum tota die teri-  
tur, & vesperi infusa calida aqua sinitur: manẽ  
colis excernitur, alia infunditur, atq; ter die ex-  
colatur. Id septẽ diebus fieri solet: postea additis  
ad singulas minas spuma argenti, quinis salis  
fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die te-  
ritur, & addita aqua excolatur: cùmq; in albue-  
rit, calida infusa, idem facito, dum nullam pror-  
sus salsedinem resipiat. Demum ardētissimo sole  
siccatur



secata, eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conuicitur, aqua infunditur, ita ut superemineat: mouetur quotidie mane & vespere, aquâque superinfunditur, priore nequaquâ effusa. Hoc sit triginta diebus: nanq; nisi moveatur, crassescit, vsq; in duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectâq; in fictile aquâ continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum sulfuginis indicium præbeat. Deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in vas aliud transfertur, & reductum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confectâ, in ventre suillo crudo ex aqua coquunt, dum viscus eliquescentes contabescat, exemptamq; cum sale pari terunt, & vt supra dictum est, lavant. Sunt qui salis libram vnâ, & spumæ argenti tantundem, in sole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantam vis argenti spumam: vbi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ delibescant, lanâq; non denigretur, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adijciens: eadem tertio, quæ supra, facito: in summa,



tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossitij libras, adijcito octogenas spume argenti drachmas Atticas, & terito: intermitensque, nitri quam albiissimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec sat incandoris contraxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi considerare desierit, colato: tum novam superadijciens aquam, manibus probe uersatam, sinito ut confidat, ac rursus per colum trajecto. Alternis eadem proseguere, dum pura aqua dulcisque effluat, & nullam salsedinem præ se ferat. Postremo in fictile novum translata, colato sensim omni humore, Soli quadraginta diebus sub Caniculæ sydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum feditates tollendas, & rugosæ facies, & cicatricosas, laceratasque, & macularum plenas.

Cerussa.

CAP. LIII.

**C**erussa fit hoc modo: Infuso in vrceum oris latissimi, aut fictile labellum quam acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculum subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisque velaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensque deciderit, humorem purum ad summam delatum colato, crassamentumque transfundite: delet quoque siccari in sole, mox tritusat



*fatili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendum, cribrandumq; : vicissim eadē tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundū locum tenet sequēs, & reliquæ suo ordine. Nec desunt, qui ligneas rudes, in medio vase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita vt acetum nō contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decē, laxato obturamēto visunt: cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, vt suprà diximus, exequuntur. Si autē quis in pastillos velit digere, aceto acrisubacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen suprà dictum opus obeundum est. ita enim candida atque efficaax redditur. Quinetiam hyeme paratur, vrceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascēdens enim calor, idem quod sol pręstat. Laudatissimam fieri putāt Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone, proximā Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico, tritam cerussam imposito, & assiduè versato: cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & vtitor. Est & illud vrendi genus: Trita satinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarachæ fiat: extractaque ad vsus ministratur. Quæ verò ita parata est. sandyx à quibusdam dicitur. Lauatur cerussa cadmiæ modo.*



*Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq; insuper excrescentia leniter reprimere, et ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis, & emplastris, quæ liparæ vocantur, pastillisq; est autem lethalis eius potus.*

*Chrysocolle. CAP. LIIII.*

**C***hrysocolle laudatissima Armeniaca, colorem porri quàm simillimè reddens. Secundū locum sibi vendicat Macedonica, & proximum Cypria, quo in genere præfertur pura: damnatur quæ terram aut calculos collegerit. Ratio huiusmodi hæc est: Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilā vehemēter fricato, & statim quā confederit, colato. Alteram infundens aquā, rursum terito: hæc vicissim proseguere, donec pura sincerāque spectetur. Dein siccatō in sole, & ad usum recōdito. Quod si vrere volueris, ex ea terēs quod satis esse videbitur, patinis supra carbones apponito, & alia facito, quæ suprā diximus. Dos chrysocolle ad purgandas cicatrices: excrescentē carnē coërcet: adstringit, purgat, excalfacit, & modicè corpus mordendo exest. Inter medicamentā intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem inferre possunt.*

*Lapis Armenius. CAP. LV.*

**A***rmenius lapis præfertur levis, colore caruleo, perquàm equabilis, calculo carens, & friabilis. Eadē quæ chrysocolle præstat, sed inefficacius. Quinetiā usum habet ad pilos in pal*



palpebris alendos.

Cœruleus. CAP. LVI.

**C**œrulei origo ex ararijs metallis in Cypro: copiosior ex arena litorali: secundum quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt chalcitis, lauatur vt cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum. CAP. LVII.

**I**ndici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum infectoria dant officina: & est spuma purpurea, innatās cortinis, quā detractam artifices siccant. Optimū existimatur quod cœrulei speciem præbet, succū suum sorbet, & leue. Inter medicamenta est, quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt: purgat, & reprimat vlcera.

Ochra. CAP. LVIII.

**O**chram leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare: excrescentia in carne reprimat: cava cum cerato explet, & articulorum tufo comminuit.

Cinnabaris. CAP. LIX.

**H**allucinantur qui cinnabarin minio eandem



dem esse existimant. Miniū enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alioqui nō dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimūq; colorem permutatur: in metallis verò strangulantem halitū eructat: itaq; facies incolæ vesicis obvelant, vt per illas spectent, nec respirādo noxiū aërem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornāmēta vtuntur. Cinnabaris vere ex Aphrica desertur, & magno constat: hætenus inuenitur, vt rix versicoloribus pictorum lineis satisfaciat: intento colore nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hematitæ lapillo eādem: conuenit ad oculorum medicamēta, verū efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus, cerato excepta, medetur.

Argentum viuum. CAP. LX.

**A**RGENTUM viuum fit ex minio, quod abusuē cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin cōtinēte, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succedunt: siquidē deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentū viū coit. Quinetiā inuenitur in argētisodinarū tectis stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam



riam omnem exedit, & defluere facit. Potum vim pernicialem habet: suo enim pōdere interna cret. Remedio est lac multum subinde potū, & omissionibus reiectum, aut vinum cum alsynbio, aut apij decoctum, aut semen hormini, aut riganum, vel hyssopum cum vino, auri limata jacob, id est, ramentum quā tenuissimum epotum mirabili est auxilio.

Rubrica Sinopica. CAP. LXI.

**R**ubrica Sinopis maximè probatur grauis, densa, ad iocineris imaginem vergens, calcolorum expers, concolor, cum diluitur, impedio fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdā, expurgatāq; defertur in Sinopem urbē, in qua veditur, vnde cognomentū accepit. Vim habet exiccatoriā, quasi inducēdo obstruentem, & adstrictoriam: quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Aliū sistit in ouo sumpta aut clystere infusa: datur iocineris vitio laborantibus. Rubrica fabrilis. CAP. LXII.

**R**ubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, et Carthaginiēsis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

Lemnia terra. CAP. LXIII.

**L**emnia terra, cuniculoso in specu nata ē Lemno insula, palustri lico defertur, inibi elect



electa, & caprinofanguini permixta: quam incolae cogunt in pastillos, & imagine caprae signant: unde & sphragida agos, hoc est, sigillum caprae, appellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa venena singularem, pota cum vino, & praesumpta euomi venena cogit. Contra ictus morsusque animalium, quae exitiale virus eiaculatur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur: est & dysenteriae utilis.

Atramentum sutorium. CAP. LXIIII.

**A**tramentum sutorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum. sed in specie differetias treis habet. Vnum namque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concrevit: quare ab iis, qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarion vocat: alij stalacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excavatos scrobes, concrementum capessit, quod pecton, id est concretitium, proprie nominatur. Tertium dicitur coctile. & in Hispania fieri solet: sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi haec est: Aqua madefactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quae racematim inter se cohaerescunt. Optimum esse creditur, caeruleum, graue, concretum, translucens: cuiusmodi stillatitium est



est, ab alijs lonchoton nominatū. Proximū, concretitium. Coctile verò ad infectus & denigra-  
 nes, aptius ceteris esse compertum est: sed ad me-  
 dicine vsum inualidius esse, experimēta docent.  
 Valet adstringere, calfacere, & crustas induce-  
 re: *latas ventris tineas* necat, drachmæ pondere  
 deuoratū, aut cū melle linctum: vomitus ciet: ad-  
 uersus hausta fungorū venena, ex aqua potum  
 auxiliatur: purgat caput, aqua dilutum, & in-  
 vellere naribus instillatum. Vritur, vt paulo post  
 in mentione chalcitis ostendemus.

## Chalcitis. CAP. LXV.

**C**halcitis praefertur similis aeri, friabilis, nec  
 lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus  
 oblongis venis, splendentibusque. Huic absterso-  
 ria vis inest, excalfaciens, & crustas vlceribus  
 obducens: purgat quæ oculis & eorundem angu-  
 lis haerent. In genere leuiter exedentium est. Ad  
 ignem sacrum, & vlcera quæ serpunt, efficax  
 est. Sanguinē e vulua, & naribus erumpentem,  
 cum succo porri sistit: gingiuarum vitia, depa-  
 scentia vlcera, tonsillasque, eius farina compe-  
 scit. Vsta, & cum melle trita, oculorum medica-  
 mentis longè utilior redditur. Callum genarum,  
 & scabritiam alsumit, abstergetque. Fistulas  
 tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex chalcite  
 medicamentū quod psoricon vocāt, duabus eius  
 partibus, cum vna Cadmie additis, & ex aceto  
 tritis. Oportet autē in fictili obruere fimo, diebus  
 quad



quadraginta, per Canicule ardores: sic enim fit acrius. Idem, quod chalcitis, potest. Alij pares utriusq; portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viuis carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit: in reliquis vero, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum & miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiamnum per flatis carbonibus, vsquedum luteo colore pallescat: aut fictili subditis cadetibus prunis, subinde versata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Misy.

CAP. LXVI.

**M**isy assumendum natione Cyprium, auri si nile, durum, quod friado auri colorem imitatur, & stelle modo splendet. Vim habet, & vstionem cum chalcitide eandem, praterquam quod psoricum ex eo non conficitur, excessus defectusq; ratione tantum differens. Aegyptium autem ceteris praestat, utpote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multo superaddito inferius.

Melanteria.

CAP. LXVII.

**M**elanteria gemine est originis: quaedam in faucibus cuniculorum, quibus aes eruitur, salis modo concrescit. Alia vero in summa fac



facie supradictorum locorum coit, quæ terrena est. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quadam. Prestat, quæ sulphuris colorem trahit, leuis, pura, equabilis, & quæ contactu aque confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

Sory. CAP. LXVIII.

**S**Ory existimarunt aliqui melanteriam esse, aberrantes, siquidem sui generis est sory, ei non absimile: verum sorci virus inest graue, & nauseam mouens, inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cypro. Prefertur Aegyptium, quod quæ frianti nigrius apparet, in multa foramina delihscens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeque magnum virus olens, ita vt stomachus in vomitiones effundatur. Quod autem friatum scintilla misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & vstionem supradictis similem habet: dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosque labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, varos extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hec autem ferè omnia, & alia, quæ vstionem experta non sunt, perustis validiora esse existimantur. preter salem, & vini facem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Com-

G



buſta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges. CAP. LXIX.

**D**iphrygis tria genera eſſe creduntur. Quod-  
dam enim metallicum eſt, quod in Cypro  
ſola gignitur: lutoſum nanq; extrahitur ex luto  
cuiusdam inibi ſpecus: extractum, ſole ſiccatur,  
mox circumpoſitis ſarmentis vritur. Diphryges  
ideo vocatum eſt, quod & à ſole, & à ſarmentis  
vratur, areſcat, & ferme torreatur. Alterũ per-  
fecti eris: quaſi ſubſidens fax eſt: ſi quidem poſt  
frigida aque offuſionẽ, vt ſuprà retulimus, cum  
de flore eris diſſercremus, ſublato are, fornaciũ  
ima parte coherens id genus inuenitur, & adſtri-  
ctionẽ & guſtũ eris habens. Tertium ſic fit: La-  
pidem pyriten, vt calcem multos dies cremant in  
camino: cũq; colorem rubricæ contraxerit, exa-  
mentes recondunt. Quidam tradunt hoc ex ſola  
materia, quæ lapidẽ eris gignit, fieri: quãdo in  
dictis arcis aſſata & in ſcrobis translata peruri-  
tur. Tunc enim ambientem ſcrobis locum cõpre-  
hendit, & exẽptis lapidibus nihilo minus inue-  
nitur. Præfertur quod ſaporem eris reddit, eris  
giniſq; adſtringens, & vehemẽter exiccãs lin-  
guam. quod ſibi exuſta ochra non vendicat: quæ  
cremata, diphrygis vice venit. Vis eius adſtringe-  
re, perpurgare, extergere, ſiccare, excrescentia  
conſumere, vlcera ſerpentia, & quæ cacoëthe vo-  
cant, ad cicatricem perducere. Suppurationes te-  
rebinthina aut cerato exceptum diſcutit.

*Ant*



## Auripigmentum. CAP. LXX.

**A**uripigmentū in eisdē metallis, quibus sandarachia, gignitur. Optimū existimatur crustosum, aureo colore micās, nulli materiae permistum, in squamas fissile: quale in Mysia Hellespōti nascitur. Huius duo genera fluxerūt: Vnum suprà dictū est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Pōto, & Cappadocia defertur: quod etiā secundū locū tenet. Torretur in testu noua viuis carbonibus subiectis, assiduōque versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritūmque reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem, crustas cum vehementi vredine, & violento morsu excitat: reprimit quæ crescunt: & capillos euellit.

## Sandarachia. CAP. LXXI.

**S**andaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia vacās, friabilis, cinnabaridis colore, sulphuris virus redolens. Dos eadē & vstio, quæ auripigmento: explet alopeciam, resina excepta, & scabros vngues cum pice eximit: cōtra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cū adipe discutit. Prodest ad narium orisque vlcerā, & ceterarū papularum eruptiones cum roseo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extusientibus. Sufficitur quoque cū resina: aduersus veterem tussim, raptō per fistulā nidore: vocem expedit, cum melle delincta: suspiriofis



cum resina in catapotio optimè datur.

Alumen. CAP. LXXII.

**O** Mne aluminis genus ferè in Aegypto & in eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiae, Aethiopia, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species: verum ad medendi usum scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens: candidissimū, gustu perquam adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebuloſe aut assuloſe compactū, sed sigillatim in capillamenta quedam canescentia dehiscēs, quale est quod trichites, quasi capallare nominatur, in Aegypto natū. Reperitur quoq; lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod nō adstringat. Dānatur in rotundi genere, quod manu cōfectū est: sed ex figura deprehenditur. Assumendū autē suapte natura rotundū, bullis turgens, albo propius, atq; validius adstringens, præterea, nōnihil palloris cū quadā pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptiū, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit limpidū, lacteū, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atque quēdā coloris igniculum expirans. Vim habent excalfaciendi, stringendi, & expurgandi, quæ caliginē pupillis oculor



orum offundunt: genarum carnem, ceterasq; ex-  
 rescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius  
 intelligitur. Vri & torreri chalcitidis modo debet.  
 Putrescentia vlcera cōpescunt: sanguinis fluxio-  
 nes inhihent: gingiuas humore pregnantēs com-  
 primunt: motus dentium cum aceto & melle fir-  
 mant. Presunt cum melle vlceribus oris, eruptio-  
 nibus papularum, & fluxionibus aurium, cū san-  
 guinalis herbe succo: lepris conueniunt cū brassi-  
 cæ folijs aut melle cocta: itē, pruritui & vnguiū  
 scabritijs, pterygijs, & pernionibus, aspersa cum  
 aqua. Valent cum aceti fæce, & galla, pari ponde-  
 re cremata, ad phagedenas vlcerum, & cū salis  
 duabus partibus, ad vitia quæ pascunt: furfures  
 cum eruo & pice illita abstergūt: ad lendes, pedi-  
 culos: ambusta, cū aqua illita auxilio sunt. Con-  
 tra tumores: & graue alarum inguinūque vi-  
 rus, illinuntur. Ex Melo autem aduectum, mu-  
 lieribus præstat ne concipiant, ante coitū ori vul-  
 uæ inditū: partus quoq; extrahit: gingiuis, si ca-  
 ro excreuit, vuae ac tonsillis accommodantur, ori,  
 auribus & verendis cum melle illinuntur.

Sulphur. CAP. LXXIII.

**S**ulphur optimū existimatur viuū, quod apy-  
 ron vocant, nitidulæ modo splendidū, perlu-  
 cens, minimè lapidosum. Probatur in genere sul-  
 phuris ignē experti, quod viret, ac præpingue spe-  
 ctatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur.  
 Supradictum sulphur calfacit, discutit, & cele-



riter concoquit prodest tussibus, suspiriosis, puru-  
lenta extussientibus in ovo sumptum, aut suffitū:  
præterea partus, vsti nidore extrahit: lepras, liche-  
nas, scabros vngues, cum resina terebinthina mi-  
stum, aufert: cum aceto autem illitū, ad lepras ef-  
ficax est: vitilignes tollit: scorpionis ictibus, ad-  
dita resina, medetur: n̄ aceto verò, draconis ma-  
rini scorpionis que plagas sanat. Pruritus toto  
corpore erumpentes, cū nitro detersum, sedat: re-  
gium morbu emendat, insparsum fronti cochlea-  
ris mensura, aut in sorbili ovo sumptū. Facit ad  
grauedine, & destillationes: sudores quoque cō-  
spersum inhibet: podagricis, cū aqua & nitro il-  
litū, cōducit. grauitatem auditus, suffiti nidore  
raptim per fistulam hausto, sanat: lethargicos  
suffitu excitat, erumpentem vndecunque san-  
guinem sistit: contusis auribus, cum vino & mel-  
le illitum medetur.

Pumex.

CAP. LXXIIII.

**P**umicis probatio, vt magnopere leuis, spon-  
giosus, scissilis, nec arenosus, item teri faci-  
lis, & candidus. Crematur flagrantissimis car-  
bonibus obrutus, & vbi canduerit, extractus, vi-  
no restinguitur odorato: iterūque incensus ex-  
tinguitur: & tertia vstione exemptus, & per se  
refrigeratus, ad vsus conditur. Vis eius ad stringe-  
re, gingiuus abstergere: purgat cum calfactione,  
qua caliginē pupillis offundit: explet vlcera, &  
ad cicatricē perducit: excrecentia cohibet. Fit ex  
far



farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus author est, si quisquam in bullientem vrceum vini pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

Sal.

CAP. LXXV.

**S**al fossilis efficacior est, cōmuniter, si est cādūsus, calculis vacans, & perspicuus, densus, equali cōpage. Peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si modo findi facile possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est cādūsus: equalis, densus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis generalacustris præfertur: sed multo validissimus est. Phrygius nomine tapæus, aut triteus, aut gnateus. Salis, natura in cōmune perquam utilis est: adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimit, extenuat, & crustam inducit. Sed hoc interest, quod alius alio sit præstantior. Quin & à putredine vindicat. Admiscetur medicamentis psoræ abstergentibus. Excrescentia in oculis reprimit, & pterygia consumit, ceterasque carnis extuberationes tollit: clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur, doloresque in saccis fotu mitigat, & pruritus sedat, ex oleo & aceto infriktus ad ignem, donec sudent. Item lichenas, lepras, psorasque. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat: tonsillis vnaque, cum melle tostus. Vlceribus in ore



manātibz, gingiuis, quas humor vexat, & phagedenis vlcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus ceras ten, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendrea morsus cum melle & aceto: aduersus vesparum ictus, & teredines, albid usq; capitis pustulas, thimos & tubercula, cum seuo vitulino: furunculos cū vua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum aurigano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus, in linteolo, & intinctus aceto, ita vt vinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus. Sugillationes in facie, ex melle. Cōtra haustum opiū & fungos, cū aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina, & melle: ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur. & aurium doloribus cum aceto: ignes sacros, & vlcera quę serpunt, cum aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusque prunis, vsque dum efferuescat. Aliqui fossilem subacto polline obliniunt, & carbonibus subiiciunt, vsque dum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo vri: Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturque, donec iam nō exiliat. Spuma salis, spumosi maris lanugo siue ramentum



tum est in exilibus petris inuentum, cui vis eadem quæ sali.

Muria. CAP. LXXVI.

**M**uria effectus salis præbet, abstergitque: dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit: & ischiadicis veteribus. Ad fotus, aquæ marinæ vsum præstat.

Flos salis. CAP. LXXVII.

**F**los salis flumine Nilo defluit: lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. Interdum longè magis virus olet, gustuque mordacior, & pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente factitium colorem. Ad vlcera, quæ cacoëthe vocantur, & phagedenas, genitalium nomas, & purulentas aureis, efficax est: oculorum hebetudines, cicatrices albuginésque tollit. Emplastris vnguentisque coloris causa, vt rosaceo, miscetur: sudorem cit: aluum turbat, in vino aut aqua sumptus: stomachum malè habet. Additur acopis, & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componitur: & in vniuersum acris est, & feruentis nature, vt sal.

Nitrum. CAP. LXXVIII.

**P**refertur nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, périnde quasi

G 5



spongiosum quiddam, quale ex Bumis affertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordēs: qualis ex Philadelpia Lydiæ defertur. Secūda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Carie gignitur. Vim & vstionem salis habet, tam nitrum, quàm spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, sitritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, vti ruta, vel anetho. Febribus circuitu redeūtibz illinitur, ante suspectam accessiōē. Miscetur emplastris, quæ extrahūt, et discutiūt, extenuant, & lepras abstergūt. Cum aqua autē calida aut vino infusum, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundē sanat: sordes expurgat, cum aceto instillatum. Canū moribus ex asinino adipe aut suillo medetur: resina terebinthina admistū furunculos aperit: aqua inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem visus cū melle succurrit: & venenis fungorum, ex posca potum: aut si huprestis momorderit, ex aqua: ijs verò, qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio, ijsq; qui cibum non sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonisq; iā remissioribus, & luxatis, cum cerato: in resolutione lingue, pani cōmodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus vrunt, subiecta prius testa nona, donec incandescent.

Fxx



**E**Ligenda fæx maximè à vino vetere, Itali-  
co: sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti  
viribus longè acrior est. Crematur vt alcyoniũ,  
antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni  
largo vrant, vsque dum penitus incēdatur. Alij  
vuis carbonibus facis glebam obruunt, & idem  
opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ  
vstionis, vt aërio nitore inalbescat, linguamq; ta-  
ctu vrere videatur. eadem vrendæ facis aceti ra-  
tio. Vis ei supra modum vrens, & abstergens: vl-  
cera ad cicatricem perducit, adstringit, vehemē-  
ter exest, siccātq;. Sed recenti vtendum est, quo-  
niā celeriter exanimatur: prōinde nō nisi in re-  
cōditorio, & vase aliquo reponi debet. Lavatur,  
vt pompholyx. Quæ vstionē experta non est, tu-  
mores & per sese, & cum myrto cohibet: ventris  
stomachiq; fluxiones illita sistit: muliebri proflu-  
uium, imo ventri aut genitalibus imposita, miti-  
gat: panos discutit, nondū exulceratos, & tuber-  
cula: rigentes mammas suiq; lactis impatientes,  
cum aceto peruncta extinguit. Cremata verò, vn-  
gues scabros cum resina aufert: addito lentiscino  
oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculo-  
rum medicamentis, vt spodos, adijcitur: cicatri-  
ces eorum & caligines eadem abstergit.

Calx viua. CAP. LXXX.

**C**Alx viua hoc modo fit: Marinorum bucci-  
norum testas igni condito, aut feruenti cli-  
bano



bano, nocte dimittito: postera die, si candidissime fuerint, extrahito: sin aliter, iterum vrto, usque dum vehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidam immerse fuerint, in fictile novum conijcito, & exacte pannis operiens, noctem unam conquiescere finito: mane eam extrahens, ubi perfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & e litoralibus calculis igne crematis, necnon e vili & fusaneo marmore, quae ceteris praefertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, concoquandi vim assumit, mollit & dissipat: ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. CAP. LXXXI.

**G**ypsum vim habet adstringendi, obstruendi sanguinis eruptiones sudoresque cohibet: sed potum, strangulationis modo iugulat.

Sarmentitius cinis. CAP. LXXXII.

**S**armentorum cinis vrendi vim habet: cum Saxungia autem vel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & nervorum nodis prodest, cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimat: serpentium canumque moribus illitus ex aceto medetur: crustas obducentibus medicamentis admiscetur. Fit ex eo lixiuium contra precipitationes, & fungorum venena, cum aceto, sale, & melle.

Alc



## Alcyonium. CAP. LXXXIII

**A**lcyoniū quinq; esse genera compertum est: vnū enim spissum, acerbisaporis, spōgiosa facie, item tetri odoris: ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus, inuenitur. Alterum pinnule oculorum aut spongie simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidem vocant. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum figura fungi sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris leue, acre, quod plurimū in Propontide iuxta insulam Besbicum appellatam gignitur, patrio nomine halos achmen vocāt. Duo priora in feminarum smegmata assumuntur, cōtra lentigines, lichenas, lepras, vtiligines, nigritias, & maculas in facie reliquoque corpore. Tertium ijs, qui difficili vrina vexantur, aut arenulus in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aque inter cutem, lieni. Vstum autem, & ex vino illitum alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est: in alia smegmata, psilotbraque assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recondat. Lauatur vt cadmia.

Adarc



Adarces. CAP. LXXXIII.

**F**It in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta salsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asy similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, ut videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat, qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongiæ. CAP. LXXXV.

**E**Spongiis alias mares appellauere, tenui fistula, spissius: quarum duriores tragos nominarunt. Fœminas autem, quæ contrarias doctes habent. Vruntur eæ, ut alcyonium. Recentes sine pinguitudine, vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua poscæve cōglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetuste autem inutiles. Arida ligata lino, si penicili modo adigantur; occlusa vlcera, callōsque laxant: sicce recentes & vacue senilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim exedunt, impositu siccant: sanguinis profluum si sunt. Crematarum cinis ex aceto, arida lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamenti lauare cinerem. Omnium cinis cum picis crem:



crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidæ cura sunt, è molliſſimis recentes, per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris coheret: insolantur inuersæ, hoc est, parte caua sursum spectante, & qua abscissæ fuerunt, deorsum. Si verò æstiva serenitate ad lunam sternantur, perfusæ salis spuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

## Corallium. CAP. LXXXVI.

**C**orallium, quod aliqui lithodendron appellarunt, marinum esse fruticem constat, quò alto extractus, duratur statim atq; emergit, tanquam offuso aëre protinus concreſcat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promotorio cui Pachyno nomē est. Laudatissimū, rubens, colore antherici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facile cedens, equali vsque quaque cōcremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quàm ramosissimum, forma fruticis, cinamomi emulum. Quod autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter: excreſcentia coërcet: oculorū cicatrices abstergit: vlcerū caua, & cicatrices explet: cōtra sanguinis reiectiones magnopere efficax est, vrinæ difficultati auxiliatur. Quin & potū ex aqua lienem absumit. Quod antipathes vocāt, coralliū esse arbitrantur, specie tantū distās. Est autē colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Phry



Phrygius lapis. CAP. LXXXVII.

**P**hrygius lapis, quo infectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem vino optimo perfusus, viuisque carbonibus obrutus, perflatur assiduè follibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem vino restinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: attendendum tamen, ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Vis cruo vstòque adstrictoria, expurgans: vlcerebus crustis quadàmtenus inducit, ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut cadmia.

Asius lapis. CAP. LXXXVIII.

**A**sius lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, itè friabilis, scissiles venas lutei coloris adimū actas habens. Eius flos, salsugo subflaua est summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum vergente: admotus linguae aliquantum mordet. Vim habet vterque adstrictoriam, & modicè erodentem, admistus liquida pici, aut terebinthine, tubercula discutit. Longè validior flos existimatur. De ceterò siccatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnātia sanat: excrescentia cohibet, tetrāque vlcera & fungis similia, cū melle expurgat: vlcerebus cava explet, & ex



& expurgat cum melle, depascentiâque cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento: & lienosis, ex aceto & vina calce. Prodest flos ex melle phthisicis linctus. Podagrici inuuantur, pedibus in solo ex eo lapide excavato inditis. Fiunt quoque pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassitiem absumunt, cum vice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmie modo lauatur.

Pyrites.

CAP. LXXXIX.

**P**Yrites lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas edens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna continuè flatur foliis, donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deijciunt, & ubi ad fuluum colorem vergere cœperit, extrahunt: efflatoque cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assiccatus, friabilis reddatur: siquidem sæpe facies summa solum utitur. Ita crematus, siccatusque, recoditur. Si eloto opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi quam vsti vis est, excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere. Resina exceptus excrescentia in carne cohibet, sed calorem quendam & adstrictionem parit. Ita vstum nonnulli diphryges appellant.

Hæmatites.

CAP. XC.

**H**ÆMATITES optimus habetur friabilis, sat

H



rato colore niger, durus & suapte ingenio equalis, nulla sorde admista, nullóq; Zonarum discursu. Vim habet adstringentē, & excalfactoriā ali quantum extenuantēq; oculorū cicatrices & scabritiā cum melle purgat: cum lacte autē muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis cōuenit: bibitur contra difficultatē vrinæ, & fluxiones mulierum in vino: & ab hijs qui sanguinē reiecerunt, cum succo punici mali. Fiūt ex eo coticula & collyria oculorū vitijs apta. Vritur vt Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est, vt modicē leuis fiat, & bullis quibusdā intumescat. Sunt qui hematitē ita adulterāt: Densam glebam rotundāq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices vocātur, in vrceū figlini operis, qui feruentē cinerem contineat, condunt, paucāq; interiecta mora eximūt, experiuntērq; si trita ad cotē hematitæ colorem reddat: quòd si ita res se habet, reponūt: sin minus, iterū obruūt, & subinde conspicientes, periculum faciūt: si quidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur mal. confictus, primū scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At hematites longè secus se in colore habet: nanque hic floridum reddit: hematites verò saturatiorem, atque cinnabarim imitantē. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnetæ lapide, vehementer ambusto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

Sch



Schistus lapis. CAP. XCI.

**S**chistos lapis in Iberia Hispania gignitur. Probaturn maximè qui croci colorem emulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium venarũ discursu, pectinum modo, Ammoniacosali similis. Vim exhibet hematite, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua replet muliebri lacte perfusus: ad prociidētia, rupta, item genarum crassitiem, & vnas oculorum, magnopere efficax est.

Gagates. CAP. XCII.

**I**n gagatarũ lapidum genere præferēdus, qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit: niger est plerunque, & squallidus, crustosus, perquã leuis. Vis ei molliendi, & discutiēdi: deprehendit fonticum morbum suffitus, recreatque vulue strangulationes: fugat serpētes nidore: podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autē & locus & amnis Gagus, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

Alij plures lapides. CAP. XCIII.

**L**apis thracicus dictus, nascitur in flumine quodam Scythie, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo restingui: quod in bitumine accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cœruleum vergente, densus, nec admodum grauis.



Datur cum aqua mulsa, trium obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematū pro hematite vident. Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitus hemorrhoidas exiccat: eius cinis dentifricio optimus.

Galactites appellatur, quod lacteum succum resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones & ulcera conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recondere, propter vim glutini, quod ei obhaeret. Melitites omnia galactite similis: hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem ut galactites effectus. Morochthus lapis, quem aliqui glaxiam, aut leucographida vocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, utpote molli, & facile liquecente, linteones dealbandis vestibus vtuntur. Spiracula corporis obstruere videtur, conueniens ijs, qui sanguinem expuunt, coeliacis, & vesicae doloribus, cum aqua potus: itidem fluxionibus vulvae, et impositus velleri. Mollibus oculorum collyrijs miscetur: explet enim caua, atque de lacrymationes sistit. Idem cerato exceptus, ulcera que fiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit. Albastrites vocatus onyx, crematus, resinae aut pice assumpta duritias discutit: stomachi dolores cum cerato leuat, & gingiuas comprimit. Lapis nomine thytes, in Aethiopia gignitur, sub viridi colore iaspide nimitatus: cum diluitur tamen lacteum succum reddit.

Vcl



Vehementer mordet: tenebras, quæ pupillis obuer-  
santur, expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa nasci-  
tur, glandis effigie, candidus. Scita admodum cõ-  
figuratione, lineis æqualiter inter se distantibus,  
quasi industria detornatis: solutus nullã qualita-  
tem manifestam gustui representat. Potest cice-  
ris magnitudine tritus ad cotem, vt collyrium,  
cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati  
vrinæ auxiliari, et calculos in vesica cõminuere.  
Amiantus lapis in Cypro nascitur, scisso alumi-  
ni similis: quo, vt pote flexili, telas & vela tan-  
tùm spectaculi gratia texūt, quæ ignibus iniecta  
ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiora  
exeunt. Saphirus lapis, percussis à scorpione potu  
prodesse existimatur. Contra intestinas exulce-  
rationes libitur. Excrecentia in oculis, vñsque  
& pustulas inhihet, & ruptas membranas co-  
git. Memphites in Aegypto iuxta Mēphin in-  
uenitur, calculorum magnitudine, pinguis, ver-  
sicolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut  
secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita vt nō  
sentiant cruciatum. Selenites lapis, quem aliqui  
aphroselenon appellarunt, quoniam noctu inue-  
nitur lunæ imaginem reddere, qui cum ea quidē  
augetur & decrescit. Nascitur in Arabia, candi-  
dus, translucēs, lenis. Huius ramēta comitialibus  
in potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amule-  
ta mulieres vtuntur. Arbores adalligato eodem  
frugifera redduntur Iassidum quædā smarag-



dum imitatur, alia crystallum, colore similis pituita: alia non dissimilis aëri, ob id vocatur aëri-xusa: alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex argumento vocatur: quædam lineis albis & resplendentibus præcingitur, Assyrios appellata: alia terebinthine similis, quæ terebinthixusa dicitur: alia colore callaida gemmam emulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appense. Aëtites lapis est veluti prægnans, cum quatitur, alio in vtero sonante. Grauidis continet partus, cum lubrica sunt vuluæ & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturientibus è brachio amoveatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quin etiam concoctus, furem coarguit: quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio excafaciente, comitiales magnificè iuuat. Ophite genera multa: quidam ponderosus & niger: alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus prosunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari. Lapides in spongiis inueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vino poti. Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur: conflatur autem ex marmore, lapide Parisio,



rio, & taurino glutina. Potest cādēte specillo ad-  
motum, incōmodos oculis pilos replicare. Ostra-  
cites testa similitudinem habet, crustosus, & in  
laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pi-  
los, pro pumice vtuntur. Menses drachma ponde-  
re potus ex vino, sistit. Si quatuor diebus à pur-  
gatione bibatur sicilici pondere, feminis præstat  
ne concipiant. Cum melle autē impositus, mam-  
marum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

Smiris lapis est, quo annularij sculptores lapi-  
des expurgant, ad erodendum & vrendum uti-  
lis: gingiuis, quas humor vexat, prodest: dentifri-  
cio cōmēdatur. Arena è litoribus sole feruefacta,  
hydropicorum tumores exugit, si capite tenus, in  
ea obruantur. Torreri solet ad aridos fatus, pro  
milio aut sale. E cote Naxia, quod ex acueño fer-  
ro deteritur, illitū alopecias ad pilū reducit: vir-  
ginum mammas cohibet, nec increfcere patitur:  
potum ex aceto, lienem absomit, & comitialibus  
prodest. Geodes lapis, adstringit, siccāt, caligines  
oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, testū  
mammarūque inflammationes sedat.

Terra. CAP. XCIII.

**O**mnis terra ad medendi vsum recepta, sum-  
mam & primam vim habet refrigerandi,  
meatēsq; obducendi, occludendique. sed specie di-  
stat, cum alia adiūctis quibusdam ad alia sit uti-  
lis. Eretriades due sunt, vna vehemēter alba est,  
altera cinericia. Optima habetur ad cinereū co-

H 4



lorem vergens, perquam mollis, quæ si per aramenta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur ut cerussa, ad hunc in modum: Teritur seorsum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur interdiu, adiecta aqua, ut vespere coëscat: antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideratur, pastilli magnitudine ciceris infictile perforatum coniunguntur, oræque vasis diligenter obturato, supra carbones cadentes continenter foliis perflantur: ubi verò cinis in fauillas se conuertit, aut aëreum colorem contraxit, excepti reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem: caua explet, & sanguinolenta coëglutinat. Samia præfertur candida, leuis, tangenti lingue glutinis modo adherescens, mollis succosa, friabilis: cuiusmodi est, quam aliqui collyrion vocant. Due enim species eius: unam, antè diximus: altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut eretria, vimque consimilem habet: sanguinis reiectiones sistit, & feminis fluxione vulue laborantibus, cum flore sylvestris punice datur. Testium & mammarum inflammationes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arcet: contra serpentium morsus & venena, pota ex aqua auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifices vtuntur poliendo auro, ut resplen-



splendeat. Probaturn cādore & duritia. Vis ei ad-  
strictoria, & refrigerans: prodest stomachicis po-  
tus: sensus hebetat: verū ad fluxiones oculorū  
& vlcera, cū lacte efficax est. partus, vt tradūt,  
adligatus accelerat, & conceptus feminarū cu-  
stodit. Chia eligi debet candida, vergens ad cine-  
reum, Samie similis: est autem crustosa, albāq;  
sed fictitius formis differēs. Vis eadem quæ & Sa-  
mie: extendit faciē, & erugat, atq; splendidā red-  
dit: colorē in facie & corpore toto commendat: in  
balneis pro nitro deterget. Eadem præstat Seli-  
nusia: maxime laudatur, quæ vehemēter resplen-  
det, & cādida, friabilis, & humore dilui celerri-  
ma. Cimolie duo genera, cādida & ad purpureū  
inclinās. Optima existimatur, quæ innatā habet  
pinguitudinē, tactūq; frigida sentitur. Vtraq; ace-  
to diluta, parotidas, & alia tubercula discutit: ā  
busta igni, si statim cimelia oblinantur, pustulas  
non sentient: testium duritias, & totius corporis  
collectiones colibet, igni sacro imponitur. In sum-  
ma, vtraq; multum in medicina commendatur,  
si incorruptæ originis, nec spuria assumatur. Quæ  
pnigitis ducitur, colore ferē eretrie similis est, grā-  
dioribus tantum glebis: manū si quis admoueat,  
refrigerabit: tactu linguae, usque adeo glutinosa,  
vt pēsilis hæreat. Cui effectus idē qui cimelie, pau-  
lo tamen infirmior. Hæc aliqui pro eretrie ven-  
dunt. Fornaceæ testæ vehementer tostæ, crustas  
vulceribus obducunt: quare prurigini & papula



rum eruptionibus medetur. Podagricis profunt, strumas discutiunt, cerato excepte. Fornacū terra que retorrída fuluescit, eiusdem cū testa effectus. Melia colore cinerea eretria imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, deraſi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: nam modicè linguā siccāt: purū corpus reddit, & colorē cōmendat: pilos extenuat: vitiligines, & lepras abstergit. Pictoribus vsum prabet, vt colores diutius perennent: emplastris viridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omnia alia in vniuersum eligi debet recēs, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cū humore attigerit, facillè resoluatur. Ex ampelitide terra, quæ pharmacitis nomine, in Seleucia Syria nascitur, laudatur in primis nigra, piceæ longos carbonēs referēs, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquore non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet: ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vſus eius ad illinēdas vites sub germinationis tēpus, vtpote cū innascētes verniculos enecet.

Fuligo pictoria. CAP. XCV.

**F**uligo qua pictores vtuntur, ex vitarijs officinis colligi solet: siquidē ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax: fracta cū rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Atr



Atramentum librarium. CAP. XCVI.

**A**tramentum, quo scribimus, fuligine è  
tedis coacta colligitur. In singulas libras  
gummis ternæ fuliginis vncia adijciuntur. Fit  
etiam è resinarum & pictoria fuligine, de qua  
paulò antè diximus. Assumitur autem fuliginis  
mina, gummi sesquilibra, glutinis taurini, atra-  
menti sutorij, singulorum sescuncia. Additur con-  
uenienter erodentibus medicamentis: ambustis,  
ex aqua commodè crassius illinitur, sed non antè  
soluatur, quàm cicatricem induxerit: sanatis si-  
quidem vlceribus, sua sponte decedit. Cæ-  
terùm habes, amicissime Arce, ferè  
que tradenda duximus pro  
operis modo, quem de-  
stinaueramus, &  
materie au-  
xilio-  
rùmque medici-  
narium co-  
pia.

QVINTI LIBRI  
FINIS.






P E D A N I I

## DIOSCORIDIS

A N A Z A R B E I, D E

venenis, quóque modo ar-  
ceantur, viten-  
túrque,

L I B E R V I.



*S*UPERIORIBVS, amicissi-  
me Aree, libris tradidimus de  
aromatibus, oleis, vnguentis, ar-  
boribus, & earúdem fructibus,  
lacrymisque: item animalibus,  
melle, lacte, seuo, fumentis, oleribus, herbis, radi-  
cibus, liquamentis, vinis, metallisq;. In hoc verò  
totius operis vltimo, facultates medicamentorú  
recenscimus, quæ prodesse nobis, vt efficere pos-  
sunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus in-  
stitutum prosequamur. Huiuscemodi autem tra-  
ctatus, cum bifariam distributus sit: in partē ve-  
nena præcauentem, ita vt ne fallant sumentes,  
aut si quando per imprudentiam dentur, vt tum  
quoque innoxia fiant, irritaque: & in rationem  
iis succurrendi, qui iam noxiam sentiunt: primū  
differam de præcauendi modo, quem esse difficilli-  
mum plerique maiorum arbitrantur, quòd dan-  
tes clàm venena, ita insidias temperant, vt pe-  
rit



ritissimum quæque decipiant. Siquidem vene-  
na sua amaritudine, permistis dulcibus, spoliât,  
& graue odoris virus mistura odoramentorum  
eximût: aut medicamêta immiscent, quæ tuêdæ  
sanitatis gratia dari putantur: & præsertim in  
valetudine, vt absynthium, tragoriganum, satu-  
reiam, aut hyssopum, quinetiam thymum, irim,  
origanum, abrotonû, castorium. aut si quid me-  
dicamentis purgatorijs cognatâ habere qualita-  
tem videatur. Aut potionibus inserunt: vt vinis  
asperis, iuribus, passô mulsæ aquæ, musto: succis,  
vt in cremore lentis, polêtis: aut medicaminibus,  
aut alijs quæ assumûtur, edulij speciem referenti-  
bus. Quare qui in ea suspitione sunt, cõditos cibos  
vitare debent, omniq; intẽso sapore dulcium, aut  
salforû, aut acidorû, abstinere: nec sitibundi affa-  
tim bibere, aut esurientes voraciter comesse, sem-  
pérq; ad saporem horû diligenter attendere, præ-  
sertimq; potu frigidam aquam præsumere. Satia-  
to enim appetitu, qualitates ægerrimè postea cõ-  
coquantur. In egris quidem facîle cauemus po-  
tiones auxiliij pretextu dari solitas, quas offerûnt  
improbi veneficiorum artifices: itaque ob id labo-  
rantes morbo nõ perinde audentium iniurijs pa-  
tent. Et hæc quidẽ ne facîle incauti seductiq; ho-  
mines capiantur dolis veneficorû, ratio est, & fa-  
cultas. Sed alia superest expeditior, vt suspiciosi  
aliqua præsumant, quæ venenorum vires hebe-  
tent, & inefficaces irritasq; reddant: cuiusmodi

car



caricæ sunt cum iuglandium nucibus manduca-  
te, & quæ cedromela vocant, id est citria, semi-  
nisq; napi drachma cum vino. Item folia cala-  
minthe, aut creta quæ Lemnia sphragis appella-  
tur, pondere pari cū vino: aut rutæ folia & nucis  
iuglandis nucleū: aut caricæ duas: & salis cal-  
lum ieiuni sumant, & nullo veneni genere leden-  
tur. Antidota ex vino sumpta eundem effectum  
præbent: inter quæ intelligitur magnum Mithri-  
datium, & quod scinco, & quod sanguine tempe-  
ratur. Quin & sæpe venenis obsistunt peculia-  
res quidam corporum affectus certo quodā mo-  
do constitutum cum quadam cibi potūsque qua-  
litate, tum vini copia ita temperaturum, ut cum  
venenis dissentiant: siquidem ingesti veneni vi-  
res frangunt, atque iam priore alimēto farctis præ-  
clusisq; meatibus, obstant ne membratim per di-  
gestionem insinuetur. Verum enimvero quoniam  
fortune necessitas interdum similia discrimina  
peregrine agentibus affert, atque ullis insidijs homi-  
num, nonnihil differendum mihi de hac re neces-  
sarium duco. Iam primum igitur culinam appa-  
rare loco subdiali convenit, cibosque & potus in hu-  
iuscemodi loco struere. Si id fieri commodè nequit,  
secunda erit conditio hæc, apparandi apponen-  
dique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia ani-  
maduertenda: frequenter enim à superioribus cō-  
tabulamentis animalia decidunt, exigua qui-  
dem, sed quæ non modicam perniciem moliatur,  
ut



ut phalangia, stelliones, & alia quædã reptilia. Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet: nanq; reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdum verò delapsa immersaq; expirarunt, et exitus causas haurientibus attulerunt. Sed hæc hætenus dicta sunt, ne cauti & proxidi insidijs pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundã insidijs sumpserunt, auxiliari primo quoq; tempore oportebit: siquidem dum comites singulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile fit venenum, & paulisper neglectum, medicamentis agrè cedit. Quare si qui pro compertose virus sumpsisse intelligant, & fateantur, aut eorum, qui adierant, testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile peculiari nativæq; constitutioni restituemus. Neq; enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quo enim modo morbi, quorum cause cæce latentescq; corporibus insidit, medicinam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt venena, medendi rationem aspernantur? Aequè verò omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, proque antecedentibus affectionibus qualitatibusque, quibus sit opportunum corpus, vel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forson obmutescentes, aut temulenti, aut nolentes alioqui venenū à se egeri, nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus



tinus accedendum ad ea, quæ communiter epotis quibuscunque venenis opitulari consueverunt. Atqui nullum magis in omnia valens auxilium dari potest, quàm vt proximoloco virus foras ex hauriatur, priusquàm inuale scat. Quare sine mora, calidũ oleum ex aqua, aut seorsum, vt vomitare cogatur, dari cõuenit. Aut si oleũ natura loci negat, butyrũ cũ aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, vrtica, fenogracio, aut halicæ decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non modo vomitionibus exigent vi illa sua laxatrice, aut nauseam ciẽte, sed aluum quoq; subducẽt, & corporum inanitione ita aduersabuntur, vt acrimonijs venenorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumẽto deprehẽdere licet: E st o, vt quisquam viua calce vel fæce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem nõ accipiet. Atqui neq; vehemẽter adstringi corpus, neq; refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiam vomitus non ob id modo quòd vacuet, & noxium humorem excernat, inuamẽtũ adfert, sed quòd assumptũ virus nõnunquam odore, coagulatis grumis aut colore prodat: quippe cùm odore & amaritudine, meconium: colore, cerussam, gypsũ ve: grumis, lac aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ beneficia deprehendit, ita vt nonnulli ab ijs

tem



remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo etiam maluæ decoctum admiscetur, aut glaucium, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū iura, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi verò vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquiæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum & cum hydromelite sumptum, vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, vetustæ carnes pinguisque, & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum namque subducunt, uti diximus: & stomachum resoluētia, proniorem ipsum ad vomitionem reddunt: & venenorum acrimonias hebetāt, atque meatus obstruētia, celerem virium penetrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ cōmuni dote prosunt: ut Lemnia terra, agaricum, abrotonū, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calaminthæ, nardum gallicum, castorium, ferulæ virētis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser aut laserpentium, sagapenū, peucedani succus, aut panacis, & radix, quā magudarim appellant, aristolochia longa, syluestris rutæ semen, & betonica, quam cestron nominant, folia: singula cum vino drachmæ pōdo sumi debent. Effectū præbet polij decoctum, & seseli, & liquida pix linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio



præstidi auxiliū ita se habet. Caterū ab ijs quæ  
 consueuerunt euenire, cōmunia remedia sumpti-  
 tari possunt. Ferè enim vires venenorum quā-  
 plurimorum, in affectus consimiles corpus tan-  
 dem redigunt. Quam ob causam plerisque com-  
 munia cōducūt auxilia: varia etenim sunt vene-  
 norū genera, communes tamen nec multi iisdem  
 affectus oriuntur. Neq; fieri potest, vt omnes cō-  
 currentesque casus, quæ symptomata vocant,  
 vnū venenū sequantur. Alioquin superuacanea  
 fuisset venenorum singulorum traditio cum suis  
 remedijs ab authoribus descripta. Neq; verò in  
 vno eodēque promptū est inuenire, vt quis sto-  
 machi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesi-  
 cæ dolore vehemēter crucietur, vt singultiat, ero-  
 datur, cōtremiscat, & frigeretur, obmutescat, con-  
 nellatur, pulsus elāguescat, spiritus difficilis fiat,  
 veterno prematur, vertigo obuersetur, caligens  
 sensus, stranguletur, sitiāt, sanguis erūpat, febre  
 conflictetur, agrè lotiū reddat, torminibus vexetur,  
 crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat,  
 liuore sugilletur, palleascat, decipiat, stertat, viri-  
 bus deficiatur, & pleraq; alia faciat, patiaturq;  
 singula enim in generales affectus deducta, pau-  
 ca numero, & cōmunia ea demōstrant, quæ eue-  
 nire consueuerunt. Quare in singulis, quæ suprā  
 diximus, non facile fuerit deuoratū virus cogno-  
 scere. Nam oris & lingue erosio, stomachi, ven-  
 tris, vesicæ ac renum inflammatio, vehemens vri-  
 ne diff-



ne difficultas, & interdum cruoris cū eo exitus, lancinatio, & in plurimis partibus quidam aduersionis sensus, nō in cantharidibus modò potis reperiuntur, sed in erucis quoque pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro non modò eos, qui meconium hauserunt, verno aut sopore premi, stertere, liuore sugillari, corpore, refrigerari, stupescere, toto torpere pruritum sentire, sensu privari constat, sed eos etiam qui mandragorā aut cicutam deuorarunt. Delirium nō hyoscyamus tantum infert, verum etiam quæ toxica appellantur: itidem aconitū, & mel quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis, quàm in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa, gypso conspicitur. In summa, difficile vnum vni veneno proprium inuenire signum, quod haustum, gustatūque virus prodere possit: maxime, quòd hæc ceterorum etiam vitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Ceterum in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possit, si ad ea respexeris, quæ sumus dicturi. Sed in ijs, qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dūtaxat quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cū venena statim atque præsentaneam vim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus, communia reliquorum vitiorum remedia, compositionesque flagitent, cū venefica proprietas non amplius insit. Si verò longa sit affectio,



in aliquod diuturnorum morborum genus recidet, à quibus facile fuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hactenus. Cōsequēter quæ priuatim singulis prosunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficam vim sortiuntur, vt medicine studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationē salutis scripta inueniuntur: quod nonnulla eorū, quibus vtuntur, venenis sint cōmixta. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe continuo vsu eorum, homo in pernitiē agitur. Proinde animalia quæ exitiosam vim habēt, hæc sunt: cantharides buprestis, salamandra, pinorum eruce, lepus marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuoratae hirudines. Semina sunt: hyoscyamus, coriandrū, cicuta, gith, psyllion. Liquamenta. meconium, opocarpason, thapsie succus, elaterium, mandragoras. Radices, quas mittit chameleo, aconitum, thapsia, veratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum vocant, quod in Colchide nascitur. Herbe oleraquæ: smilax, quam aliqui tithymalum appellant, Romani taxū, solanum manicū, quod & dorycnium dicitur: sardinia herba, quæ ranunculi genus est, corniculatum papauer, pharicū, toxicum, ruta syluestris, fungi. Ab animalibus: taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitū. Metalla: gypsum, cerussa, calx, auripigmētum, duo



duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domesticis: vinum abundi post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

Cantharides.

CAP. I.

**Q**uibus datae sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam vsque cuncta erodi sentiuntur, picem aut simile quidem cedriæ resipiunt, dextra præcordia inflāmantur: vrinam ægre reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atque dysentericis, aluo deferuntur: fastidia vrgent: animo linquntur, obortaque vertigine concidunt: postremò mente abalienantur. Ergo antea quàm tale nō nihil accidat, dato oleo, aut supradictorū aliquo, vomere cogantur: mox ubi vmitione plurima reiecerūt, halicæ aut oryzae, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluæ, aut seminis lini. aut fanigraci, aut radicum althææ, quam Latinus sermo ibiscū appellat, clystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex lydræ melite, vt quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex nitro aqua mulsa, vacuari debēt. Detur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo li-



quesactus. Inflammate autē partes, herdei farina cū mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quòd citatus ab eis calor, illapsū virus ita remoratur, ut in principes se parteis insinuet: ipsa tamen, interiecto tēpore, molestissimis inflammationibus opitulantur, ut pote quæ dolores & permulceant & leniāt. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctū fuerit, in solium descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhaeserunt, etiā excernātur. Et deiectiones multifariā moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capessat. Gallinaceis carnibus & hœdinis, aut suillis catulis, maximè pinguibus & tenerrimis, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem aluum cient, atque venenorum acrimonias hebeant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur. Item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum rutæ decocto, recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè, antidota auxiliantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucæ. CAP. II.

**I**ls, qui erucas pinorum hauserunt, illico dolor in ore & palato excritur: vehemens alui, linguae ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginē sentire videantur:



tur: corpus totū exaestuāt: fastidiū vrget. Quibus est succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Buprestis. CAP. III.

**Q**ui buprestin biberunt, non dissimile nitro virus sapiunt, stomachi ventrisq; rehemens dolor insequitur. tamen venter, quā stomachus mirum in modum, vt in aqua inter cutē diffllatus, inturgescit. Vniuersa corporis facies cōtenditur: vrina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliantur. Privatim post vomitus & vacuationes, quas clysteribus molimur, arida sicus prosunt: itē earū decoctum, ex vino. Vbi verò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra. CAP. II II.

**S**i salamandram hauserunt, linguae inflāmatio consequitur, mens & sermo prepeditur, tremor cum corpore aut horrore quodam ac exolutione accedit: partes nōnullæ corporis liuoribus circumquaq; sugillantur. sepēque, diuini immorante veneno putrescentes, defluūt. Quibus præstabimus cuncta, quæ potis cantharidibus. Peculiariora verò remedia, resina pinus, aut galbanum.



ex melle linctū, & aiuge decoctū, in quo nuclei  
pinei conterantur: vrticæ quoque folia, cum lilij  
& oleo decocta. Prosunt etiā oua testudinis ma-  
rine aut terrestris, cocta: item ranarum ius, cum  
quibus eryngij radix incocta sit.

Ephemerum. CAP. V.

**S**Umpito ephemero, quod aliqui Colchicon, aut  
syluestrem bulbū appellant, pruritus in to-  
to corpore excitatur, non secus atque ijs qui vr-  
tica aut scilla laceffuntur: interna rosionem sen-  
tiūt: stomachus cum ingenti grauitate exæstuat.  
Ceterū inualefcente morbo, cruor strigmentis  
admixtus, per aluum exigitur. Quibus, vt ijs  
qui salamandram hauserunt, vomitione aut cly-  
steribus auxiliari conueniet: sed antea quā ve-  
nenum inualefcat, dandum est decoctum fron-  
dium quercus, aut glandium, aut malicorij: lac-  
tibus prodest, in quo serpyllum sit decoctum: itē  
succum sanguinalis herbe, aut ramorum vitis,  
aut rubi, aut medulle recentis ferule, aut myr-  
ti cum vino. Bacce autem myrti tuse triteque,  
& aqua macerate, vt liquor inde sumatur, o-  
pem ferunt. Media castanearum tunicula, simi-  
lem effectum præbet, si cruda in aliquo supra-  
dictorum succo sumptitetur: origanum quoque  
cum lixiuio epotum: eximiè iuuantur asinini la-  
ctis aut bubuli calidi potu, etiam si in ore conti-  
neant: ita vt quibus copia lactis huius adsit, non  
aliud desideretur.

Dor



## Dorycnium. CAP. VI.

**D**orycnium, quod aliqui manicon solanum appellant, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentes singulus ciet, humor linguam vexat: sanguis confertim reijcitur: mucoſa quedam perinde quaſi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, vomitus, clyſter, & quaecunq; potu venenu expellere poſſunt. Priuatim ijs opitulatur, aqua mulſa, lac caprillum, aut aſininum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdale amara, gallinacea peſtora decocta. Quinetiam conchyliia omnia, ta cruda qua toſta eſſe, ſalutare eſt. Conueniunt & locuſtae marine & gammari, & pota eorundem iuſcula.

## Aconitum. CAP. VII.

**A**conitu ſtatim in lingua inter bibendu, cu adſtrictione quadam dulceſcit: & ſubinde, potiſſimu cu exurgere conatur, vertigines offundit: lacrymas ciet: gravitate peſtori, & praecordijs adfert, ſimulq; crebri ſpiritus deſlantur. Quare venenu vomitione abigi, aut clyſtere per aliu egeri opus eſt. Vtimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, vel abſynthij decocto, cum vino abſynthite, vel ſemperuino, vel alrotono, vel chamaelea, aut aiuga. Prodeſt etiamnum opebaſami drachma, cum melle aut lacte, cum caſtorio, pipere, & ruta, aequis ponderibus ex vino. Coagulum hœdi, leporis, aut hinnuli cu aceto,



ferri quoque stercus, item vinum, in quo aurum, ferrum, argentumve cadens restinguatur, potum, lixiuiamque cum gallina & vino decocta, aut carniū bubularum præpinguiū iura, cum vino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

Mel Heraclia. CAP. VIII.

**M**el in Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur: quod qui edunt bibuntve, non secus affliguntur, quam qui aconitum ebiberunt. Iis eadem, quæ poto aconito conueniunt: adiuvantur in primis continuo vini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

Coriandrum. CAP. IX.

**C**oriandrum ob odorem latere non potest: epotum autem vocem exasperat, insaniam adfert, à temulentis non alhorrentem. Qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusque corporis odore, venenum fatentur. Quibus post vomitionem irino oleo concitata, uti retulimus, merum & per sese, & ex absynthio potum auxiliatur. Item oleum, nec secus ova in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur: & epota muria, & ius salsum ex gallina & anseris: passum quoque cum lixiuia sumptum.

Psyllium. CAP. X.

**P**syllion epotum, corpori toti frigoris & torporis cum exolutione & mœrore quodam adfert: ita ut animus despondeant. Cui omnia quæ exhausto coriano auxiliantur.

Cicu



**C**icuta pota vertiginem excitat, oculisq; caliginem offundit, ita vt minimum cernatur: singultus ciet, mentem turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppressio arterie spiritus, strangulantur. Quare inter initia, vt in reliquis, cicutam vomitu excutiemus: postmodum deiectione moliemur, vt quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tū demū in meracā potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus: repetendum per intervalla, in quibus proderit lac asininum, aut tubulū potui datū, aut absynthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha cum vino, aut amomi, cardamomi, aut styracis vicia, aut piperis cum semine vrtice & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo, & passum per sese largius potum proficit.

**S**milax, à quibusdam tubymalum, à Latinis taxus appellatur: frigus vniuerso corpori, strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicuta conueniunt.

**E**potus carpaci succus soporem, citāq; strangulationem adducit. Adiuvantur autem qui hauserunt, epote cicuta remedijs.

**S**ardonia ranunculi herba generi assignatur, quæ rescētibus mentem adimit, & quadam



dam neruorum disentione labia in rictū contrahit, vt risus speciem prabeant: à qua quidē affectione, de Sardonio risu adagiū in vulgus infauisto omine manauit. Post vomitū peculiariter cōuenit aqua mulsa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfacientibus: in calidā aquā oleūmq; descendant, sed tū multū perficere & inungere expedit: & in summa, curam omnem, quæ cōuulsiōni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoscyamus. CAP. XV.

**H**YOSCYAMUM potum aut comesum, similem Hebrjs ab alienationē mouet: sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asininum: si id desideratur, caprillum, vel bubulum, vel aridarum ficū decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semen ex passō sumptum, & vinum salsum cum adipe suilla recenti, passōq; itidem vrticæ semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium: & hæc singula cum vino sumantur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt, vt excoquant.

Mandragora. CAP. XVI.

**M**ANDRAGORA, si bibatur, cōfestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemēs veternus, nihil temere distans à lethargo. Cui, antequàm aliquid ex ijs accidat, vomitus & aqua mulsa proderit



proderit postea nitrum & absynthium ex vino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo et aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii, & rutæ tritorum in aceto: & liquidæ picis, et odor è lucernarū exustione & extinctu. Quod si agrè ij reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs vt conueniet.

Meconium.

CAP. XVII.

**E**Poto papaueris succo, quē meconion vocāt, consequitur veternus cum perfrictione & pruritu vehementi, ita vt saepe inualescēte veneno, tanta erumpat prurigo, vt hominem excitet. Corpus id medicamētum olet. Post citatam oleo vomitionē, acres clysteres auxiliātur, acetūmq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merū cum absynthio aut cinnamomo copiosum, aut calidū per sese acetū: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiuia aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, vino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, vel cum satioreiæ aut origani decocto, cum vino. Hi olfactilibus excitandi, & ob enatam pruriginem in balneas descēdant, & foueantur. Post lauacrū prodest iurium pinguium vsus, cum vino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. CAP. XVIII.

**Q**uod corniculatū papauer appellant, & potu, & cibo eadē inferre cōsuevit, quæ papaueris



pauperis succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum. CAP. XIX.

**Q**uod pharicon vocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem nervorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post vacuationes vinum absynthitem potui dare, cum cinnamomo, aut myrra, aut nardo gallico, quod serinen aliqui vocauerunt: aut spice nardi duos drachmas, & myrrhe totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: derasumque caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Toxicum. CAP. XX.

**T**oxicum ex eo nominari videtur, quod barbarorum sagitte eo illinebantur. Qui hiberint, labiorum & lingue inflammatione torquentur: in coercitus furor varias ijs imagines obuersat: quare vix medicine locus est: raroque, qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut vinum dulce cum rosaceo hiberere, & reuomere cogatur: rapi semen bibendum cum vino. Priuatim ijs conuenit, quinque folij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus, roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus, malaque cotonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet, amomum & balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquum vite tempus degunt.

*Ixia:*



**I**Xia, quæ vlophonō appellatur, inter potandū aliquid ecymo simile gustu & odore redolet: vehemētē linguæ inflammationē excitat: mentem mouet: omnes excrementorum exitus supprimit: strepitum cum animi deliquio ciet, ūsq; intestina latrant, nec egeritur quicquam. Post vomitionem aluūmq; resolutam, auxilium præstat aqua, in qua alsynthium maduerit, ex vino largiore, aut aceto mulso pota: rutaq; syluestris semē aut laseris radix: item tragacrigani decoctum, cū aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorū singuli oboli cōueniunt. Quin & nuces inglandes ex vino, cū resina, castorio, & ruta trite, ita vt singula drachmæ pondus æquent. Itidē chamælee aut thapsie aut alsynthi succi sicilici cum aqua mulsa, & acetum calidum potum.

## Ceruſsa. CAP. XXII.

**C**eruſsa suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiue, lingua, & commissuræ dentium, candore quodam inficiuntur: singultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat: ūs extrema frigescunt, mens labat, membra torpescunt. Quibus dare cōuenit aquam mulsam, aut ficuum, aut malue decoctum, aut lac calidū, aut sesamam ex vino tritam, vel lixiuiā ex sarmētis factam, amaricinum oleum aut irinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum thurs.



thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gūmi quod vlmus plorauit, aut humor, quem vlmēa folia reddiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoq; vomant. Conuenit etiā thapsiæ succus, aut scammonie, cum aqua mulsa potus.

Fungi.

CAP. XXIII.

**F**ingorum alij genere, alij copia ledunt: omnes tamen strangulatus suspensio similes concitant. Quibus confestim succurrendum: communiter ex oleo vomere cogendi: mirificè iuuat lixiuia ex sarmentis aut pyrastris surculis, epota cum sale, posca & nitro. Fructus, aut folia pyrastris cum fungis decocta, strangulantes illam vim auferunt, esitataq; eisdem auxiliatur. Aduersus fungos gallinacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochie drachma. item absynthium cum vino melleq; sumptum, & ex aqua potum: apiastrum ex nitro, panacis radix & semen in vino, fex vini cremata cum aqua, atramentum sutorium ex aceto, radix, vel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Gypsum.

CAP. XXIIII.

**L**apidescens gypsum stragulationem creat: quare eadem proferenda sunt, quæ mansis fungis, auxilia, & ad hæc malue decoctū, quod etiā olei vicem pēsāt, utpote cum pingue sit, euomendo lubricus vias & faciles reddit, de radīq; corpora nō sinit. Quod ubi duratur in lapidem, gypsum efficit. Quinetiam prodest oleū ex aqua mul



mulsa, aut ficorum decocto: & lixiuia è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore pota: & origanum aut thymum cū lixiuia, aut aceto, aut passo: hīque decocto malus proluendi.

Sanguis taurinus. CAP. XXV.

**T**Auri recens ingulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatūmq; concitat: faucium tonsillarūmq; meatus cum neruorū distentione præcludit, lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quedam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitū vitabimus: sanguinis enim globi attractu illo in sublime relati, magis gule inculcātur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiant & aluum subducūt. Grossi lacteo succo turgentes ex posca, & nitrum per sese, auxiliantur: nec secus coagulum omne cum aceto & laserpitij radice, aut lasere: itidem & brassicæ semen, & è cinere ficulneo lixiuia: conyxæ folia cum pipere, & rubi succus ex aceto. Aluus resoluēda: Is qui seruatur, stercorosa & fluida per sedē egeri consueuerunt. Stomachum aluūmq; hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

Lac coagulatum. CAP. XXVI.

**E**Os, qui coagulatum lac hauserant, frequēs illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus inuādīs pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sæpius cogimus. Damus & calaminthæ folia ari-

K.



da, item succum, aut laserpitij radicem, aut laser cum posca: thymumq; ex vino. & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla falsilago obijciatur, quoniam magis lac coiret, & in caseum densaretur. Neq; illos vomere conuenit: siquidem concretum lac sese in gula angustias insinuans, strangulat.

Argenti spuma. CAP. XXVII.

**S**puma argenti pota, stomacho, ventri, & interaneis grauitatē cum magnis torminibus adfert, & nonnunquā pondere suo intestina vulnerat, vrinamq; supprimit: corpus intumet, plumbeamq; deformitatē cōcipit. Quibus subuenit secundum vomitionē, potū syluestris hominis semen, myrrhæ drachmæ octo, absynthiū, hyssopum, apy semen, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum palumbis fimum, cum nardo et vino.

Argentum viuum. CAP. XXVIII.

**A**rgentum viuum potū, eadem quæ spuma argenti infert, eisdemq; utendū auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat: sed postea euomant, qui hauserunt.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

CAP. XXIX.

**C**alx, Sandaracha, et Auripigmentum, pota aluum & intestina cum vehemēti erosionē excruciant. Præbenda cuncta quæ suo admistu illorū acrimoniā hebetāt, ac soluūt, & facilem lubricamq; aluū reddunt, cuiusmodi iustici & maluæ succus est: natura enim utriq; perlubric



brica. Dandum decoctum seminis lini, vel semen tragiherbe, vel oryze, lacq; cum aqua mulsifica copiosum, iura pingua, & boni succi.

Lepus marinus.

CAP. XXX.

**Q**ui leporem marinum biberunt, piscium virus olent: procedente tempore, alius dolore afficitur, & urina sistitur: & si quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. Omne piscis genus auersantur, & odio habent: fatido ac graui sudore manant: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asinirum, vel passum continue, aut radicis malue foliorumq; decoctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri, aut scammonii succi drachma, cum aqua mulsifica, puniciq; mali acinis. Cedria cum vino efficax est: anserinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernenturq; solis fluuiatilibus cancris vesci possunt, bibuntq; eos admisto vino, adiutiq; ab his percoquant. Cumq; appetere & comesse pisce ceperint, sue salutis indicium habent.

Rubeta & palustris rana.

CAP.

XXXI.

**R**ubeta aut rana palustris assumpta tumores ciet: pallor corpus vehementer decolorat, ut plane baxeum spectetur: spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusq; et inuita interdum genitura profusio consequitur. Ad-

K 2



iuuantur secundum vomitionē multo meri potu,  
 & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi  
 rotidē. Breuiter, cogendi sunt vt vehementi am-  
 bulationi & cursui se credant, ob torporem quo  
 corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Hirudo. CAP. XXXII.

**D**Euorate cum aqua hirudines, si ori ventri-  
 culi adherent, tractione partium, nonnul-  
 lam suctionis imaginem præbent: eo enim argu-  
 mento hausta hirudo deprehenditur. Has muria  
 sorbitione excutit, & cyrenaicus succus, aut la-  
 serpitij folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis  
 glebula, cum posca. Nitrum ex aqua gargariza-  
 tur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si  
 faucibus hæreant, iniecta lupinorū farina, aqua  
 frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exi-  
 lient. Prouidendum etiam ijs, quæ et si ferendi au-  
 xilij gratia tradantur, non minora tamē ceteris  
 venenis pericula sæpius adferūt. Qualia sunt al-  
 bum veratri, thapsia, elateriū, agaricū nigrum:  
 siquidem ea strangulatus concitāt, aut immodi-  
 cas deiectiones mouēt. Quibus ea medentur, quæ  
 in fungorum mentione & similibus retulimus.  
 Nimias autem deiectionum impetus, medicamē-  
 tis, quæ excrementa supprimūt, coërcetimus. Ne-  
 que negligenda quæ parū quidē nocere vidētur:  
 interim verò vitā in discrimina agūt. Quo in nu-  
 mero sunt syluestris ruta, gith, nouæ glacies, papi-  
 recentes: flores autē sunt eius spine, quæ cætos di-  
 citur.



itur. Eos, qui sumpserint, sola vomitio recreat.

Domestica nobis. CAP. XXXIII.

**A** Qua frigida abundè pota, aut meracum vinum liberalius epotum, aut passum, praesertim à balneo, aut cursu, aut vehemèti exercitatione, strangulatus & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & vacuatio, imminèntia soluunt pericula. Sed de notis veneficio rû, ac remedijs, & cauèdi modo, haëtenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclarè auxiliantur, quibus vtimur, quæle Mithridatium est, præsertim & quod sanguine, & quod scincotemperatur. Verùm quoniam alijs in locis diligētissimè scripta sunt, hîc ab eorum descriptione supersedemus.

Venenata. CAP. XXXIIII.

**D**E bestijs, quæ virus eiaculatur, & exitialibus venenis, idèò scribere aggredimur, vt tota curationis remediôrûmq; ratio ad vmbilicû perducatur: siquidem pars hæc non minus quàm ceteræ aliæ, necessaria est ijs, qui artem medicam exercent, vtpote cum adminiculo eorû, quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimîsq; alijs malis homines lilerari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris virus inspuentibus sermo disserit, Theriacus dici solet: qui verò de amoliendis veneficijs, Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ



sequi signa consueverūt, præmonstrabimus: tum  
quæ nonnihil auxiliij ferunt. Omnia autem in  
promptu, & ad manum habere artificē oportet,  
propter urgentē sæpenumero necessitatē: siquidē  
paucæ venenis & virulētis animatibus, tarda  
& grassantia sensim pericula cient, ita ut dila-  
tionē admittāt: pleraq; verò præsentaneam per-  
niciem afferunt. Hominum autem partim malè  
alijs cogitantes, ingenita prauitate maleficium  
ita tēperant, ut spatiū curanti liberū non relin-  
quant; partim sceleris admissi conscientia, aut  
trīsti aliquo euentu oppressi, hausto spontē ve-  
meno, mortem sibi cōsciscere conantur. Qui post-  
ea deprehensi, aut resipientes, & vitæ cupidi,  
præsentaneam opem pescunt. Non desunt, qui ho-  
stiles sagittas illinentes, aut fontes aquasq; pu-  
teas hac labe polluentes, certam & inevitabi-  
lem aduersarijs perniciem moluntur. In quibus  
ipsis etsi maleficium non subitò, sed aliquantò  
post grassari natura sua comparatum est, tamen  
nisi primò quoq; tēpore coërceatur, & remedijs  
subinde excipiat, frustra tandem succurritur,  
occupatis iam corporibus exitiali vi veneni.  
Præinde nō vulgari industria diligentiaq; in ea  
re utendum est, ut quod in alijs incomodis ars cō-  
suevit, in his quoq; salutem mortalibus præbeat.  
Quin & apud priscos genus hoc unū existima-  
batur esse eius partis, quæ medicamentis pugnat:  
sed recentiores id ipsum discreuerūt, nominātes  
præ



præcautionem, & modum præcauentem, salubris  
sanantisq; medium statuens, parua & leui si-  
pra modum persuasione decepti. Siquidem treis  
in humanis corporibus constitutiones esse contē-  
dunt: vnā, qua sani degimus: alterā, qua sini-  
stra valetudine corpora laborant: tertiam, quæ  
medium inter vtrasq; locū sibi vendicat. In qua  
positi, sanitatem specie mentiuntur, facileq; in  
morbos & pericula concidunt, ob vim corruptri-  
cem, quæ corporibus nostris incumbit: quemad-  
modum in ijs videre licet, quos ex candescens ra-  
bie canis memorderit, necdum tamē aquam hor-  
rent. In ijs quoq; qui cantharidas hauserūt, sed  
nondum vrine tormento cruciantur. Tripartitō  
igitur artem digerit, triplici quæ corporis consti-  
tutioni meritō respondere trahunt. Salubrē par-  
tem esse volunt, quæ sanitatem tuetur: præca-  
uentem, eandēq; prohibentem, quæ obstat quō  
minus in morbos incidant: & sanantem, qua vi-  
tia discutiuntur. Quibus ita responderi potest,  
quod primum ex ista ratiocinatione non tres  
corporis tantū, sed quatuor haberi cōstitutio-  
nes fatendum esset: quippe vt aliqui sunt, qui  
necdum morbo laborāt, morbo tamē maxime ob-  
impedentem causam sunt obnoxij: ita sunt, qui  
iam priore morbo defuncti, nōdum tamē secūda  
valetudini restituti sunt: id quod in ijs, qui a  
morbo proximē sese recolligunt, cernere licet, qui  
viriū recreationē & robur desiderant. Sed quæ-



admodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionem eidem subijci par est. Ad arcendas enim valetudines vehementibus utimur auxilijs, altiore sacrificatu, vstionibus, amputatione, derodētibus epithematis, portionibus pernicipi occurrētibus, & plerisq; alijs. Verum enim vero sunt vsque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem appellēt, quæ morbos arceāt. Cuius sententiae inire rationem haud promptum est: etenim cū verbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliarē remediariāmq; vim præse ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectūtur, qui in pestilentis cæli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obseruantis aëris occasionem, opportuni, & in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcendorum morborum rationem: quippe cū firma reddere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, ut inoffensa valetudine degant, nec morbis conflictentur. Neque id silentio prætereundum, quod maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere: sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus, qui à virulentis  
anim



animalibus venenisq; contrahuntur, vocari cæcos, id est, quæ ratio minimè iniri potest. Quin & ea, quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causæ: quapropter quæstionibus obseruatorie artis, & eius, quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neque prorsus verum apprehenditur, affectus huiusmodi cacos esse. Nam quod semper se protrahit, & nullum in quibusdam necessarijs vsum exhibet, haud facili coniectura colligi potest: etsi naturæ proprietate prorsus cacos eos affectus concedimus, qui ab exitialibus venenis, & animantibus, quæ virulento morsu seuiunt, contrahuntur. Nam quod ad opus nonnullum vsum præbet, datque medendi occasionem, neque imperceptibile, neque cæcum, nulli velle causæ obnoxium reputatur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm vt sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsis inter se collatis apprehenduntur. Diocles autem in eo commentario quem Plîstarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad verbum ita scribens: Nosse quis hoc potest cum in alijs non paucis, tum in viperis, & scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans, vt quamuis exiguo sint corpore, vixq; conspectui subijciantur, magnorum tamẽ discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter quædam corporis exiguitatem,



vimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ à scorpj ictu, & aliorum id genus venenatorum, quæ nos morsu cõficiunt, attingitur? quorum aliqua vehementes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec desunt quæ presentaneam perniciem moliantur. Aut quâturnum est quod à phalangj morsu ingeritur, & uniuersum corpus excruciat? neq; enim quis magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum prorsus exigua mole cõstent. Ergo quid hæc ad affectus referatur, constitit inter omnes. Verum quod exacte deprehensum sit, vim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ insinuata corporibus molestiarum, quæ exoriuntur, nobis causa sit, in confesso est, & omniũ cõsensu persuasum. Nec quisquam inuenietur vsque ad eò contentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias assueveret, quàm à materia mortifera parte corporis attingente. Porro id erat, quod inter vtilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quenam res opus hoc efficiat, vt nihil prorsus nos ledat, incomprehensa communis causæ, quæ proprijs inest ratio: quandoquidẽ tum euidenter indicari possit cum deprehensa est. Ideò Erasistratus empiricorum pertinaciam graui canillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, inficiatus his communem, & supremam morborum causam incomprehensibilem esse: & hanc in eo, quem de causis  
scrip



scripsit commentario aptissime prodidit, candido  
 signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit,  
 qui se dicant in quibusdam, ut in venenis, serpen-  
 tium ictibus, & ceteris id genus trita medendi  
 ratione contentos esse. Neque satisfacturam sibi  
 observationem eam, quæ à causarum comprihen-  
 sione separata est. Primum enim genere compre-  
 hendi facile possunt. Quod autem sit lethifera vis,  
 corporaque permutans, ita ut perimat, ex ijs, quæ  
 per genus, non per speciem vagantur, curatio-  
 nem indicat, quæ hæc hebetare, & prorsus expu-  
 gnare liceat. Cum verò subiungit: Ad aquam dul-  
 cem, & potui idoneam venit quis, & ante obser-  
 uationem ad vomitum, ad vulneris dilatationem,  
 ad demorsa partis suclum, cucurbitulas adfixit,  
 partem incidit, vrètia medicamenta, aut ea quæ  
 vim eandem adipiscuntur admouit, postremo par-  
 tem amputauit: secum reputauit medicamina,  
 quæ per summam cutim ferre, & applicari solita,  
 immissa ad intima pernicipi repugnarent. Hæc  
 itaque quæ disseruit Erasistratus, veritati consen-  
 tanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos  
 demirari licet, qui mortiferam vim corporibus  
 illapsam negotiorum, quæ ipsa facessit, esse cau-  
 sam diffiteantur, verum rudiusculè nomini at-  
 tendunt. Nam apud ipsos palam immissa vis φθο-  
 ροποιός, id est mortifera, nominatur: φθοροποιός  
 autem nullius officij alius esse potest, quam cau-  
 se. Aiunt hæc nomina, μάστιγος, & ἀνα-  
 λείψ



αλύπειρ, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quadam dictionum non pro virtute, sed nuda enuntiatione comprehenduntur. Enimvero quemadmodum in his vocibus μάστιγ & ἀνὰ κλύπειρ, partes neq; certos, neq; principes retinent significatus: sic in hoc verbo φθοροποιίη partes productionis gratia, non pro virtute, coaluerūt. Hinc ad causarum differentias trāseunt, affirmantq; causarum aliquas euidentē esse, quæ dum aduersam valetudinem creant, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postquam morbum excitarūt, hoc est, quibus presentibus, & effectus eorum adsunt: incrementibus, effectus augentur: decrementibus, minuuntur: & cum desinunt, eodem finiuntur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropœon subijci potest. Evidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur, Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hæc adsit: quæadmodum accidit ijs, qui à rabioso cane sunt demorsi. Quod si neque evidens causa, neque continens fuerit, neque per se, neq; alterius consortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phthoropœon deducere possumus, consequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod aut



autem asserunt, vocabula quædam in se non habere partis rerum significatrices, sed nuda, & simplici pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia, sed per pauca talem nancisci conditionem existimandum est: neque enim τοις in hoc nomine φθορα τοις perinde atque assumptitia profertur, sed longè principem obtinet significationem. Quemadmodum enim φθορα, id est corruptionis nomen mutationem in peius significat, si hoc verbum τοις sumi debet, ut nihil amplius ex eo quod hanc dictionem φθορα secum habeat, declaret: neque prorsus id significat, quod omnes palàm audiunt, & huic simile redditur, καὶ δὲ χερσὶν αἰτῶν. Si dant à corruptione sanis fieri morbum, concedunt utique vim in huiusmodi verbo τοις subesse, siquidem aliquid est quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas, quæ corporibus subiiciuntur, idq; tam in lethalibus venenis, quàm in iis, quæ corporibus ingeruntur. Verum non nihil subiacere causarum differentiis produnt. Quinetiam aberrarunt, non exactam diuisionem assumentes. Qui verò se dogmaticos profitentur, causam esse partim præparantem, partim continentem asserunt: ut inguinis vlcus, & inguinaria febris, & quæ effectui suo assistat, tum etiam separatur, ut à fractis precipitatio. In summa, quoties quidpià suapte natura causa fuerit, nec vlla diuisione comprehenditur.

vit



vitiosum est, neq; causæ adscribitur, eorum quæ  
idem genus sortiuntur. Sed quod phthoropæon  
causa sit, nomen ipsum argumento est, & in ijs  
quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud  
causæ arbitrantur esse post impressum à serpen-  
tibus ictum, quàm ex animæ vim, & illapsum  
in corpora virus? Neq; enim frigus, neq; æstus,  
neq; sectionem corporis, neq; cruditatem, neque  
aliud quicquam simile causari possunt. Verum  
quoniam causarum differentijs gaudent, & ali-  
quæ continent, alias evidentes appellant: ipsis  
dicendum, utroq; istorum modorum evidentem  
quidem causam esse, quod effectum præcedit, &  
quod corporis substantiam præoccupat: cōtinen-  
tem verò, quod morbis presentibus adest, qua se-  
parata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed  
de ijs hæcenus. Statuendum itaq; mortiferā vim  
intrinsecus manifestissimā esse causam, ipsāmq;  
principem facere scopum oportet. Et antequam  
ad ima decumbant morbi, varijs modis est cer-  
tandum, donec vis tota corporibus excutiat.  
Modo enim reuocari debet ea parte, qua pestis  
intrauerit: modo aliqua alia, præsertim princi-  
patū non obtinēte, antè coërceatur, quàm alius  
irrepens viscera tangat: aut eius pernicies elua-  
tur, retūdaturq;: cū iam membratim peruaga-  
tura est. Itaq; venena si hausta sunt, crebris vo-  
mitionibus: si mersu impressa, scarificatione, af-  
fixis cucurbitulis, exuctu, cornis circumscrip-  
tione,



ne, nonnunquam amputatione extremæ partis, euocantur. Retinentur verò infusione, & imposito medicamentorum acriū cōhibētur. Hæc simul vtiq; arcere virus, & eluere possunt. Restinguuntur, et euincuntur meraciore potu, aut passo nulla aqua diluto, vel contrariorū esu, quæ acrimonia sunt prædita. Postremò deiectio alui, euocatus sudor, & alia quædam in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enim uero nō lethiferam modò materiã, sed & magnitudinē, & tēpus, pro scopo considerare oportet. Etenim ab ijs remedia quàm plurimum discrimen capeßunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus pericula minatur: alia putredines altas aut exteriores excitant: alia vehementissimos dolores aut cecos cient: alia vix medicamentis cedunt, & magis minusve molestias excitāt. Oportet autē ea, quæ pericula ferunt, peruicacioribus auxilijs expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus medicamentis homines in discrimen adducere: in minoribus verò, vehementiū auxiliorū iniuria corpus laceßere. Finitio à tēporibus in promptu est. hoc enim subito in pericula, & præsentēs molestias adducit: illud verò sensim, & dilatas in diem longam aut breuiorem producit. Itaq; in acutis quidem cōfessim multa simul auxilia representari oportet: reliquis paulatim. Hæc quædam



dam artis formula breuiter definita sint. Iam membratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorsorum  
ab eo. CAP. XXXV.

**D**E rabiosi canis morſu ſermonem alijs præpoſuimus, quòd id animal domeſticum ac frequens eſſe conſuevit, & in rabiem ſæpius agitur, ac perit, ab eoque cauere difficile: inde periculum inuitabile hominem manet, niſi multis utatur auxilijs. Canis plerunq; flagrantiffimis æſtibus in rabiem efferatur: interdum quoties frigora inceſſerunt. Rabioſus autem potum, & eſcam auerſatur largam ſpumatèmq; pituitam naribus, & ore proycit: toruè & ſolito triſtius intuetur: in omnes paſſim ſine latratu irruit, & equè feras hominèſq; tã familiares, quàm ignotos mordet: nec protinus infeſtum quicquã infligit, niſi, ut vulnus, dolorem: exindè morbus ille, qui ab aque metu hydrobolicus Graia eſt voce appellatus, contrahitur. Euenit autem cū diſtentione neruorum, totiùſque corporis rubore, præſertim faciei, cum ſudore, & languore quodam. Aliqui aure ſplendorem fugiunt: alijs ſine vlla doloris intercapedine vexantur: Sunt etiam, qui canum more latratuſ edant, & obuiam factos morſu aderiuntur, ac mordendo ſimili vitio labe factat. Proinde ex ijs, qui hoc vitium ſenſerint, neminem ſeruatum vidimus, niſi forſitan ex hiberia vnũ aut alterum euafiſſe audiamus: ſiquẽ  
dema.



dem Eudemus superasse quēdam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorem incidisse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officiū exhiberet, quadam naturarum concordia similē contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo multos, antequam ipsam experirentur, vindicauimus: & complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorforum à cane rabioso.

## CAP. XXXVI.

**R**atio medendi duplex: vna cōmunis, qua vtendum in omnes morsus, quos virulente animantes impresserunt: alia peculiaris priuataq; eorū dītaxat, quos rabiosi canes momorderint: quæ nōnullis quidē summā opem ferre cōsuevit: alijs verò inutilis, maximè qui ex multo iā tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primū exponemus, deīnde cursim perstringemus, quæ ad cōmunem medendi rationem pertinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarmentis albe vitis cremare oportet, & cinerem eorū quā minutissimè tritum habere reconditum: itidem gentianæ radicē tufam cribratāque reponere. Quoties autē canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci vini, bina cineris cancrorū cochlearia, vnūmq; gentianæ cōiiciantur: hæc in polentæ dilutioris modum subacta, quatri-

L



duo bibantur. Inter principia medicamentis hoc modo detur. At qui si ab illato morfu bini ternisve dies fluxerint, curatione auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimū hoc aduersus rabiosorum morsus auxiliū, quod & plerisque vnum satisfecit, eoque cū fiducia vti licet. Sed vt alijs etiamnum auxilijs contra inenitabile periculum muniamur, nihil ceteris vti prohibet. Satius autem multo fuerit etiam si in vanum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam ac diffidia in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora vulnera vereri oportet, vti minora, & vlcusculis cutis similia: quippe maiori vulnere cōsertim copiosus sanguis emanans, potest nō nihil virulenti liquoris exaurire: quod in minoribus nō accidit: quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalPELLI circumscribere, & prebescam hamulo aut vulsella carnē amputare oportet. In vtrisque circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, vt copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venonū mēbratim insinuetur. Cucurbitula cū multa flāma agglutinata id inuamēti pręstāt, vt venenis vis extrahatur. Contra virulentos ictus, vltio expeditissimum est auxiliū, vtpote cū ignis cetera viribus pręstet, simul quodd virus domet, & ferri penitus non patiatur: simul quodd pars ignem experta, postea non vulgare fundamēta.



mentum curationi futura præbeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendū ex eo tempore cum crusta decident, ne vlceris ora coalescant, & cicatrice induantur: sed si fieri potest ad multum, idq; præstitutum tempus, vlcerationes & sordidas adhuc & inflammationē minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè præstat, & syluestre allium detritum: item cape, succūsque præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa, quàm non mansa imponantur: siquidem subacta pistave à perfusione vulnera dilatāt. Sunt qui à mandentiū ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat: verū id certum non est. Ceterū tempestiuus eorum vsus minimè est contemnendus. Si verò, quod persæpe accidit, ante dies præfixitos cicatrices coirent, committerenturque, manum postulabunt: nanque eas diducere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inurere, expedit. Vbi verò propositum tempus præterit, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus: nec multò post sinapismo vtendum.

Ratio victus in morbo rabiosi canis.

## CAP. XXXVII.

**Q**ua ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Ceterū victus rationem ex ijs quæ veneno aduersantur, conie-



Etura quadam colligere oportet, simul ut veneni vires hebetet restinguatque simul ut arceat, quò minus ad intima perniciēs illabatur. Etenim assumpta, perniciosarum virium penetrationi resistunt. Quorū utrunq; præstare potest vini meracioris, passi, & lactis potus: quippe qui hæc omnia capiūt ad curā, nonnihil veneno obijciūt, quod omnē eius acrimoniā obtundat. Simili modo alliorum, porrorū, ceparūque cibis: quòd ea difficulter conficiantur, vixq; aboleantur. Nam multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tēpore nec euincuntur, nec permutantur à mortifera vi, sed contrarijs illa vis expugnatur. Cui rei antidotorū vsus accommodatur, & theriaces. Mithridatij, & eius, quod eupatorio tēperatur. Denique omnium, quæ magnam aromatiū partem sibi vendicant: quippe aromata omnia viribus & substantijs agrè permutantur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hæc modo se habet: Nosse cōuenit, pauorē aquæ nō stato definitōque tēpore exoriri: plurimū tamen ad quadragesimum vsq; diem neglectis differri cōsuevit. Post semestre etiam nonnullos inuadit: quendam post annum aquam horruisse constat. Quæ nobis visu comperta fuere. Narrant & aliquos post septenniū aquæ metu fuisse tētatos. Inter principia demorsorū à cane rabiosa curandi ratio talis est. Verum enim uero si ea, quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalpro carnē

cir



circinare, nec vñtionem experiri operæpretium est. Non enim quod iam pertransiit, satis euocare possent. Nulla utique istius rei occasio aut utilitas, sed in cassum corpora doloribus sternantur. Alter verò curationis modus accedat. Deiectione magnū præbet iuuamentū, ut pote cū mouēdo, corporis habitū transmutet: & quæ colocynthidē recipit hiera. Itē lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & venenum domare possit. Cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Ceterū sudores ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi sinapismi que alternatim per corpus totū adijciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus uti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidē, qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iā vitio tentatos nemo unquā seruare potest. Itaque primū curam contra rabio si canis morsus breui sermone exposuimus: iam ad alia, quæ venenatis morsibus scuire consueuerunt, transeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus cōuenire possit, explicabimus. Cursim deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxi-



lium præstare possunt. Postremò subnectentur etiam venenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Notæ eorum, qui à venenatis demorsi sunt. CAP. XXXVIII.

**D**Emorsis à phalangijs locus quidem ipse, quasi ab impacto aculeo rubet, nō intumescens, nec per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit: vbi verò contrariorum occursum refrigit, consequitur corpore toto tremor, distentiones poplitum & inguinū. convulsionibus nō dissimiles. In lumbis collectio exoritur, & perpetua urine libido laceffit, multaq; reddendis excrementis colluctatio. Vniuersa cute frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offusisq; nebulis caligant. Si scolopendra aut dicta ophioctene, morsum intulit, locus per ambitum liuore sugillatur, & computrescit: interdūmq; licet rarò, feculentus atque ruber cernitur. A morsu ipso exulcerari locus incipit, vlcusq; id negotium exhibet, ferè remedijs inuictum: præterea toto corpore prurigo sentitur. Scorpionis morsu inflammari statim incipit locus, & indurescit, ac intensus rubet, vicissimq; dolore premitur. Modo siquidem exæstuat, modo frigore occupatur. Labor repentiè fatigat, & aliquando meliusculè habet, aliquando verò recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigescunt, inguina extolluntur, per sedē flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor membra



bra decolorat & dolor, tanquam ex pungente  
acu, per vniuersam cutem sentitur. Si marina  
pastinaca percussit, protinus accidunt molesti  
dolores, assidue conuulsiones, lassitudo, & im-  
becillitas. Mens percussis labat, postea obmutes-  
cunt: oculi caligant. Percussus autem locus in  
ambitu cum vicinis partibus denigratur, & ita  
obstupescit, vt tangentem non sentiat. Hunc si  
quis premat, atra sanies, crassa et mali oles ex-  
cernitur. A mure araneo percussis, circa mor-  
sum in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pu-  
stula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ par-  
tes liuent. Rupta pustula, depiscens vlcus, nec  
ei dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum  
quoq; tormina, difficultas vrinae, et frigide asper-  
ginis offusio consequuntur. Si vipera memori-  
dit, corpus intumet, vehementer arefcit, subal-  
bidumque colorem concipit. Sanies à vulnere pro-  
funditur, primum suppinguis, mox cruenta: pu-  
stule adustis similes erumpunt: & antea depa-  
scens vlcus, quod in proxima repens, nō summa  
modo corporis, sed intima quoque corripit: gingi-  
uæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa  
iecur crumpit: tormina & bilis vomitus sequū-  
tur. Sopor, tremor, & vrinae difficultas accedit,  
& frigidus sudor offunditur. Consimilia eue-  
niunt ijs, qui à cecilia nemine, aut amphibena  
demorsi sunt, eadēq; ferè auxiliantur: quare  
hoc venerū priuatā descriptionē sortitum nō est,



neque visum est dignum quod alio genere cōprehendatur. A dryino morsis pustula molestiq; dolores incidunt, præsertim quā diluta saniei emissarium subest: quinetiam erosio, torminaq; consequuntur. Ab hæmorrhoo ictis vehementes cruciatus accidunt, qui angustā cōtractaq; corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus cruor effluit, & quacunque parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eijciuntur, profluēsq; sanguis in globos coit. A pulmone sanguinē extusunt, & in vomitiones effusi sine remedio commoriuntur. Quos dipsas percussit, solutus ac non cōstrictus tumor premit, sitisq; usque eò pertinax, vt satiari nō possit, ac sine vlla intercapidine excruciet: etsi potum pleno ore affatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint. Quare propter continuā sitim, & præster, & causon, aut dipsas appellatur. Ab natrice demorsis vlcus dilatatur, & liuidū ac ingens exadit. Sanies ex eo multa, & atra, & malè olens, non secus atque ijs, quæ serpunt vlceribus, expuitur. Cenchri morsum, qui viperino ictui similis est, putridum vlcus sequitur. Carnes antea, vt in aqua inter cutem, prætumide, defluūt. Lethargo corripuntur, & veterno pressi somnos captant. Erasistratus eos iocinare, iustino ieiuno, colóq; conflictari author est. Quippe  
dis



dissectis ipsis, omnes ferè partes corrupta reperiuntur. A cerasæ percussis locus attollitur, cum duritia pustulosus. E plaga sanies profluit, modò atra, modò pallidior: sed toto concretu varicosus intumescit: genitale intenditur: mens labat, & calor caligo exoritur: denique rigore nervorum distenti commoriuntur. Ab aspide ictis vulnus exiguum prorsus, quasi ab adaucta acu citra tumorem cōspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino levis, & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit: At vir perit absque labore, virēs atque discolor. Mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellit: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillēt. Hos mors tollit, ad diei trientē non dilata. Erasistratus in libro, quem de medicaminibus & venenis cōdidit, de vocato basilisco scitè ita refert, Cū basiliscus momorderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis, quæ virus eiaculantur, comites notæ ita se habent. Transeuntes utique ad mēdendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

Communis curatio in omnes ictus virulentos. CAP. XXXIX.

**A**Duersus quidē omnē animalis ictum, quod venenū vibrat, oris suctio cōuenit. Sugentem verò oportet ieiunum nō esse, sed & ci-

L 5



bum sumpsisse, & vino os abluisse: postea exiguum olei in ore continens plagam exugat. Locus ipse spongia fouendus, deinde scarificandus: sed vlcuscula alius imprimere expedit, quo virus sa materies profundo euocetur. Circinatio autem carnis, & sectio, scarificatione longè potentius opitulantur: nanque ab ijs duo peculiaria praesidia fiunt. Vnum, quod virus è loco tollitur. Alterum, quod eius veneni pars, quæ ad interiora grassatur, cum multo copiosoque sanguine excernitur. Quod si locus sectionem non admittat, cucurbitula cum largiori flamma adfigenda sunt. Sed iam de vstione supra in rabiosorum morsu disseruimus. Si verò icta pars, ut pote extrema, eam sectionem commodè non respuat, praesertim in omnibus serpentium ictibus, ut aspidis, cerasæ, similiūmq; preculdubio amputanda est. Cōuenientiora supra dictis auxilia sunt, quæ epithemata vocāt. Imponatur sarmētitijs cinis, aut ficulnus, cū lixiuio stillatitio subactus, garo, & acrisalsamento: porri, cepe, & allia modo minutissimè cōtrita illinūtur, modo cremata vulneribus iniiciuntur. Quinetiam dissecti gallinarum pulli, cū maximè tepent, percusso loco applicentur. Nec desunt qui hisce tanquam discordia quadā naturali pugnantibus utantur: verū huius rationem inire facillimū fuerit. Gallinae enim calida natura praeditæ sunt argumēto, quod deuoratum insigni virus cōficiūt, & aridissima quæq; semina cōsumunt.



sumant, item nonnunquā arenas lapilloſq; inglu-  
ue ſua deuoratos, diſſoluūt. Itaque animātis ad-  
moti calore adiutus ſpiritus, ab iſta parte impe-  
tum capeſcens exiliensq; ſecum venenum exigit.  
Nec me fugit quid in Aegypto fieri ſoleat. Cū  
ſpicas Aegyptij metunt, ollam picis paratam ha-  
bēt, & appenſam faſciam: tūc enim maximè ſer-  
pentium iniurias expaueſcunt, tū propter ſpici-  
legij tempus, tum quòd opacis ſimul abdite ſpelū  
cis & cauernis, denſoque aruorum caſpite deli-  
teſcunt. Moleſtiſſima enim animalia & virus  
eruſtantia, Aegyptus in campis ferre conſueuit.  
Vbi ergo aut in pedem aut partem aliam, mor-  
ſum intulerunt, qui adſunt, faſciam in ollā picis  
coniiciunt, & ſemel aut iterum brachium aut  
crus paulū ſupra vulnus obligant, & artēſi-  
mè duo è præſentibus diſtringūt, locūmq; ſecan-  
tes, qua circumactus eſt laqueus, picem inſtil-  
lant. Cūque ſatis vulnus excepisse videtur, la-  
queum reſoluunt, & capis alijsq; ſuprà memora-  
tis illiniunt. Præterea pix liquida cum ſale trito  
& feruēte illita, præſentaneo eſt auxilio, ſi iugi-  
ter innouetur: Conuenit & cedria, & ſinum ca-  
prarū ex vino decoctū. Locum aceto calido, ca-  
lamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria  
decocta, foueri ſalutare eſt. Quinetiā non deſunt  
emplaſtra vehementiſſima, & calidiſſima, que  
venenū elicere, expugnare, & diſcutere poſſunt  
Quiuſmodi ſunt que ex ſale, aut nitro, ſinapi, &  
cacly



eachrye componuntur : de quibus consequenter  
erit tractandum. Erasistratus autē non iniusta  
reprehensione eos incesit, qui incognitas ad hunc  
vsum facultates conscripserunt, vt elephantī fel  
crocodilī ve sanguinem, ouaq; testudinis, & con-  
similia. Nam cum iuuantia quaedam literis tradi  
disse videntur, planē in hac sola incidentibus im-  
posuerunt. Quare talia deuītanda sunt, cum dif-  
ficilē, nisi regia facultate, peruestigari possint:  
neque, quō nostra fides ijs obstringatur, fre-  
quēti obseruatione, sufficiens experientiū prae-  
stiterint. Quae autem ad cōmunem omniū vsum  
pertinent, quaeq; facile suppeditari, & omnibus à  
serpente percussis auxilium ferre quouunt, subiun-  
genda videtur. Intubus itaq; & erica, & astrag-  
alus, cum aceto pota, contra omnes serpentium  
morsus auxiliantur. Item bitumē, & virētes pla-  
tani pilule in vino diluto coctae, & paliuri deco-  
ctum: radix aristolochiae, & eryngij: decoctae etiā  
lauri baccae & deuorate, pipēque largius esita-  
tum, ruta, anethum, & cyclaminus: coma porro-  
rum priuatim ex pane, aut allium, aut caepe, sal-  
samentaque quā acerrima: origani decoctum  
cum vino potum, fœniculi, pulegij, calamin-  
the, porrorūque succus cum melle desorptus.  
Hec quidem à plantis conquiruntur. Ab animā-  
tibus verò quaedam vtiliter peti solent: gallina-  
ceorum cerebella in cibo, leporinum coagulum  
cum vino, itidem castorij sextans: testes mari-

ne



na testudinis sumpti multum prodesse traduntur: mustella sale inueterata inter auxiliorum medicamenta est. Comendatur in primis exenterata, quae sale siccescens inueteratur: ex qua binas drachmas cum vino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quae dari solent, haec tenus. Percussis à serpente prodest alui deiection, diffluens sudor, vrina copiose reddita. Sunt & compositae quaedam potiones, quae mira remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhe singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiae fabae dantur cum vino. Itidem sylvestris rutae seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiae, galbani, singulorum pares portiones tritae, & cum eruce succo subactae, digeruntur in pastillos, qui drachmae pondus equent: dantur ex iis terni cyathi cum vino. Haec habui de communibus auxiliis quae dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias, quae venena vibrant, consequenter est dicendum.

Peculiariora remedia virulentorum  
ictuum. CAP XL.

**I**Nter ferientium venenatorum notas nihil de vespis & apibus articulatum digessimus, quod conspicuae omnibus forent, & nihil excellens aut notatu dignum in his obseruaretur: inter remedia tamen, earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus utrarumque ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficul-  
neum



neum lac in vulnus instillatū, à muria, aut maris aqua fatus. Phalangiorum ictibus ficulneum cinerē, adiecto sale trito, & vino, imponere oportet, aut radicē sylvestris punice quā tenuissimē tritam, aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactam. Ulcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto, foliaq; eiusdē illinenda. Lavacris perpetim utendum, & propinandum abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminum Aethiopicum, cedrides tritas, platani corticem, & trifolia herbæ semen: privatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum vini hemina convenit. Item myricæ fructus & chamæpitios, & viridium cupressi pilulariū decoctū, admisto vino. Sunt qui fluvialis canceri expressi succum, cū lacte, assumpto apū semine, confestim molestiis liberare prodant. Si scolopendra morsum infixit, sal quā leuissimē tritus ex aceto vulnere inspargendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locus acida muria fovendus, & danda in poti aristolochia cū vino, aut serpyllū, aut calamintha, aut ruta sylvestris. Percussis à scorpione, presenti est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatum. Scorpium ipse, qui ictum vibravit, tritus, & percusso loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob cecanū quandam naturarum (ut cōstat) discordiam, quæ antipathia appellatur. Præterea tritus & impositus cum sale, lini semine, & althæa, scorpium convenit. Sulphur

ignem



ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & emplāstri modo adiectum auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formā ductum, & calamintha, que trita illinatur, & farina hordei in vino parata, in decocto rute. Semen trifolice herbe tritū, & vulnere iniectū opitalatur. Hec ad affectum locū pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus vtendū, cuiusmodi sunt aristolochie, præsertim corticis linæ drachmæ cum vino, tusa gentiana, & pulegiū decoctū, & bacce lauri pauco numero trite, & calamintha cū posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cū vino & ruta, nec secus ficulneum lac, lasserpitū, si adsit, sin desideretur, peucedani succo vtendum. Efficax est potus trifolij, & oymii semen. Horum autem omnium vicem pensat iugis lauacri vsus, euocatus sudor, et dilute vini portiones. Ei, qui marina pastinaca icitur, omnia que de viperarū morsu paulo post referemus, simili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatus cient: interdum autem, sed raro, nomas excitāt. Quibus absynthij, saluie, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinacæ diuulsa & vulnere impoſita, sui ictus medela est. Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano spleniū, per se vulnere exterius impositū, vt medicamēti modo aceto tritū, et hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse  
qui



qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus  
sui veneficia luit: resistunt quoque acini dulcis pu-  
nici decocti, & illiti. Item porri, & allia contri-  
ta, necnon aqua calida fota: sed haec ad locum  
pertinent. Prodest potum abrotoni decoctum, ma-  
ximè si in vino detur. Praeterea serpyllū, & gal-  
banū, & eruca vino madafacta, recētes cupres-  
si pilule cum aceto, & cyclaminus ex aceto mul-  
so, & pyrethrū cum vino, & camaleonis herbae  
radix. Nec desunt, qui literarū monumentis tra-  
diderunt, tritum murem araneum contra suos  
ictus commodè bibi. Quam historiam apud alios  
inuentam, dignam duntaxat censuimus, quae an-  
notaretur. Alij asseuerant de morsum non aliās  
exulcerari, nisi pragnās mus araneus fuerit: tum  
sanè auxiliari ferunt. Si vipera morsum im-  
pressit, finum caprinum cum vino, studiosè im-  
positum opitulatur. Item laurus, & abrotonum,  
& galbanum splenij loco superiectum, & origa-  
num viride inditum. Pulli gallinarum discerpti,  
& confestim admoti: erui farina vino subacta:  
radicis cortex usque eò tusus, ut in puluerem so-  
lutus abeat, & scilla tosta: detritum chameme-  
lum hordeaceae farinae cataplasma in aceto mulso  
preparatum: sed locus antè eo calido foveatur.  
Haec loco imponuntur. Contra viperinos ictus ru-  
bus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui fo-  
lio constantè auxiliari produnt. Leporini coagu-  
li in vino terni oboli bibuntur, & porracei succi  
hem



hemina in mero, & foliorum apiastri succus, & syluestris ruta: hæc in vino potari debet. Vinum frequenter bibendum, allia mādenda, & cepæ, et porri recentes, salsamēta acerrima, & opipara. Simplicia hæc sunt. Percussis à vipera præclarè auxiliatur medicamentum, quod myrrhæ, piperis, castorei, floris portulacæ seminiisque, dimidio acetabulo constat: hæc omnia in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo libro, qui ὁ περὶ τῶν ἀνδρῶν, id est, de viribus, inscribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis ab vipera auxilium ferre possunt: inter quæ talia maximè laudantur, Gallinacea cerebella cum vino pota, semen sativæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum vino potū. Quinetiam bonum est digitum in liquidam picem intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc sunt, quæ contra viperæ ictus auxiliantur. De amphibena mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè remedijs ad viperas scriptis, percussi ab ea adiuuari soleant. A dryino ictis conuenit aristolochia cum vino pota, trifolium herba, radix hastule regie similiter assumpta, & fructus ex omni quercus genere, & tusa ilicis radices, & illi te parti ictæ auxiliantur. Hemorrhoidis dissadissq; morsus velut immedicabiles à plerisque maiorum deplorati relinquebantur: quare si pecuniaribus cōtra dissadem remedijs egeamus, communiā experiri operæ pretium erit. Protinus au-

M



tem scarificatione vti, vñlionē facere, & si locus  
 patiatur, extremorū amputatione opus erit: con-  
 sequēter quā acerrima cataplasmata admoue-  
 re, de quibus sēpenumero diximus. Nec me fu-  
 git, acres cibos, maximē à salsamētis, vtilēs esse.  
 Merace potiones et lauacra prosunt, quæ subin-  
 de interiecto breui spatio assumēda sunt, prius-  
 quam morbi genus emerferit: quo semel erūpēte,  
 opē ferre non potest vlla medici opera. In ictu hæ-  
 morrhoi eadem prosunt. Insuper quæ in cōmune  
 opitulātur, vt scarificatiōes, vñtiones, acres cibi,  
 meraci potus, & quæ nunc in dispade definiui-  
 mus. Quinetiam decocta vitis folia, & cū melle  
 trita. Si morsum natrix adēgit, prodest origanū  
 tritū & aqua subactū, lixiuia cum oleo indita,  
 aut aristolochiæ cortex, aut querna radix mi-  
 nutim contrita, & herdei farina cum aqua &  
 melle colliquata. Bibūtur etiā tinea aristolochiæ  
 drachmæ in potione poscæ cyathis duobus, deim-  
 ceptis marrubii succus, vel decoctū alterius cū vi-  
 no. Fauus recens datur in aceto. Morsus à cēchri-  
 dio auxiliatur lactuca fructus cum lini semine  
 illitus, & satureia trita, & syluestris ruta,  
 & serpyllū cū duabus hastula regiæ drachmis,  
 & tribus vini cyathis, aut aristolochiæ radix.  
 Item cardamomū & gentiana. Si cerasites per-  
 cussit, cita partis amputatio suffragatur: qua-  
 re sine mora iſtā partem amputare, aut scalpro  
 confestim circuncidere, & ijs similia prosequi  
 oport



oportet. Vrentia insuper reliquijs admouenda,  
siquidem virus hoc veneno basilisci simile est.  
Iis, qui ab aspidē feriuntur, quę de ceraſte scri-  
pta sunt auxilia dari debent. Nam venenū hoc,  
quemadmodum basilisci, aut sanguis bubulus,  
celerrimē in arterijs sanguinem cogit.

Ad basilisci morsum, vt Erasistratus  
author est, auxiliatur caſterij  
drachma in vino pota: item

papaueris succus. I-

Etuum remedia

ita se ha-

bent.

SEXTI ET VLTIMI

LIBRI FINIS.

M 2





## NOTHA ET DIOSCORIDI

FALSO ADSCRIPTA, QVAE

vt facile, si quis ita velit, suis singula

locis applicentur, numeris no-

tantur: quorū primus Dio-

scoridis paginam, se-

cundus versum

signat.

6.12. Iris ab aliquibus Illyrica, ab alijs thel-  
pide, ab alijs vrania, à nonnullis catheron aut  
thaumastos, à Romanis marica radix, à qui-  
busdam gladiola, ab alijs opertritos, ab alijs cō-  
secratrix, ab Aegyptijs nar appellatur.

8.2. Aliqui choron aphrodisias, Romani vene-  
reā, aut radicē nauticā, Galli piper apiū vocāt.

9.6. Romani iunci radicem aut iuncum.

13.23. Magi sanguinem Martis, Latini per-  
pēsam, alijs bacchar, Osthanes thesam, Aegyptij  
cerea, alijs nardum rusticum, Galli bacchar, He-  
trusci succinum: odorata herba est, qua in coro-  
namentis vtuntur.

15.8. Quibus odor inest cinnamomo proximus:  
asperum siccūmq; solum amat. Eius radix, ru-  
ptis, conuullis, in tussi vetere, & spirādi difficul-  
tate, & si vrina egrē redditur, opifera est: mēses  
ciet, contra serpentium ictus, eam in vino bibere  
salutare est. Folia, vt quae adstringāt, illita capi-  
tū in doloribus, oculorū inflammationibus, incipien-

ribus



ribus egypcijs, māmīs tumētibus à partu, igni-  
bus sacris auxiliatur. Odor somnū gignit. Cra-  
teus herbarius de eo ita scriptū reliquit: Asarū.

24.17. Aly sphagnon, alij phasganon, Syri  
diaxylon vocant.

27.5. Ab aliquibus caſtor, ab alijs cynomor-  
phos, à Magis Herculis sanguis appellatur.

28.23. Symphyton aliqui vocāt, alij persicā,  
alij medicā, alij orestii, alij nectario, alij cleoniā:  
alij ideambatō, aut phlomū idē, Latini termi-  
nialium, aut enulam campanā, Aegyptij lenen.

68.29. Iuniperum parvam Græci arceuthi-  
da, aliqui mnesitheum, alij acatalidem, Aphri-  
zuorinsipet, Aegyptij libyum, Galli iupicellum,  
Romani iuniperum vocant.

69.15. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus ma-  
gna, quam aliqui syluestrem cupressum appel-  
lant, alij mnesitheum, alij acateram, Romani  
iuniperum, vulgò cognita est, cupresso assimilis:  
asperis maritimisq; locis plerunq; nascitur, eas-  
dem quas supradicta vires habens.

69.17. Brathy, alijs baryton, alijs baron, Ro-  
manis herba Sabina appellatur.

76.7. Rhamnum alij persephonion vocāt, alij  
leucacantham, Romani spinam albam, aut cer-  
ualem spinam, Aphri atadim.

76.21. Halimum alij damasonium vocāt, alij  
erymon, alij britanicā, alij rhabdio, alij basilion,  
Magi Mercurij basim, aut Osiridis diadema.



DIOSCORIDIS

aliū elyſtephanon, aut ſacrum caulem, Pythagoras anthenoros, Aegyptū afontiri, aliū aſphē, aliū aſcaluri, aliū aſariphen, Latini albucium aut ampeluciam.

85.6. Agnon aliqui agynon, aliū lygon vocāt, aliū amictomienon, aliū tridaetylē, Magi ſemnon, aliū hemaideos, Aegyptū ſum, Romani ſalicē marinā, aliū piper agreſte, aliū lecriſticū.

122.20. Eorū vter ſale cōditus, & in vmbra ſiccatus, cōtra eximias vacuationes medicamentorū, triū drachmarū pondere, praſenti eſt auxilio: quādoquidē protinus deiectiones cohibet. Teri autē debet in farinam, & aqua ſubactus dari.

158.18. Telin, aliū carpon, aliū buceron, aliū egoceron, aliū ceraitiden, Latini ſcenum graecum appellant, Aegyptū itaſin.

159.5. Aliqui linocalamin vocāt, aliū annon, aliū linū agrion, Romani linū, Pœni Zeraphoēs.

164.15. Thermon, Romani lupinum, Aegyptū brechon vocant.

165.10. Gongylen ſatiuā, aliū gongylida, aliū golgoſium, Romani rapum vocant.

166.10. Aliū polyides eryngiū, Aphri thorpha.

167.5. Sylueſtris raphanus, quam Romani armoraciam vocant, aliū montanum raphanū, aliū apiū, aliū iſchada, aliū chamaebalanum. Romani etiam radicē ſylueſtrem: ramulos tenues, iunceos, duos ſive tres ſpargit, ruhetes: folijs ruta ſylueſtris, oblongioribus, et anguſtioribus: ſemine par.



paruo: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radice superior vomitione bilem pituitamq; extrahit, inferior per aluum, tota susq; deq; purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tusa in ficili mergitur, et qui supernatat succus pinna eximitur. Is sesquiobolo potus, vtraq; parte purgat.

168.12. Romani napium dicunt.

168.14. Aegyptij echlotripam appellat, alij riplam, Romani blitum, Daci bles.

168.21. Pythagoras anthemia vocauit, Zoroastres diadema, Aegyptij chocortem, Magi licnem capre, aut muris vrinam.

169.12. Atraphaxin, Romani atriplicem, Aegyptij ochi vocant.

169.19. Cramben Romani brassicam vocat.

170.22. Romani rusticam appellant.

172.13. Portulaca syluestris. Cap. syluestris portulaca, quam aliqui aixon syluestre vocat, alij telephion, Romani illecebram, aliqui portulacam, Aphri mœmoen, Daci lax, Aegyptij mochmutim, folijs pusillis, ad satiuam accedentibus, hirsutis, latioribus: nascitur in petrosis, nonnunquam in hortis, folia oleæ habet, minora multo, plura & tenere, rubentes cauliculos, ex vna radice multos, in terra sessiles, qui manducati bonum succum pariunt, viscosi, & aliquantulum salsi. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: discutit



D I O S C O R I D I S

*strum. u. cum axungia illita.*

173. 3. Aliqui petreon, alij myacanthan, alij myon vocant.

173. 27. Arnoglosson alij arnion vocant, alij probation, alij cynoglosson, alij heptapleuron, alij polyneuron, Magi ewrechmemona, Aegyptij asonth, Romani plantaginem, Hispani ihesari-  
cam, Pœni atyrcon.

175. 10. Syrius plantaginis, & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos vires defecerunt, datum die secunda, & quarta, et parasceue, id est, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experiëntia compertum est.

175. 12. Aliqui aquatilem anagallida, alij darion, alij lauer, alij schinon aromaticū vocāt.

175. 21. Alij Veneris coronam, Romani vene-  
ream, aut eusteralem.

176. 24. Aliquibus ammonos, alijs astrion, Pœnis atirsite, Romanis caciatrix, alijs stilago, alijs sanguinaria dicitur.

177. 2. Sonchon asperū aliqui cichoriū vocāt, Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonē.

177. 26. Alij picrida appellant, Aegyptij a-  
gon, Romani intubum.

180. 9. Thridaca hemeron, Romani lactucam  
satiuam, Aegyptij embrosi dicunt.

180. 21. Magi sanguinem Titani, Zoroastres  
pherumbrū, Romani lactucā sylvestrē appellāt.

181. 8. Romani bisacutū, Aegyptij dorisatriū

Syr



N O T H A.

*Syri adonium, Apbri tirieta appellant.*

181.16. *Romani herbam scanariam, aut aculam nominant.*

181.21. *Alij caucum, alij myitin, Democritus brion, Romani pedem gallinaceum, aut pedem pulli, Aegyptij seselin vocant.*

181.28. *Euxomon Romani Erucam vocant, Aegyptij ethrericem, Pani asuric.*

182.27. *Alij cynomorion appellant, à similitudine canini genitalis, alij leonem, Cyprij thyrfinem, communiter lycon.*

185.27. *Crommyon aliqui polyidos vocant, Magi calabetim, Romani cepam.*

186.26. *Gracisorodon, alij geboscon, alij elaphoboscon vocant.*

188.9. *Romani sinape vocant.*

186.9. *Cardamon alijs cynocardamon, alijs iberis, alijs cardaminaca, Aegyptijs seme th, Romanis nasturtium dicitur.*

189.25. *Aliqui thlaspidion, alij sinapi Persicum, alij myiten, alij sylvestre synapi, alij dasmophon, alij myopteron, alij bitron, Aegyptij suitepsum, Romani scandulatum, alij capsellam, aut pedem gallinaceum vocant.*

190.20. *Aliqui chamæplion, Magi Herculis alphita, Aegyptij ereihmon.*

194.4. *Ab aliquibus cerdon, ab alijs catharxis, ab alijs struthocamelus, à quibusdam chamærhytō, à Magis callirrhyton, ab Aegyptijs æno, à*



# DIOSCORIDIS

Pœnis syris, à Latinis lanaria herba, aut radicala appellatur.

194.18. A' quibusdam cissanthemon, ab alijs cissophyllon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyotheron, ab alijs silene, à Zoroastre triumphalites, ab Osthane aspho, à Magis miaspho, Aegyptijs thesce, à Romanis rapum terre, aut terre umbilicus, ab alijs arcar vocatur.

160.14. Draunculus. Cap. Draguntium magnum aliqui aron, alijsaron, alijsaron, alijs hieraciũ, alijsbiaron, alijsarmiagrion, alijs ciperida vocant: in vmbrosis sepibus gignitur. Caulem habet rectũ, lenẽ, duũ cubitorũ, baculi crassitudine, versicoloribus draconum maculis, purpureis tamẽ evincẽtibz: folia rumicis, inflexa: fructũ summo caule facit, racemosum, coloris primũ cineracei, mox per maturitatẽ in crocũ & purpurã vergentis: radicem prægradem, rotũdam, candidam, cortice tenui vestitam. Colligitur, & dum maturescit, succus exprimitur, siccaturq; in vmbra. Radix quoq; mensibus effoditur, elotãq; particulatim cõciditur, & funiculo trãsfixa siccatur in vmbra. Cum diluta portione, crudam coctãve, cum melle delingi prodest, contra orthopneas, rupta, convulsa, tußim, & destillationes: pota cum vino venerẽ stimulat: vlcera quæ cacoëthe vocantur atq; phagedænica, expurgat, præsertim cum vite alba: ex ea & melle collyria ad fistulas & partus euocandos cõponuntur: ad  
vitiũ



N O T H A.

Utiligines cum melle, efficaciter illinitur: polypos  
& carcinomata absument. Succus ad oculorū me-  
dicamenta, item contra nubeculas, caliginem, al-  
buginesq; effectum prabet: herbe radicisq; odor,  
teneros conceptus abortu vitiat: item si triginta  
grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius suc-  
cum cum oleo aurium doloribus infudere: quin  
etiā folia, utpote que adstringāt, vulneribus re-  
cētibus imposuere, & cocta in vino permionibus.  
Qui folia manibus affricuerit, aut radicem exe-  
merit, posse à vipera feriri inficiantur.

197.23. Aliqui alimon, alij thymon, alij dra-  
contiam, Cyprij colocasion dicunt.

198.13. Græci asphodelon, alij narthecion, Ro-  
mani albucum vocant.

199.11. Floret mēsitus albucū. Quare equi-  
noctio verno, antequā semen adoleuerit, deme-  
tendum. Radicem aiunt potam, Veneris cupidita-  
tem inhibere, quod herbarius Crateus asseue-  
rat: addiditq; sanare podagræ dolores, si drach-  
mæ pondere bibatur.

200 7. Cocti cū polenta, & ex suillo adipe im-  
positi, tumores ac tubercula velocissimè ad sup-  
purationem perducunt, & rumpunt.

202. 4. Aliqui cynosbaton, alij capriam, alij  
corui malum, alij ophioscorodon, alij phyllostā-  
phylon, quidam thalliam, aut petream, alij olo-  
phyton, alij ionitē, nonnulli oligochloron aut acō-  
tio, aut hippomanes, alij trichomanes, Magi po-  
tera,



# DIOSCORIDIS

tera, alij pentheron, aut cor lupi, alij alofchorodon, alij crinon, alij thlaspin, Romani persicum synapi aut inturim, Aphri herbiaethon.

203.16. Ranunculum aliqui sylvestre apium vocant.

204.8. Anemonen, alij agriam, aut nigram vocat, alii anemonen phœnicam, alii enemion, nonnulli meconion, alii tragoceros, alii terra parinen, aut barbylam, Osthanes berilion, item ornios ceranion, Pythagoras atraettilida, Magi enicū agriā, Aphri chusfit, Romani orci tunicā.

205.16. Aliquibus renone vocatur, aliis anthemis, aliis homonea, aliquibus flos campestris, Romanis concordialis, aut pergalia, aliis liburnia, Gallis corona.

205.22. Ea, vt herbarius Crateuas author est, contusa cū axungia, strumas discutit. Cribrata eius farina cum nitro, & sulphure ignem non experto contra vitilignes efficax est: easq; sicco linteo antea confictas in balneis sanat: facit & ad scabiem.

Altera argemone. Cap. Altera est Argemone, quā artemonem aliqui, alii arselam, aut sarcocollam vocat, Romani argemoniam. Ea foliis sylvestri papaueri similis est. Recens trita intercisiones impositu, sanat: oculorū inflammationes mitigat: pota cū aqua dysentericis auxiliatur: vulnera cōglutinat: cōuulsis, & vellicatibus imposita medetur, inflammationibus vtilis, contra  
ser



N O T H A.

*Serpentium morsus cum vino bibitur.*

205. 24. *Anagallis purpurea*, quibusdā aëritis aut egitis vocatur, aliis sauritis, Magis oculi sanguis, aut chelidonium: Romanis macia, Hetruscis masytipos, Gallis sapana, Dacis cerceraphrō. *Anagallis communis*, quibusdam corchoron, aliis halicacabon, aliis xeliaurus, Magis nyctēritis, Aegyptiis mecii, Romanis aneciaton, Aphris asirrisæ.

206. 12. Aliquibus citharon, aliis cissaron, aliis chrysocarpos, aliis poëtica, aliis corymbethra, aliis cysion, aliis dionysia, aliis ithytheriō, aliis persis, aliis cemos, aliis asplenos, Romanis sylua mater, aliis hedera, Gallis suibites.

207. 17. *Chelidonium* magnam nonnulli peoniam vocant, alii crateam, alii aubii, alii glauciam, alii pandios radix, quidam philomedion, alii othonion, Romanis fabium, Galli thonan, Aegyptii mohoth, Daci crustana.

209. 13. *Auricula muris*. Cap. *Myosota* alii myotō, alii anthyllion, alii alsinen, nonnulli myorithocon, alii myrthosplenon, Latini muris auriculam vocant, Aphri labatholabat. Nomen ideo accepit, quod muscutorum aures foliis imitetur. Lucos & sabulosa loca amat, ideo alsine dicta est. Ea helxine similis, sed humilior, ac foliis minor. Vim refrigeratorem habet, oculorum inflammationibus cōueniēter ex polenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur. in totū eadem



# DIOSCORIDIS

dem potest, quæ helxine.

209.24. Isatis sativa aliquibus augion, alijs egne, Magis arufion, Romanis gluta aut glastum dicitur.

210.8. Sed sciendum est, ne tradita errorem pariant, satium glastum, luteæ florem, tenuiores, multifidósq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos lingue speciem representantes, in quibus semen continetur melanthio simile, caulémq; supra binum cubitorum altitudinem attolli: sylvestre verò nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiorem: florem purpureum, aut exruleum, fructum cruciforme, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartito diuisum.

210.10. Aliqui sylvestre semperuium, alijs portulacam sylvestrem appellant, Romani illecebram, Aegyptij anoth, Aphriatirtopurin.

213.3. Aliqui rhiam vocant.

123.29. Aliqui centauriæ radicem, alijs aloen Gallicam, alijs narcen, alijs chironion, Dardani aloitin, Romani gentianam aut cicendiam, alijs ciminalem vocant.

214.29. Alijs melocarpos, alijs teuxinon, Latine aristolochia.

216.4. Appellatur à quibusdam ararisa, & melecaprum, ephestios, lectitis pyxionyx, Dardanion, tentitis, Callis theximion, Aegyptijs sophoepl, Siculis chamamelon, Italis mâlum terre



N O T H A.

terra, Dacis absynthium rusticum: nascitur in montibus, & calidis locis, aut campestribus, & petris. Ad grauem febrim efficax est, si idore subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuabitur: vulnera impesili sanat: carcinomatis uarium, cum cypero, & dracunculi semine, & melle prodest: rigor ille medetur, cocta in oleo aut adipe suillo, illitaq;. Crateus herbarius, Gallus eadem de hac tradiderunt, & praeterea podagricis eam auxiliari.

216. 6. Glycyrrhizam aliqui penticam, alij glyceraton, quidam symphyton, alij leonicam, alij glycyphyton, aliqui sythion, alij adipson, alij sylitram, alij lilyestason, alij homæon, alij peenthaomæon, Latini dulcem radicem appellauere.

216. 24. Aliqui narcem vocant, alij limnesion, alij marcnem, alij pleetroniam, alij chironiam, alij limnestim, Magi Herculis sanguinem, Romani plieri, & vneferam, & fel terre.

217. 17. Panacia appellata est, quoniam omnia mitigat vitia, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs: pulsationes vulnorum, vrinae stillicidia, calculorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia lumine complentur.

217. 18. Aliqui limnesion, alij bellebritten, alij amaraton, Magi Herculis sanguinem, Latini febrifus



# DIOSCORIDIS

brifugiam, alij auram, multi radicem, Daci tul belam appellant.

218. 27. Quibusdam chrysisceptron, alijs ixia, Romanis carduus varinus, Aegyptijs epher dicitur, alijs ephthofechin.

219. 18. Pancarpon aliqui, alij vlophonon, alij ixiā, alij cynomaxon, alij ocimoides. alij cni dion coccon, alij cynoxylon, Latini carduum nigrum aut vernilaginem, Aegyptij sobel vocāt.

220. 22. Aliqui crocodilion vocāt, alij chameleonē, alij onocardion, alij Veneris lauacrū, Romanilibrū Veneris, alij carduum Veneris, Aegyptij seseneor, alij chir, alij meleta, Daci sciarā.

221. 11. Aliqui agriocinnarā, alij donacitin, alij erysisceptrum vocant, Romani spinam albam aut regiam, alij carduum ramptarium.

221. 26. Que acanthis aliquibus dicitur.

222. 3. Aliās pherusa, aliās pyracantha nominatur, in Aegypto cū.

222. 12. Aliqui phrynion, aliqui acidoton.

222. 25. Acantham aut herpacantham, quidam melamphyllon, aliqui topiariam, alij marmolariam, quidam crepulam vocant.

224. 7. Quidam polygonaton, alij phyllon, alij ischiada vocant, Romani spinam albam.

225. 2. Aliqui eryngen, alij eryneren, alij caryon, alij gorginon, alij hermion, alij origanū, chlounion, alij myracanthon, alij moly, Aegyptij crobysen, Magi sysserion, Romani capitulum.



lum Martis, Daci sicupnoëx, Hispani centumca  
pita, Aphri cherdam, alij oriam chloem, alij chi-  
da appellant.

225. 22. Aloë aliquibus amphibion, alij her-  
minion, alij eryngion, alij tragoceros, Romanis  
aloe, Barbaris aloë dicitur.

227. 16. Aegyptij somi, Romani absynthium.

228. 24. Latini Sandonicum vocant.

229. 13. alij abutonon, alij absynthium, alij he-  
raction, alij cholopæon, alij absynthiomenon, alij  
thelythorion, alij procampylon, Magi aëura-  
phonicos, alij cynanchiten, Romani absynthium  
ponticum, nonnulli thelythamnium, alij glycin  
ancona vocant.

230. 7. aliqui later vocāt, alij cassialam, Ae-  
gyptij pesalem.

230. 26. aliqui syncliopa, alij alcibiadem,  
alij pancration, nonnulli styphoniam, Aegyptij  
suphlo, Magi pythons oculum, Romani scioblebi-  
nam vocitant,

232. 37. vers. vlt. Glichona alij blechroon, alij  
arsencanthon, Latini pulegion vocant, Galli  
aluolum, Aphri apoleium, quidam galisopsim.

233. 16. alij embactron, alij belouacos, alij  
artemedion, alij cretica, quibusdam ephemerō,  
nonnullis eldia, aliquibus belotocos, aut dorci-  
dion. aut helbunion, Romanis vstilago rustica.

234. 19. alij elaphoboscon, aliqui phacon, alij  
ciosmin, alij phagnon, Aegyptij becion, Roma-



ni saluiam vocant.

235.4. Hedyosmon sativum alij mintham, alij calamintham, Latini mentham vocāt, alij nepetam, Aegyptij tis, alij pherthrumerthumonthu, alij perxo, alij maceto.

235.24. quidam cephaloton, alij epithymida, alij thyrson, Latini thymum, Aegyptij stephanem, Daci mosulam.

237.23. aliqui Zygiu sylvestre, alij polion vocant, Aegyptij meruopyum, Latini serpyllum.

238.14. aliqui nominant amaracum, alij triphyllon, alij agathedes, alij cnecon, alij acapnō, Pythagoras thramben, Aegyptij sopho, Armenij myuron, Magi ichrei asinum, aut hecigonon Isidis, Latini maioranam.

239.20. aliqui origanida, aut hysobriū vocāt.

229.28. alijs sylvestre basilicum, Latinis ocimastrum.

240.25. ruta montana, quā aliqui rhytē montanā vocant: & horiensis, quā Aegyptij epnubum, Syri harmala, alij besasa, Aphri churma.

242.25. Sylvestris ruta Cap. Rutam sylvestrē aliqui appellant hypericon, alij androsanon, alij coron, alij chamepityu, Romani hederalem, aut centonalem, Aphri churma semmaced. odor seminis resinofus est, ideo chamepitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens, folia ruta figura flores lutei, qui digitis triti sanguineos succo manāt, vnde androsēmō vocitarūt. Ramuli  
sub



N O T H A.

subhirsuti, siliquæ teretes, hordei effigie, in quibus semē nigrum resinā olens, gignitur incultis & asperis. Urinā ciet, menses appositu trahit, pota cū vino quartana liberat. Folia cū semine ambustis illitu medentur, & diebus quadraginta epota ischiadicos sanant.

243.13. aliqui syluestre leucoion appellant,

247.1. aliqui cerascomē vocāt, Latini rusticam pastinacam, aliqui carotam, Aegyptij babilon, Aphri sic ham.

247.19 nonnulli sphagnon vocant.

248.3. Aegyptij cyonum phricem vocant.

249.23. Anethum quod estur, aliqui polgida vocant, alij anicetum, Magi cynocephali genitiram, aut capillos, alij Mercurij semē, Latini anethum, Aphri sicciriam, Aegyptij arachu, Daci pulpum.

250.18. sine cuminum syluaticum.

251.11. Ammi, Latini ammiū Alexandrinum, quidam regium cuminum appellant.

251.24. Aegyptij ochion vocant, Aphri gæd.

252.6. alij sonchites, Romanis lampuca, Pænis sibileas.

252.17. aliqui sonchiten, alij entimon agrion, Romani intylum syluestrem vocant.

253.18. à quibusdā pedimon, ab alijs hydroselinon agrion, Romanis apiū rusticum appellatur.

253.19. aliqui petroselinon syluestre appellant, Aegyptij anonim.



# DIOSCORIDIS

254.6. aliqui grielon, alij agrioselinum.

255. 22. aliqui elaphicon, alij nephriion, alij ophigenion, nonnulli ophioctonon, aliqui herpyoen, alij lymen vocat, Romani cerui ocellum, Aegyptij chemin, Aphri ascaucau.

256. 25. hippomarathrum, aliqui marathin, alij marathru agrion, Aegyptij sampsoth, Magi thymarnolion, Latini foeniculum erraticum, aliqui mion, Galli sistrameor.

257. 29. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs paralysis, alijs camarus, alijs hyacinthus, alijs delphinias, alijs nerion, alijs neriadion, aut sosandron, aut cronion, Romanis bucinus minor vocatur.

258. 14. aliqui dorycnion, alij pyrinon, alij pyroton, aut pyrothron, alij arnon pyriten, Magi pyriten, Romani saliuarem vocant.

258. 25. aliquibus Zea aut campsanema appellatur.

260. 19. aliqui arangem vocant, alij phalangion, alij asterion, nonnulli nesyrin aut sphondylin, quidam chorodanon, aut xnanthen, Romani herbam rutinalē, Aegyptij apsapher, Magi osirin

261. 21. aliqui agrion vocant, alij agriophyllon, Magi bonum demonem, Romani satariam.

263. 8. aliqui melanthium, alij mecona agriō melana, Romani papauer nigrum appellant.

269. 2. herba est, ex qua ammoniacum fit suffmen, quod thymiama vocat, aliqui agax yllon, alij



N O T H A.

aliū criothem, aliū heliustrum, Romani guttam.

271. 18. aliqui ampelocarpon, aliū omphalocarpon, nonnulli philantropon vocant.

271. 29. aliqui aspidion, aliū haplophyllon, aliū accyseton, aliū adyseton nuncupant.

272. 12. aliqui cission, aliū cissophyllon.

272. 20. aliqui armyron vocant, aliū cnicon sylvestre, aliū aspidion, Magi aphedrō, Aegyptiū chenon, Romani præsepium, aliqui fusum agrestem, aliū colum rusticam.

273. 2. quidā clinopedion, aliū polygonatō, aliū Iouis colum, aliū echeonymon vocant.

273. 8. Edocuit experientia cōtritos in vino albo ramulos, ijs qui affectibus laborāt, quæ violētie vocantur, magno esse præsidio.

273. 10. aliqui leonicon, aliū ocimoides, aliū xopyron vocant.

273. 21. aliquibus leontopodion, alijs leuceorō, alijs leōtiō, alijs doris, aut doricteris, alijs lychnis agria, alijs pardale, alijs thorybethron, alijs rha-peion, alijs cornutū papauer, alijs anemone, Romanis patabelclon, aut semen leoninum dicitur.

275. 4. aliqui athanaton vocāt, alii acylonion, alii ballarion, alii geranopodion, quidam corymbiō, aliqui taurion, alii sceptrō, aut maloion, Aegyptiū semeon, Magi sanguinem apocathementes, Romani genicularem aut ballariam.

275. 7. aliās tragonaton, aliās atocion, aliās hieracopodion, aut lampas vocatur, Aegyptijs



# DIOSCORIDIS

*semura, Magis apothemenes taurus, Romanis agreste intubum.*

275.13. *Crinon basilicon alij crinathemon vocat, alij gallirio, Magi Martis sanguine, Osthanes aurem crocodili, Aegyptij symphophon, quidam tialon, Latini liliu, aliqui rosam iconis, Syrisasa, Aphri abiblabon.*

276.6. *Alij magnu vocat, aliqui naphtha, alij notianoscemin, alij nesplassen, alij nothera, alij nochelin aut nostellin, alij nephryn, alij gnotorim, alij gnotera, Romani apniu, aut medatam, aut ulceraria, aut marrubiu nigru, alij canthuriu. Aegyptij asphon, magi Isionis sanguinem.*

276.18. *Alij meliteon, alij meliphyllon, alij erythran, alij temele, Latini apiastru aut citraginem, Galli merisimorion vocant.*

277.5. *Prasion, alij eupaterion, alij phyllophares, alij tripedilon, alij camelopodion, Aegyptij asteropē, Magi taurisanguine, aliqui aphedro, alij Hori genitura, Latini marrubiu, aliqui labeoniam, Aphri atierberxiam.*

278.8. *Aliqui phyllin, alij acaulon, alij sylvestre lapathum vocitant.*

278.16. *Alijs leucacantha dicitur.*

278.26. *Alij cnicion vocat, Romani trifoliu acutum, aut odoratum.*

279.24. *Polium mentanu, aliqui teuthrion, alij pheux aspidio, alij achamenin, alij ebenitin, alij melosmon, nonnulli bellion, quida leontocharon*

ron



ton vocant,

280.22. Aliqui scorbiō, alij pleuritū, alij dy-  
somon, alij syluestrem calaminthen, quidam cha-  
madryn, alij mithridanion, Magi Podotis san-  
guinem, Aegyptij apho, Romani trissaginem  
palustrem appellant.

281.13. Bechion quidam rhichion, alij petri-  
nam vocāt, alij peganō, alij pithiō, alij pagona-  
ton, alij chamelencem, alij procheton, alij arco-  
phyton, alij chamageron, Aegyptij saartam, La-  
tini tussilaginem, quidam pharphariam aut pu-  
stulaginem, Bessi asa.

281.28. Quibusdam polyclonos, alijs monoclo-  
nes, alijs toxitesia, alijs ephesia, alijs anaetorios,  
alijs soxusa, alijs leia, alijs licophryx, Magis ho-  
minis sanguis, alijs chrysanthemon, Romanis va-  
lentia, aut serpyllum, aut herba regia, aut arte-  
misia, alijs rapium, aut tertana, Gallis pona,  
Dacis Zuoste dicitur.

282.16. Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuio-  
ribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarū du-  
ctus, nascitur: cuius flores & folia cōtrita, sam-  
psuchi odorem reddūt. Si quis stomacho laborās,  
herbam cum amygdalino oleo bene contundat in  
malagmatis lentore, & stomacho imponat, sanē-  
tati restituetur: qui nervorū dolore cruciantur,  
si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

282.18. Romani caprum syluaticum vocant,  
quidam botryn, alij apium rusticum, Aegyptij



merseon.

283.6. Aliqui Pelonitin, alij tricam, alij gero-  
nogeronta, Romani vchinastrum, Aphri iescen  
appellant.

283.9. Aliqui mertryga, alij myrrhin, alij  
oxyphyllon, alij cardamomon, alii origanum vo-  
cant, Magi hierobryucas, Latini gruinam, aut  
pulmoniam, aut cicotriam.

282.15. Gnaphalion, alii hires, alii ampetocō,  
alii anaxiton, alii anaphlin, Aegyptii semeon,  
Galli gelasonen, Latini centumculum vocant,  
quidam tucularem, alii albinum.

284.8. Aliqui cerascomion, alii leucanthion vo-  
citant.

284.15. Conyza magna. Cap. Conyza magna  
aliquibus cynoxematitis, aliis danais, aliis ta-  
nachion, aliquibus phycos, aliis ischys, aliis dy-  
nosmos, Magis brephoctonos, quibusdā anubias,  
nonnullis hedemiis, Aegyptijs ceti, Romanis inty-  
bum, aut militaris, aut deliariū, aut febrifuga,  
alijs phragmosa, alijs musteros, alijs pissa nuncio  
patur,

285.2. Aliqui conizam parvam, alij panion,  
alij libanotidem, Magi cronon vocant.

285.10. Alij hemerocatalacton, alij crinon a-  
grion, alij crinanthemon, alij porphirantes, alij  
bulbū hematicon, alij anticantharon, Aegyptij  
iocri, Romani bulbū, aut liliū syluestre, aut ma-  
rinum, Aphri abiblabon vocant.



285.28. Aliqui basilion vocant, Latini violam albā, aliqui angustīā, nonnulli violam matronalem, aut passarinam, aut polyphuram.

288.11. Alii melion aqueum, alii entaticon, alii priapicon, aut satyriscon, aliqui satyri testiculum appellant, Latini molorticulum Veneris.

288.21. à Latinis geminalis, à Dacis hormis dicitur.

289.14. Aliqui osmada, aliqui ononin, alij phlonitin appellant.

290.13. Hanc nymphona alij vocant.

290.20. Sunt qui picrada appellant, alij leucen, alij thalassiam.

290.28. Alij pteryx, alij lonchitim, alij aturion, alij phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtrodotem, Magi mustele sanguinem.

291.26. Quidā anthyllon, alij anthemida vocant, alij eranthemin, alij leucathemō, alij soranthin, alij campestrum florem, Romani solastrū.

292.11. Anthemida aliqui leucanthemō, alij eranthemon, quoniā vere floreat: alij chamamelon, quoniam māli odorem habeat: nonnulli melanthemon, alij chrysocomam, alij calliam, Romani malium, Aphri astertiphen appellant.

293.11. Alij anthemida, alij leucanthemon, alij chamamelon, alij chrysocalin, alij melabathron, nonnulli campestrum florem, Romani solis seculum, aliqui millesoliū. Hetrusci cantam, Aphri tamath.



D I O S C O R I D I S

294.5. Alij balsamenā, Magi hamorrhā, alij  
Mercurij geniturā, alij aphthitis semē, aut mne  
sitheum, Romani Cappacoraniā, Aphri narat.

294.14. Alijs orobelion, quibusdam orobax,  
alijs hamagogon, alijs paseden, alijs monoge-  
nion, alijs menion, alijs pæonion, alijs panthice-  
ratos, alijs idai dactyli, alijs aglaophotis, alijs  
theodonion, alijs selenion, Magis selenogonon,  
alijs phthisis, Romanis casta.

295.12. Alij agonychon vocāt, alij leontion,  
alij leoninum lapidem, alij gorgonion, alij tan-  
talitin, alij disporon, Romani columbam, Dacō  
goncletam, alij heracliam.

296.3. Aliqui teuthrion, alij dracanon, alij  
cinnabarim, Latini rubiam, Hetruscilappā mi-  
norem, Aegyptij sophobi vocant.

296.25. Aliās cestron aut medusa dicitur, La-  
tinè venerea aut lanceola.

297.5. Latini longinā, aut calabrinā dicunt.

297.12. Alij althiocon vocant.

298.21. Aliqui cannabion, alij schinnostro-  
phon, alij asterion appellarunt.

298.26. Aliqui hydrastinam, Romani termi-  
nalem dicunt.

299.26. Aliqui acopon, alij anagyron, alij  
agnacopon vocant.

299.27. Alij alceam, alij acyron, alij lyron.

300.13. Aliqui onobrochilon, alij eschasmenē,  
alij hypericon, alij corion, alij chamæpytin, Ro-  
mani



mani opacem, alij brichilatam, alij leptam, alij iocinalem, Dacia niassexe appellant.

301.24. Alij ascyron aut dionysiadem.

302.21. Alij puyssorysis, alij orixelo, iis qui Pontum incolunt olecyron, alij tryonia syluestris, Athenis ionia, Eboicis sideritis, Magis Minervæ sanguis, Latinis ainga aut cypricum, Dacis dohela appellatur.

306.6. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in pratis & montibus, locus mundus, & opacis, circa frutices: animas hominum & corpora custodit. nocturnas ambulationes, & loca sancta: gravibus somnis resistit: ad omnem medendi usum commedata. Radicem habet rubram, odoratam, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureis. Farina recetis vulneribus capitis indita, dolorem finit: vulnera glutinat: fracta ossa extrahit: sed quoti die imponi debet, dum persanescant: dolori capitis medetur, si iure decocti perfundatur, aut teporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

306.21. Aliqui polygonatum appellant, alij cynochalam, alij heraciam, alij asphalton, alij cliophyllon, alij clema, alij polycarpon, alij carcinethron, alij teuthalida, alij myrtopetalon, alij cnopodion, alij Zarithream, alij pedalion, Aegyptij thephin, aliqui stemphin, Magi genituram herois, aliqui unguem muris, Latini sanguinariam aut seminalem, Aphrichulum.



D I O S C O R I D I S

307.27. Alii philetarion, aliis daphnoides, aliis smyrnoides aut polygonoides appellatur.

308.7. Aliqui epigetin, Aegyptii philacuum, Romani ambuxum vocitant.

309.23. Romani sellaginem vocant.

310.1. Rutaceis similes.

310.29. Alii tobion, Romani stipam vocant.

310.26. Alii calycanthemō, aliipericlymenō, aliis heliophyes, nonnulli hepatitim, aliis milacem, aliis anatolicon, aliis diticon, aliis merginem, Latini volucrum, aliqui volucrum maius, Aegyptii oxyui, aliis clymenon, aliis clymeniō, quod & ego non nuncupant.

311.8. Aliqui Aeginam, aliis clymenon, aliis carpathon, aliis splenion, aliis epetitum, aliis axinā maiorem, nonnulli clematitim, aliis myrsinen, aliis calycanthemon, Magi polion Veneris, Aegyptii turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

311.26. Tribulus aliquibus bucephalus, aliis tan roceros, Romanis tribulus aquaticus dicitur.

312.18. Sarxiphagon. Cap. Sarxiphagon aliqui sarxiphragon, aliis empetron, Romani saxi phragiam vocant: frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: stranguriae prodest: singultum sedat: calculos vesicae frangit, & urinam ciet.

312.19. Aliquibus potamogiton appellatur, aliis



N O T H A.

alijs neuroides, alijs lonchitis, alijs rapionium, Ny  
sjs mendrutha, Syris neuda, alijs lycosemphyllō:  
alijs helleborosemata, alijs scylliō. Magis lupicor,  
Romanis viartum nigrum, quibusdā tintinabu  
lum terræ, Gallis iumbarum, Dacis dacina.

312.27. Aliqui leporis cuminum appellant.

313.2. Aliqui medicam appellāt. alijs triphyllō,  
alijs clemation, nonnulli osmon, quidem trigonon,  
alijs cybellion, alijs polyphyllon, Romani trifolium  
odoratum, Aegyptijs epaphon.

313.11. Ab alijs erineos, ab alijs thryas, à nonnul  
lis pollyrrhixō, à Romanis vindicta nominatur.

313.21. Aliqui anaetoriō, alijs phasganon, alijs  
machæronion, alijs arion vocant, Romani gla  
diolam, quidem genitalem.

314.10. Alijs bolum vocant.

314.16. Ab aliquibus iris agria, ab alijs cacos,  
à Romanis gladiolus, aut iris agrestis, à Dacis  
aprus dicitur.

315.2. Anchusam aliqui catanchusam vocāt,  
alijs libycam, alijs archibelliō, alijs alcibiadion, alijs  
onophyllon, alijs porphyrida, alijs mydusam, alijs  
salyca, alijs noneam, Aphri buinesath.

316.12. Aliqui aridam, alijs alcibiadion, Romæ  
ni alcibiacum nominant.

316.25. Aliqui & hanc echinō vocant, alijs scor  
piuron, alijs sparganō, alijs altheam, alijs amarāti  
da, alijs probateam, alijs elaphion, alijs antiminon,  
alijs porphyrida, alijs augion, alijs nemesiō, alijs phé  
leter



D I O S C O R I D I S .

Ieterion, alij hyenopsolon, alij thyrsum, alij ther-  
mutim, alij misopathos.

317.5. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

317.14. Agrostin aliqui egico, alij amaxitin,  
Aegyptij amphi vocant, Latini gramen, aliqui  
asyphyllion, alij sanguinalem, alij vniolam, Hi-  
spani apariam, Daci cotiatem, Aphri iehal.

318.9. Magi geniturā, aut sanguinem Tita-  
ni, alij scorpionis urinam, Pythagoras parmirō,  
Andreas xāthophanea, Oslhanes boēphthalmō,  
Aegyptij sendionor, Romani vertemnum, alij so-  
leastron, Aphri vdedonin.

319.5. Aliqui myriomorphon nominant, alij  
chilionphyllon, alij stratioticon, alij heracleon, La-  
tini supercilium Veneris, alij acron syluaticum,  
alij militare, alij millefolium.

319.19. Bates, ab alijs cinobatos, ab alijs seli-  
norition, ab alijs asyntrophos, à Magis Titani  
sanguis, ab alijs ibidis sanguis, à Romanis rubus,  
ab alijs sentes, à quibusdam mora baticana, à  
Dacis mantia, Aegyptijs hemoos, alijs ametros  
appellatur.

321.2. Alij hepatorium. aut hepatitis, Roma-  
ni volucrum manus.

321.17. Pentaphyllō aliqui pētapetes, alij pen-  
tatomō, alij pentaractylon, alij pseudoselinū, alij  
calli etalon, alij xyloloten, nonnulli xylopetalō,  
alij asphalton, alij pentacænon, alij thymiatitin,  
Aegyptij orphiebeocē, alij enotrō, Magi ibidis

vng



N O T H A.

vinguem, alij ibidis pennam, alij hermodactylon.  
Romani quinquefolium, Galli penpedulā, Dacō  
propedulam appellant.

322.27. Aliqui rhon, alij anchinopa, alij phœ  
nicopteron, alij rhon stachyos, alij osthaleu, Ae-  
gyptij athnon nominant.

323.14. Alij rhodida nominant.

323.20. Hippurin, alij trimachion, alij anaba-  
fin, alij cheredranon, alij phædran, alij itianden-  
dron, alij gis, alij schœniostrophon vocant, Aegy-  
ptij pherphran, Maxi Saturnicibum, Romani  
equinalem, alij equi salicem, aut anabasion, alij  
ephhydron.

234.4. Aliqui equition, & alij chedran, alij  
gynon, Romani salicem equinam appellant.

325.1. alij scorpion, alij garganō, Romani cor-  
nulacam, alij bituensa, Daci saliam, Aegyptij  
sober, Aphri achœsim.

325.20. Oxyshœnos aliquibus schœnos levis,  
alijs oxypternos, alijs Solis supercilium, Roma-  
nis iuncus marinus, aut manualis, Aphris chu-  
dua dicitur

326.13. Alijs adocetos, alijs neuris, alijs phry-  
nion, Romanis bouinalis.

326.17. Alijs chrysitis, alijs chrysanthemom,  
nonnullis amaranton, alijs diosporon, Aphris di-  
bath, vel lurchumath, Romanis Iouis barba ap-  
pellatur.

326.26 aliqui chrysspermon vocant, alij da-  
spin,



DIOSCORIDIS

*Spin, alij origanum, alij arcophthalmon, Romani arulariam.*

327.19. *Aliqui chalchitin vocant, alij chalcāthon, alij chalcanthemon, Romani acantham, Hetrusci garuleum, Aphrichurfeten.*

328.8. *Alij trigoniō, alij buniō, alij hierobotanē, alij philtrodotē, Aegyptij pēpsēmp̄te, Magi Iunonis lacrymam, nōnulli mustela sanguinem, alij sanguinem Mercurij, Romani cristam galli uaceam, alii pheriam, alii trixalidem, alii exuperam, aliqui herbam sanguinalem.*

328.20. *Alii erigenion, alii chamelycon, alii sideritin, quidam curitin, alii persephoniō, alii Iouis colum, alii dichromon, alii callesin, alii hipparison, nonnulli demetriada, Aegyptii pemphthen phitham, Pythagoras erysiceptron, Romani cincinalem.*

329.11. *Aliqui chamaesycen, alii gatale, alii ionycha vocāt, Romani pinū triuiam, aut ficū terre, aliqui glandulam, alii tium, alii nonariam.*

329.22. *Aliqui beloniam, alij porphyranter, Romani vaccinium, alij vlcinum vocant.*

330.4. *Nonnulli oxytonō, Romani papaueralem, Aegyptij nanthi.*

330.22. *Papauer satium aliqui chamaesycē, alij papauer rhœada, alij oxytonon appellant, Romani papauer, Aegyptij nanti.*

333.13 *Aliqui paraliō, alij syluestre papauer, alij thalassion, Romani fabulū marinum, Aphri  
sifim*



*sifimacam* vocant.

334.2. Qui hoc papauer hauserit, non alia accident, quàm qui opium ebiberit. Cui eisdem succurritur, auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radicis bibitur cum vino, sanatq; dysenteriam.

334.17. Alij *pythonion*, aliqui *dioscyamon* vocant, alij *adamãta*, alij *adamenon*, alij *hypnoticon*, alij *emmanes*, alij *atomon*, nonnulli *dithiam briõ*, Magi, Pythagoras et Osthane, xeleo, Zo roastrestiphoniõ, Magi *rhapõticiã*, Romani *inanoentariã* aut *apollinare*, Aegyptij *saphtho*, Hetrusci *fabulũ*, Galli *bilinuntia*, Daci *dieliam*.

336.5. Aliqui *cataphysin*, alij *cynoccephalion*, alij *chrystalion*, alij *cynomyã*, alij *psyllerin*, alij *sicelioticon*, Sicuti *comidijn*, Romani *herbã pulicarem* aut *silbacium*, Aphri *vargugũ* appellat.

336.27. Romani *strumum* vocant, alij *cacubalum*, Aegyptij *allelo*, Galli *scubulum*, Aphri *astrismunim* vocant.

338.2. Aliqui *diricion* appellant, alij *strychnon manicon*, alij *dorycnion*, alij *calliada*, Romani *apollinare minorem*, alij *ulticanã herbam*, aut *opsaginem*, Daci *cyclidem*, Pœnicacabum.

338.19. *Strychnonmanicon*, alij *anydron*, alij *pentadryon*, alij *enoron*, quidã *orthogyiõ* vocat.

339.22. Alij *exerãthes*, aliqui *antimnion* aut *antimion*, alij *bombochylon*, nonnulli *minon*, Aegyptij *apemum*, Pythagoras *anthropomor-*



# D I O S C O R I D I S

phon, alij alæten, alij thridaciã, alij cammaron,  
Zoroastres diamoron, aut archinen, Magi he-  
mionos, aliqui gonogeonas, Romani caninum  
målum, alij terrestre målum.

342.18. alij cyamõ leucon, Romani colomestrũ.

343.4. Conion, aliquibus eginos, alijs eihusa,  
alijs apolegusa, alijs dolia, alijs amaurosis, alijs  
paralyfis, nõnullis aphron, quibusdã creidiõ, alijs  
cæten, alijs catechomeniõ, alijs abiotõ, alijs apseu-  
des, alijs ageomoron, alijs timoron, alijs polyano-  
dynos, alijs dardanis, alijs catapsyxis, Osthani  
babathy, Aegyptijs apemphi, Romanis cicuta  
appellatur.

344.8. Aliqui cynanchon appellant, alij par-  
dalianches, alij cynomoron alij cynoetnon, alij  
phaleon, alij cynanchen, alij oligoron, alij hippo-  
manes, alij onistin, alij ophioscorodon, alij cyna-  
ricam, alij elaphoscorodon, Magi paralysin, Ro-  
mani brassicam rusticam aut caninam.

344.20. Alij spongon, alij hemoſtarin, Ro-  
mani rhododendron, Lucani icmanen, Aegy-  
ptijs schimphen, Pœni rhododaphnen dicunt.

346.23. Aliqui elitim vocāt, alij canocerseã,  
alij amelxinen, alij eusinem, alij amorginen, alij  
sucotachos, alij psychuacos, alij melampelon, alij  
citampelon, alij cissamethon, alij anateamenõ,  
Romani volutum laparon, Aegyptij apap, alij  
parthenion, alij sideritin, alij heracleam, nõnulli  
agriam, quidam clibodion, alij polyonymon.



N O T H A.

347.9. *Alij myortochon dicunt, alij myortosplenon, Romani muris auriculam: Pæni labatholabat.*

347.20. *Agriā phacon aliqui, alij epipteron, Romani viperalem, alij iceosmigdonon vocant.*

347.27. *Aixoon maius, aliqui aithales, alij ambrosion, alij chryssiperon, alij Zoophthalmon, alij bubophthalmon, alij stergethron, alij æonion, alij aichryson, alij holochryson, nonnulli chrysanthemon, alij protogonon, alij boron, alij notion: Magi paronychiā, alij chrysitin, Romaniceriā cuspīam, aut Iouis caulem nomināt, alij lealetes, alij sedum maius, Aegyptij pāphanes.*

348.17. *Aixcon paruum, alij petrophyes appellant, alij brotion, alij theobrotion, crubysson, alij chimerinen, alij cerauniam, Romani vitalem, alij semperuium, Aegyptij et iūceltam.*

348.24. *Semperuium quod tenui constat folio, aliqui aixoon paruum, alij petrosphyes, alij aixoon sylvestre, Romani semperuium minus appellant.*

349.2. *Aliquibus cymbalion, alijs scytalion, alijs hortus Veneris, alijs terra vmbilicus, alijs stæchis. alijs stergethron, Latinis vmbilicus Veneris dicitur.*

349.19. *Acalyphen aliqui cnidem, alij adicen, Latini vrticam, Aegyptij selepsion, Dacidyn appellant. Acalyphen etiam alteram aliqui cni-phen, Romani vrticam mollem vocant.*



D I O S C O R I D I S

350.12. Alijs galeobdolon, vel galephos, Aegyptijs atopi, Latinis urtica labeo dicitur.

350.23. Alijs galation, aut gallerion.

351.4. Erigeron à Latinis herbulum, aut senecio vocatur, aliàs erechthites.

351.25. Marinum bryon, aliqui ballarin, alijs iranen, Latini gnomeusilon vocant.

352.14. Aliàs stachyites, apud Aegyptios ethenchis, Latine fatalis dicitur.

352.20. Aliquibus fluuiatilis stratiotes nuncupatur, Aegyptijs tibus, Magis eluri sanguis.

353.11. Phlomon, alijs phlonon, Latini verbasum, alijs pheminalem vocant.

355.8. Arcion alijs prosopida, alijs prosopion, alijs aparinen, Latini personatam, aut lappam appellant.

355.24. Alijs borion appellatur.

355.28. Capnon, aliqui corydalion, aut corion vocant, alijs syluestre corydalion, alijs capnon in hordeis, alijs capniten, alijs marmariten, alijs capnogorgion, alijs cheludonion micron, alijs peristerrion, alijs cantharida, alijs chalcocri, Romani aspium aut fumariam, Aegyptijs enyx, alijs tucin.

356.7. Alijs tripodion, alijs tribolion.

356.12. Aliqui libyon, alijs triphyllon.

356.22. Aliqui telinen, alijs lotum magnum, alijs triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

357.18. Alijs melophyllon, alijs stratioticè, alijs achillion, Latini millefoliū vocant, aliqui supercilium



*cilium veneris, Galli beliocandas.*

357.27. *Alij myrrham, alij conilen vocant.*

358.23. *Aliqui buglossum magnum vocant, Romani spinam mollem.*

359.6. *Ab aliquibus bubonion appellatur, ab alijs asteriscos, alijs asterion, quibusdam hyo-phthalmō, Romanis inguinalis, Dacis rathibis.*

359.19. *Stellares huius radij noctu splēdent, quapropter qui ignari antea non viderunt, esse inane, simulacrū arbitrantur. Medijs saxis & asperis exit: inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhizotomus hæc de ea refert: Si viridis cum axungia vetere tundatur, contra rabio-  
forum morsus, turgentia guttura, proderit, suffitu quoq; serpentes fugat.*

359.27. *Aliqui dasypodion, alij priapeion, alij ion sylvestre, alij cybelion, Romani fetialin, aut murariam, aut violam purpuream vocant.*

360.5. *Aliunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.*

360.16. *Aliqui aton, alij actinen, alij anemosphorō vocāt: magi paradacry, Aegyptij erxoen, Romani scopā regiā, Aphri Zigar, nonnulli thepso*

361.2. *Alio nomine chameleuce, alio cissos acarpos, aut terre corona, aut selinitis, Latine hedera pluuiatica dicitur.*

361.17. *Magi aluri gonon, Osthanes txauu-chi, Aegyptij autuenrinlesor, Romani linguam*



# DIOSCORIDIS

bubulam, alij libanium, Pœni asanaph vocant.

362.2. Alij phyton, alij caballation, alij spli-  
neion, alij scolymon, Romani linguā canis, aut  
caninam appellant.

362.14. Aliqui Zoonychon vocant, alij aēto-  
nychon, alij cemos, alij damnamenē, alij idiophy-  
ton, nonnulli phytobasilam, aliqui crossion, alij  
crossophthoon, Magi sanguinē crocodili, alij cro-  
comerion, Aegyptij daphnænen, Romani miner-  
ciū, alij palladium, alij pneumatū, alij flāmulam.

362.23. Aliqui & id antirrhinon, alij anar-  
rhinon, nonnulli lychnida agriam vocant-

362.29. Nonnulli lychnida agriam appellāt.

363.8. Catanance aliquibus damnacete, alijs  
dionysias, alijs thyrsion, alijs demos, alijs cemos,  
alijs crotion, Magis archaras, alijs arcopus, Ro-  
manis herba filicula, alijs datisca, Dacis caro-  
pithla dicitur.

363.21. Aliqui psychen, alij merida, alij pota-  
mogitona, alij stachyiten, Romani caliumma-  
rem nominant.

364.11. Alij callitrichon, alij trichomanes, alij  
ebenotrichon, alij argion, alij corion enygron,  
Aegyptij epier, Romani cinnamalem, alij terræ  
capillum, alij supercilium terræ, Daci phitho-  
phthethela vocant.

365.4. Aliqui pterion, alij opteron, Romani  
capillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnulli  
& eam adianton appellant.



365.11. Aliqui phasganon, alij antithesion, alij chascanon, alij cheradelethron, alij & hanc aparinam nominant, Latini lappam.

365.24. Aliquibus sitospelos, alij siphon, alij bromos, Romanis auena dicitur.

365.29. Aliqui siphonion, alij acrospelō vocāt.

366.28. Alij epapitis, alij lycanthemon, alij cynosbatō, alij anicetō, alij heliophitō, alij anaticō, alij dyticō, alij helide, Aegyptijs lyisthe, Romanis mergina, Hetruscis radia appellatur.

367.23. Alij hieromyrton, alij myacantha, alij agonon, alij seincos, alij mintha, alij cantangelos, alij anangelos, alij acæron, alij ocneron, alij cinen, alij lichene, alij chamæpitys, alij chamemyrte, Bæotis gyrenia, Magis Herculis genitura appellatur.

368.10. Aliqui idean, alij danaën, alij hippoglotton, alij Zaliā, alij stephanen, alij daphnō, alij samothracicen, alij methrion, alij hypoglossion vocant.

368.19. Daphnoides alypo simile, flos vt nymphae, cuius medium nuci cypressi non dissimile, in quo semē: alij chamedaphnen, alij peplion, alij eupetalon vocant.

368.2. Aliqui & hanc alexandrinam appellant, alij daphniten, alij hydragogen, Romani laureolam, alij lactaginem, Galli vsubin.

369.11. Aliqui ascida vocāt, alij atomon, alij pigatoxacin, Magis sanguinē Herculis, alij polyi-



D I O S C O R I D I S

dos, alij anaphyston, Aegyptij semphia, alij  
vure, Galli laginum, aliqui anepsa.

370.22. Aliqui melanpodion vocāt, alij ecsto  
mon, alij polyrrhizon, alij protion, alij melanor-  
rhizon, alij cyiranion, Magi xomarition, Aegy-  
ptij iseam, alij elaphine, alij cemeleg. Latini ve-  
raturum nigrum, alij saraca, Daci prodierna.

372.10. Aliqui sesamiten, alij sesamin, alij ly-  
cocytalion, alij belleborum album appellant.

372.17. Aliqui coronion, alij sesamon sylvestre.

372.27. Aliqui elaterion vocāt, alij grynon, alij  
balin, alij syncrisin, alij bubalion, alij scopiō, alij  
pherombron, alij peucedanon, alij notion, Roma-  
ni ancetum, alij agrestem, Pœni cufimezar.

375.15. Satiuus cucumer. Cap. Satiui cucume-  
ris trita radix, & drachmæ vnius pondere pota  
in hydromelite, vomitus ciet. Si quis facile secun-  
dum cœnā vomere velit, binis obolis sit cōtentus.

375.16. Alij triphyllon, alij stesion, alij astaphi-  
da, alij phthiroctonon, alij phthirion, alij apan-  
thron, alij polyides, alij pseudopathes, alij arse-  
noten, Aegyptij ibesæden, Romani herbam pe-  
diculariam vocant.

376.4. Aliqui hypopyon vocāt, alij pācranon,  
alij scammonion, alij ihelyterim, Romani feru-  
laginem, alij ferulam sylvestrem, Pœni bæden.

378.17. Aliqui lygon, alij lobon appellant.

379.26. Aliqui narcisson anydron, alij autoge-  
nes, alij bullon emeticon, alij lirion, Romani bul-  
lum



*bum morbitarium dicunt.*

380.16. Alij hippophyes, alij hippophanes, alij hippion, alij echinon, alij peleciton, Romani lap paginem vocant.

381.17. Aliqui sesamon sylvestre vocant, alij seseli cyprion, alij crotona, Aegyptij systhanna, aliqui trixin, magi sanguinem febris, Latini ricinum, alij lupam.

382.5. Aliquibus cometes, alijs gobios.

385.8. Aliqui clema, alij crambion, alij paralion, alij canopicon vocant.

386.11. Aliqui sycen, alij mecona aphroden.

387.5. Alij spumosum papaver vocitant.

387.20. Aliquibus scambonia radix, alijs colophonia, alijs dactylion, Romanis colophonium, Magis apopleumonos, Aegyptijs saniliū dicitur.

389.5. Alij chamelea nigra, alij pyros achnen, alij heraction, alij bdelyram, alij coccon gnidiō, Romani citocacium, nonnulli oleaginem, quidam oleastellum vocant.

389.16. Alij chameleam, alij pyros achnen, alij cestron, aut cneoron vocant.

390.15. Acten aliqui dendron arctu, alij hemeron, Latini sambucum, Galli scobiem, Daci sebam vocant.

390.23. Alijs heliosacte, alijs agria acte, alijs Euboica, Gallis ducone, Daci olma.

392.2. Nonnulli ischiada, alij chamebalanum agria, alij linoxostin, Latini radicem sylvestrē,



D I O S C O R I D I S

Pœni thorpathsadæ appellant.

392.16. Aliquibus colocyntha egos, alijs sicypicra, alijs Alexandrina colocyntha, Zoroastri thymbra, Osthani autogenes, Romanis cucurbita syluatica, Dacis tutrastra dicitur.

393.8. Alij cedæes, Romani inuolucrū vocant.

394.15. Alij ophiostaphylon, alij chelidonium, aut melothron, aut psylotron, aut archexoslin, aut agrostin, aut cedrostin appellant.

395.22. Alij chironion ampelon, alij bucraniō, Romani oblameniam, alij batanutā, alij betisalcā, Daci priadelā, alij pegrinā, Aphri lauother.

396.8. Pterin alij pterion, alij pterineon, alij dasyclonon, alij anasphoron, alij blechnon, alij polyrhizon vocant, Magi hermubain, Romani filicem, alij laculam, alij filisfanariā, Aegyptij asinisanguinem.

396.23. Thelypterin aliqui nymphæam pterin nominant, Romani linguam ceruinam.

397.9. Polypodion aliqui scolopendrion, alij pterin, alij polyrhizon, Latini filiculam vocāt.

398.2. Aliqui pterion, alij nymphæam pterin nominant.

398.21. Alij argyron, alij aritrillin, alij chrysitin, Aegyptij aphlopho, Latini mercurialem masculam, alij tesserculatam, Aphri asumes.

399.6. Aliquibus linozostri, Aphris armas, alijs asumes labon dicitur.

399.14. Aliqui scorpiuron vocāt, alij heliotropen,



pon, alij dialion, alij heliopon, alij scorpioctonō,  
alij sesamon agrien, alij scorpij vram.

400.4. Aliqui scorpiuren vocant.

405.3. Idem adstringit: prodest stomacho qui  
cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit.  
Item ijs qui ilei dolore conflantur: conuenit  
in grauidarum malacia: scriptum auxiliari con-  
stat, cum populatim grassatur pestifera lues. Hu-  
iuscemodi emphacium non nisi post annos mul-  
tos bibi potest.

429.17. Quam alij Medicinam, alij symphy-  
ton, alij idaum, phlomon, alij crestion, alij necta-  
rion vocant.

448.6. Alij larbason, alij gynecion, alij Chal-  
cedonion.

458.20. Alij pecton, l. ephrō, aracton, lonchotō.

505.7. Athenis ionia, in Eubœa sideritis dicitur.

De Rhamno.

Rhamnū si quis eruat silente luna, & secum  
ferat, contra venena & improbos homines pro-  
derit: pecoribus inuandis appenditur: nauigij  
circumponi solet: valet contra capitis dolores &  
laruas.

De Artemisia.

Artemisiam herbā si quis teneat, dum iter fa-  
cit, lassitudinē discutiet: & si in pedibus ferat, be-  
stias et lemures abiget: si sanguis circa artus coa-  
luerit, ramulos ex rosaceo in ulla feruefacito, &  
locum totum oblinito, cum somno indulgendum est:

strang



## DIOSCORIDIS

*Strangulatui vulue mirum in modum auxilium  
tur: vrina stillicidia & opisthotonum leuat.*

### De Pentadactylo.

*Pentadactylum si quis circum corpus portet,  
nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos  
tonsillarum tumores, vnam, articulos sub lingua, ner-  
uorum dolores & dentes, psorā perniciali fame con-  
tractā iuuat: remoratos à partu menses eicit: in-  
fusa manibus ex aqua tepida contra terrores, fa-  
scinū, & laruas, mirum in modum commendatur.  
Vellito herbam cum luna crescit, oriente sole.*

### De Verbenaca.

*Verbenaca recta genitale intendit, sed supina  
exiccat. Recta appensa doloribus oculorum auxi-  
liatur: contra hebetudines eorundem, & capitis  
dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinem  
reficit. Strumas, callosos faucium tumores, sta-  
tim discutit: febrium horrores sanat, si quis so-  
lūm ex aduerso stans ramulos tenuerit.*

### De Dictamno.

*Dictamnū siccātum manibus terito, & re-  
digens in farinam adiecta vini stilla, corpus tan-  
gito: siquidem contra omnes serpentium iniurias  
auxiliatur: vlcera & putrescentes nomas præ-  
purgans explet: adactis corpori aculeis oblini-  
tur, vt presenti sit auxilio: ad lienem & in abdi-  
tis locis vitia inflammatione turgentia, redactū  
in farinam illinito. Herbam vere, magnis aesti-  
bus, autumnūq; eruito.*

De



## N O T H A.

### De Saluia.

*Salvia singultum tuſſimq; diſcutit: omnibus malis vlceribus cum cera & roſaceo ſumpta auxiliatur: lienis dolorem dyſenteriámq; pota cum vino albo pari modo ſanat: ſanguinem excreantibus, potu medetur: ad extrahenda vuluæ onera efficax eſt: peſſimæ mulieres peſſum ex ea ſubiiciunt, vt partus excutiant.*

### De Cupreſſo.

*Cupreſſus herba cõtra raucedines auriculáſq; prodeſt: induratos tonſillarum tumores, aquam inter cuteri, & coxendicum cruciatus perſanat.*

### De Centaurio.

*Centaurium contra inflãmata vitia & pulſantes iëtus valet, fæminis vuluæ malo laborantibus auxiliatur: ſtillicidiÿ vrinæ, calculorúmq; tormëta leuat. Herbam vere oriente ſole legito.*

### De Buphthalmo.

*Buphthalmum creſcente luna legere oportet. Facit autem contra pauores, laruas, & mala medicamenta, faſcinationes, vtpote cùm eas auertat. Radicem ſi quis mandat, dentem expuet, fluxionémq; conſeſtim ſiſtens auxiliatur: quin & ventrem reſoluit.*

### De Pæonia.

*Pæonia herba per æſtus Canicula ante Solis ortũ vellitur: appẽſáq; cõtra venena, faſcinũ, pauores & laruas prodeſt: item cõtra febrem cum horrore veniëtẽ, diurnã nocturnámve, & ad-*

uer



## DIOSCORIDIS

uersus tertianam. Proditur lemures à monte, in quo nascebatur, fugasse.

De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, veneficiorum & fascinationis amuletum est.

De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misceto, & faciē illinito cum ad negotia te cōferes: vegetiores reddit pueros, imo ventri appensa et ad arcēdos pauores nocturnos manu teneto. Contra fascinū, & omnia maleficia prodest: corpus tuetur: cum enim fascinātes recedūt, arescētē ramulum occludit, & cum propius accedūt, aperit.

De Chrysanthemo.

Chrysanthemum si terra ante solis ortum eruat, & collo appendatur, veneficas mulieres omnesq; fascinantes amelitur.

De Eryfimo.

Erysimon cum vino tritum, aduersus ventris dolorem bibitur: si quis grana septem domum iniecerit, rixæ & iurgia concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs hoion dicitur. Frutex est exiguus, minimis folijs cōstans. Bibitur contra omne venenū, & iocineris vitia.

FINIS.

IND



# INDEX OMNIVM

quæ in Dioscoride  
continentur.

A		Adeps omnis	135
<b>A</b> Brotonum	229	Adianton	364
Abfynthium	227	Aegilops	365
Abfynthiũ marinũ	228	Aeris squamma	441
Abfynthiũ Sãtonicũ	229	Aeris flos	440
Acacalis	76	Aerugo rafa	442
Acacia	83	Aerugo scolecia	444
Acacia altera	84	Aes vřlum	439
Acantha,us	223	Aethiopis	354
Acanthium	222	Actites lapis	482
Acanthus fylueſtris	223	Agallochon	25
Acetum	413	Agaricum	211
Acetum è betonica	427	Ageraton	327
Acetum mulſum	414	Agnus	85
Acetum ſcillinum	416	Aiuga	302
Acetum è ſtœchade	427	Alabaſtrites	480
Achillea	319	Alcea	298
Achras	99	Alcibiadion	315
Acida muria	415	Alcyonium	473
Acinos	239	Alisma	299
Acorum	8	Allium	186
Aconitum	342	Aloë	225
Adarces	474	Alfine	347
		Alt	



# INDEX.

Althæa	297	Anisum	249
Alumen	464	Anonis	223
Alumen scissile	ibidem	Anthemis	292
Alus.	309	Anthericum	198
Alysson	271	Antyllis	291
Alypon	393	Antipathes	475
Amaracum	238	Antirrhinon	362
Amaranton	327	Antispoda	439
Ambrosia	282	Aparine	271
Amiantus lapis	481	Aphaca	184
Ammi.	251	Apiastrum	276
Ammoniacon	269	Apios	392
Amomis	20	Apium	253
Amomum	19	Apocynon	344
Ampelitis terra	486	Apollinaris	334
Ampeloprason	186	Apri iecur	121
Amphisbenæ ictus. notæ		Apum ictus curatio	537
531. eius curatio	541	Aqua	412
Amurca	88	Aqua frigida	513
Amygdalæ amaræ	101	Aqua marina	412
Amylum	157	Aqua mulsa	411
Anagallis	205	Arabicus lapis	480
Anagyris	299	Araneus	126
Anchusa	315	Arbutus	101
Androsaces	290	Arcion	355
Androsæmon	301	Arction	354
Anemone	204	Arcturon	ibidem
Anethum	249	Arena	483
Anguium senectus.	115	Argemone	205
		Arg.	



# I N D E X.

Argenti recrementū 449	Atramentū librariū 487
Argenti scoria ibidem	Atramentum sutoriū 458
Argenti spuma ibi. & 510	Atriplex 169
Argētum viuū 456. & 510	Auellana nux 103
Arifarum 198	Auena 156
Aristolochia 214	Auricula muris 209
Armeniaca mala 98	Auri pigmētum, siue ar-
Armenius lapis 454	senicon 463. & 510
Armoracia 167	B
Aron 197	<b>B</b> Accæ lauri 71
Arthenogonon 286	<b>B</b> Baccharis 240
Artemisia 281	Balaustium 94
Arundo: vide Harundo	Ballote 276
Asarum 13	Balsamum 22
Asclepias 272	Barbula hirci 183
Aschyron 301	Basilisci ictus notæ 533.
Asininum iecur 121	eius curatio 543
Asini vngula 120	Bdellium 55
Asius lapis 476	Beta 171
Aspalatus 24	Betonica 304
Asparagus 173	Bitumen 66. & 67
Asplenon 290	Blata pistrinaria 120
Aspidis ictus notæ 533.	Bliton 168
eius curatio 543	Botrys 282
Aster Atticus 359	Brassica 169
Astragalus 329	Brassica marina 171
Athamanticum 8	Brassica sylvestris 170
Athera 155	Britanica 305
Atractylis 272	Bromus 365

P



# INDEX.

Brion	25	curatio morfus eius	
Bryonia	594	525. ab eo morforum	
Buccina	110	victus ratio	527
Buglossum	361	Cannabis	298
Bulbus esculentus	199	Cantharides	125
Bulbus vomitorius	200	Capnos	355
Bunion	360	Capparis	202
Buprestis	125. & 499	Caprae vngula	121
Buphthalmos	294	Caprinum iecur	ibid.
Butyrum	131	Cardamomum	10
Butyri fuligo	ibidem	Cardamina	175
C		Carduus	222
Acacia	360	Carpasi succus	503
Canchrys	260	Cariotæ	92
Cadmia	433	Carum	249
Cæcilie ictus notæ	531.	Caseus	130
curatio eadem quæ vi-		Casia	16
peræ morfus.		Castanea	90
Calamus odoratus	21	Castorium	117
Calamintha	235	Catanance	363
Calcifraga	393	Caucalis	181
Caltha	327	Cedria	70
Calx	510	Cedrites	71
Calx viua	471	Cedromela	98
Cancamum	26	Cedrus	69
Cancri	113	Celticum nardum	12
Canis rubus	77	Cenchri ictus notæ	532.
Canis rabidi iecur	121	eius remedia	542
Canis rabiosi signa	524	Centaurei magnum	216
		Cent	



# INDEX.

Centaurium minus	217	327	
Cæpa	185	Chryfocolla	454
Cepæa	299	Chryfocome	326
Cera	151	Chryfogonon	ibidem
Cerafia	96	Cicadae	123
Ceraftæ ictus notæ	533.	Cicer fatium	159
eius cu ratio	542	Cicer arietinum	ibid.
Cerui genitale	120	Cicer fylueftre	160
Ceruinum cornu	124	Cichorion	178
Ceruffa	452. & 507	Cici	381
Ceftrum	304	Cicuta	343. & 503
Chalcitis	459	Cimices	119
Chamæ	111	Cimolia	485
Chamæacte	390	Cinis farmenritius	472
Chamæciffos	361	Cinabaris	455
Chamædaphne	369	Cinnamomum	17
Chamædrys	274	Cionia	110
Chamæleo albus	118	Circæa	283
Chemæleo niger	219	Circium	358
Chamæleuce	361	Ciftus	78
Chamæpitys	302	Citria mala	98
Chamæfyce	387	Clematis	307
Chamælea	389	Clinopodion	273
Characias tithymal <sup>9</sup>	382	Clymenon	310
Chelidonium	207	Cnicus	398
Chelidoniũ minus	208	Coagulum	134
Chia terra	485	Cocum gnidion	390
Chondrylla	178	Cocum infectoriũ	324
Chryfanthemon	292. &	Cochleæ	112



# INDEX.

Cœreleus	455	Croton	381
Colchicon	345	Cucurbita	179
Colligendorum ratio	4	Cucumis sativus	179
Colocasia	161	Cucumis sylvestris	372
Colocynthis	392	Cuminum sativum	250
Colymbades	87	Cuminum sylvestre	ibi.
Cōmunis curatio in om-		Cunila	231
nes ictus virulētos	533	Cupressus	68
Conyza	684	Curni	154
Corallium	475	Cyclaminus	194
Coriandrum	251.&502	Cyclaminus altera	196
Coria veteramētaria	121	Cydonomeli	419
Coriarius frutex	91	Cynia	399
Coris	302	Cinocrambe	ibidem
Coronopus	176	Cinoglosson	362
Cornu cerui	124	Cynoforchis	287
Cornus	100	Cyparissias tithymalus	
Coruda	173		384
Cos Naxia	483	Cyphi thiiniama	26
Costus	20	Cypirus	9
Cotonea m̃ala	97	Cytinus	94
Cotyledon	349	Cytisus	356
Cratægonon	286		
Crimnon	155	D	
Crithmum seu crithamō		Damascena pr̃ia	100
	176	Damasonium	299
Crocodilion	220	Daphnoides	368
Crocomagma	27	Daucus	257
Croçum	ibidem	Delphinium	ibid.
		Dendroides tithymalus	
			384



# INDEX.

384		Elæomeli	32
Deuteria	409	Eleoselinum	253
Dictamnium	233	Elichryson	327
Dictamnium Cretēse	234	Empetron	393
Diphryges	462	Ephemeron	346. & 500
Dipsacum	220	Epimedion	313
Dipsadis morsus notæ		Epimelis	99
532. eius curatio	541	Epipactis	355
Dorycnion	339. & 501	Epirotica mālā	98
Draba	190	Epithymum	393
Draco marinus	113	Equisetum	323
Draconis marini ictus re		Equorum lichenes	121
media	539	Eretria terra	483
Dracunculus	196	Erica	75
Dryini ictus notæ	532.	Erinaceus	109
eius curatio	541	Erinei	107
Dryopteris	397	Erinum	317
Dulcis radix	216	Eruca	181
E		Erucae olerum	125
E Benus	80	Erucae pinorum	125. &
Ebulum	390	498	
Ebur	124	Eruum	163
Echinus	109	Eryngium	225
Echion	316	Erysimon	190
Elaphoboscon	255	Erythrodanon	296
Elaterion	373	Eupatorium	321
Elatine	320	Euphorbium	266
Electrum	73	F	
Elelisphacos	234	F Aba	162

P 3



# INDEX.

Faba Aegyptia	161	G	
Fæx	471	Agatas lapis	479
Fagus	90	Galactites lapis	480
Farina crassior	155	Galaxias	ibidem
Fel	143	Galbanum	267
Ferri rubigo	445	Galerita	123
Ferula	261	Galion	356
Festuca	365	Galiopsis	ibidem
Fibrini testes	116	Galla	90
Ficus	105	Gallina	122
Filicula	397	Gallinæ cerebellum	ibi.
Filix	396	Garum	119
Filix fœmina	ibidem	Genitale cerui	120
Fimum	145	Gentiana	213
Flos æris	440	Geranion	283
Flos salis	469	Geodes lapis	483
Flos punicæ	94	Gingiberis	192
Flos sylvestris punici	ib.	Gingidion	181
Fœniculum	256	Gith	273
Fœniculum erraticū	ibi.	Gladiolus	313
Fœnum græcum	158	Glans	89
Fraxinus	72	Glans Iouis	90
Fuligo è myrrha, resina,		Glans Sardiana	ibidem
styrace	59	Glans vnguentaria	379
Fuligo liquidæ picis	65	Glastum satium	209
Fuligo pictoria	486	Glastum sylvestre	210
Fuligo thuris	59	Glaucium	270
Fumaria	355	Glaux	366
Fungi	345. & 508	Gluten piscium	270
		Glut	



# INDEX.

Glutinum	ibidem	Heliotropium magnum	
Glycyfide	294		399
Gnaphalium	283	Heliotropiū parū	400
Gaidium granum	389	Helleborum album	369
Gobius	118	Helleborum nigrum	370
Gramen	317	Helxine	320.& 346
Gramen arūdinaceū	ibi.	Hemerocallis	285
Gramen Parnasi	ibid,	Hemionitis	291
Grossi	107	Herba Sabina	69
Gummi amygdalæ	102	Hieracium magnum	252
Gummi cerasi	96	Hieracium paruum	ibi.
Gypsum	472.& 503	Hippace	131
H		Hippocampus	110
<b>H</b> Aematites	477	Hippoglosson	362
Hæmorrhoi ictus		Hippolapathon	168
notę 532.ei <sup>9</sup> curatio	542	Hippomarathon	256
Halica	156	Hippophaës	380
Halicacabon solanū	338	Hippohæston	381
Halimus	76	Hippopotami testes	116
Harundo	74	Hippofelinon	254
Harundo Cypria	ibid.	Hirci barbula	183
Harundo vallatoria	ibi.	Hirculus	12
Hastula regia	198	Hirundines	124
Hedera	206	Hirudo	512
Hedysaron	289	Holostium	310
Helcysma	449	Hordeum	153
Helenium	28	Horminum	288
Helenium alterum	29	Hyacinthus	329
Helioscopius	384	Hydromeli	412



# I N D E X.

Hydromelon	419	Iuncus	325
Hydropiper	193	Iuncus odoratus	21
Hyoscyamus 334.&	504	Iuniperus	68
Hypecoon	334	Ius piscium	119
Hypericon	300	Ixia	218
Hypocistis	78	L	
Hyssopum	230	L Abram Veneris	220
I		L Labrusca	402
I Aspis	481	Lac	128
I Iberis	108	Lac coagulatum	509
Ibiscum	297	Lac humanum	130
Ichthyocolla	270	Lac schiston	129
Idæa radix	323	Lactis serum	ibid.
Iecur apri	121	Lacerta	127
Iecur asininum	ibi.	Lactuca fatiua	180
Iecur canis rabidi	ibi.	Lactuca syluestris	ibi.
Iecur caprinum	ibi.	Ladanum	79
Iecur mergi	ibidem	Lagopus	312
Illecebra	348	Lampfana	168
Ilex	90	Lana	132
Indicum	455	Lana cremata	ibidem
Inguinalis	359	Lanaria herba	194
Intybus	177	Lappa	365
Iouis glans	90	Lapathum	167
Irio	190	Lacer	264
Iris	6	Laserpitium	ibidem
Isopyron	359	Lathyris	385
Iudaicus lapis	481	Lauer	175
Iuglandes nuces	102	Laurus	71
		Laurus	



# INDEX.

Laurus Alexandrina	368	Lithospermon	295
Lauri baccæ	71	Locustæ	123
Lemnia terra	457	Lolium	157
Lens	162	Lonchitis	296
Lens palustris	347	Lora	406
Lentiscus	61	Lotus arbor	99
Lentiscina refina	64	Lotus aegyptia	357
Leontopetalon	272	Lotus sylvestris	356
Leontopodion	363	Lotus vrbana	ibid.
Lepidium	203	Lupinus	164
Leptocarya	103	Lychnis coronaria	275
Lepus marinus 115 & 511		Lychnis sylvestris	ibid.
Lepus terrestris	115	Lycium	82
Leucacantha	224	Lycopsis	316
Leucanthemon	292	Lygos	86
Leucas	274	Lyfimachia	306
Leucoion	285		
Lichenes equorum	121	M	
Lichen	326	M Acer	73
Lignorum marcor	73	M Mænæ	118
Ligusticum	246	Magnès	479
Ligustrum	77	Magudaris	365
Lilium	275	Malabathrum	15
Lilium sylvestre	285	Malicorium	94
Limonion	212	Malua	168
Lingua bubula	361	Malum	97
Linozostis	398	Malum Armeniacum	98
Linum	159	Malum cotoneum	97
Lithocolla	482	Malum dulce	98
		Malū Epiroticum	ibid.

P 5



# INDEX.

Malum Medicum	ibid.	Memphites	481
Malum orbiculatū	ibid.	Mentha	235
Malum Persicum	ibid.	Menthastrum	ibid.
Malum præcox	ibid.	Meon	8
Malum punicum	93	Mercurialis	398
Malum sylvestre	ibid.	Mergi iecur	121
Mandragoras	339.& 504	Mespilus	99
Manna thuris	58	Metopion vnguentū	49
Marcor lignorum	73	Milium	156
Maron	239	Millefolium	357
Marrubium	277	Millepedæ	120
Marrubium nigrum	276	Misy	460
Mastiche	61	Mituli	III
Meconium	504	Moly	243
Medica	184	Molybdæna	448
Medica mala	98	Molybdoides lapis	448
Medion	313	Morochthus	480
Medulla	142	Morus	103
Mel	149	Mullus	116
Mel heraclion	502	Mulsam	411
Melampsythium	462	Muralis herba	346
Melanteria	460	Muria	469
Melanthium	263	Mures	128
Melia terra	486	Muris auricula	209
Melilotos	239	Mus araneus	127
Melimela	98	Muris aranei ictus notæ	
Melissophyllon	276	531. eius curatio	539
Melitites lapis	480	Muscus	25
Melomeli	419	Muscus marinus	351
		Must	



# I N D E X.

Mustela	117	Nymphæa	289
Myagron	358	O	
Myosotis	209	O Chra	455
Myrica	75	O Ocymastrum	316
Myrrha	52	Ocymum	182
Myrrha Bœotica	54	Oenanthe	284. & 403
Myrrhis	357	Oesypum	133
Myrtidanum	96	Olea sylvestris	86
Myrtus sativa	95	Oleaster	ibidem
Myrtus sylvestris	367	Oleæ ethiopice lacrima	88
N		Olei vires	29
N Aptha	67	Oleum amygdalinum	33
Napus	146	Oleum balaninum	34
Narcaphthon	25	Oleum cicinum	32
Narcissus	379	Oleum cnicinum	34
Nardi genera	10	Oleum è gnidio grano ibi.	
Nardum Celticum	12	Oleum hyoscyaminum	34
Nardum montanum	13	Oleum laurinum	35
Nardinum unguentum	51	Oleum lentiscinum	36
Nasturtium	189	Oleum mastichinum	ibid.
Natricis ictus notæ	532	Oleum melanthinum	34
eius curatio	542	Oleum melinum	98
epeta	235	Oleum myrteum	35
Nerion	344	Oleum oliuæ sylvestris	30
Nitrum	469	& 88	
Nitri spuma	470	Oleum omphacinum	29
Nux auellana	103	Oleum picinum	63
Nux iuglans	102	Oleum raphaninum	34
Nux pinea	60	Oleum Sicyoninum	31
		Oleum	



# INDEX.

Oleum finapinum	34	Othonna	208
Oleum styracinum	55	Ouorum natura	122
Oleum terebinthinũ	36	Oui candidum	ibid.
Oliuæ colymbades	87	Oxalme	415
Oloſchœnos	325	Oxylapathum	167
Olufatrum	254	Oxymyrſine	367
Omphacium	404	P	
Omphacomelites	419	P Aederota	223
Onagra	358	P æonia	294
Onitis	231	Paliurus	76
Onobrychis	300	Palma	92
Ononis	223	Palma elate	93
Onofma	289	Palmaæ Thebaicæ	92
Onyx	III & 480	Panaces Aſclepij	245
Ophioſcorodon	187	Panaces Chironium ibi.	
Ophites lapis	482	Panaces Heracleum	243
Opium	331	Pancration	201
Opobalfamum	22	Panicum	156
Opopanax	243	Papauer corniculatum	
Orbiculata mâla	98	333 & 505	
Oreofelinon	253	Papauer erraticum	330
Origanum	231	Papauer fatium	ibid.
Origanũ ſylueſtre	ibid.	Papauer ſpumeum	334
Ornithogalum	183	Pappi	512
Orobanche	182	Papyrus	74
Oryza	156	Paralios	384
Oſſifragus	123	Pardalianches	341
Oſtracites	483	Paronychia	326
Oſyris	366	Parthenium	293
		Paſ	



# I N D E X.

Passum	406	Phycus marinus	352
Pastinaca herba	247	Phyllitis	278
Pastinaca marina	115	Phyllon	686
Pastinacæ marinæ ictus		Phyteuma	362
notæ 531. eius curatio		Picea	59
339		Picis liquidæ fuligo	65
Pedicularia herba	375	Pineæ nuces	60
Pelecinon	289	Pinorū erucæ 125. &	498
Peplis	386	Pinus	59
Peplos	ibid.	Piper	191
Pepo	179	Piscium ius	119
Periclymenon	311	Pissasphaltos	67
Peristereon	328	Pisselæon	65
Persea	108	Pistacia	102
Perfica mâla	98	Pityusa	385
Personata	355	Pix liquida	64
Petasites	ibid.	Pix sicca	66
Petroselinum	253	Plantago	173
Peucedanum	261	Platanus	72
Phalangium	278	Plumbago	448
Phalangij morsus	notæ	Plumbum elotum	446
530. eius curatio	538	Plumbum vstum	ibid.
Phalaris	295	Plumbi recrementū	447
Pharicon	506	Pnigitis terra	485
Phasiolus	163	polemonia	308
Phœnicobalanus	92	Polion	279
Phœnix	322	Polycnemon	273
Phrygius lapis	476	Polygala	366
Phu	14	Polygonaton	307
		Polyg	



# INDEX.

Polygonon	306	Pyrites	477
Polypodion	397	Pyrorum genera	99
Pompholyx	435	Q	
Populus alba	72	Q Vercus	89
Populus nigra	ibid.	Q Quinquefoliũ	321
Porrum capitatum	184	R	
Portulaca	172	R Adicula	194
Potamogeton	352	R Radix	166
Poterion	222	Radix dulcis	216
Propolis	152	Radix sylvestris	167
Prunus, pruna	100	Rana	117
Pseudobunion	360	Rana palustris	511
Pseudocasia	16	Ranunculum	203
Pseudocinnamomum	19	Rapum	165
Pseudodictamnium	234	Recondendorum ratio	5
Pforicon	459	Recrementũ argẽti	449
Psychotrophon	304	Resinæ variæ	63
Psyllion	336. & 502	Resina lentiscina	64
Ptarmica	193	Resina liquida è pinu &	
Pulegium	232	picea	63
Pulegium sylvestre	233	Rha	213
Pulicaria	336	Rhamnus	78
Pulticula	155	Rhaphanus	166
Pulmones animalium	120	Raphanus sylvestris	167
Pumex	466	Rhaponticum	213
Purpura	110	Rheon	ibi.
Pygnoconon	391	Rhodia radix	323
Pyrafter	99	Rhododendron	344
Pyrethrum	258	Rhus	91
		Ric	



# INDEX.

Ricinus	381	Salix	86
Rosa	81	Salvia	234
Rosei pastilli	ibidem	Sambucus	390
Rosmarinus	258	Samia terra	484
Rosmarinum coronariū		Samius lapis	ibid.
260		Sampfuchum	238
Rubeta	511	Sandaracha	463. & 510
Rubia	296	Sandix	453
Rubigo ferri	445	Sanguinaria	306
Rubrica fabrilis	457	Sanguinaria foemina	307
Rubrica Sinopica	ibid.	Sanguis	144
Rubus	315	Sanguis tauri	509
Rubus canis	77	Sapa	406
Rubus Idæus	320	Sapphirus	481
Rumex	167	Sarcocolla	269
Ruscum	367	Sardianæ glandes	90
Ruta	240	Sardonias	503
Ruta sylvestris	242	Sarmentitius cinis	472
S		Satureia	237
Sabina herba	69	Satyrion	288
Saccharum	150	Satyriō erythroniō	ibi.
Sacra herba	328	Scammonia	387
Sagapenum	266	Scandix	181
Sal	467	Schistum lac	129
Salis flos	469	Schistos lapis	479
Salis spuma	468	Scilla	200
Salamandra	126. & 499	Scincus	127
Saliuaria	258	Scolopendra	114
Saliunca	12	Scolopendræ ictus notæ	530



# I N D E X.

530. eius curatio	538	Seseli Creticum	ibid.
Scolymos	222	Seseli Peloponense	ibid.
Scordion	280	Setanium	99
Scorodoprasum	188	Sicyonium oleum	31
Scoria plumbi	447	Sideritis	318
Scorpioides	400	Sidion	94
Scorpius marinus	113	Siligo	155
Scorpius terrestris	ibid.	Siliquæ	97
Scorpij ictus notæ	530.	Silphium	264
eius curatio	538	Silurus	118
Securidaca	289	Silybum	379
Sedum magnum	347	Sinapi	188
Selenites lapis	481	Sion	175
Selinusia terra	485	Siser	167
Semen	155	Sison	248
Semperuiuum	347	Sisymbrium vtrūque	175
Semperuiuū minus	348	Sitania	153
Senecta anguium	118	Smarides pisces	118
Senecio	351	Smilax 183. & 343. &	503
Sepia	115	Smilax aspera	366
Seps	127	Smilax lævis	367
Seris	177	Smyris lapis	483
Serpyllum	237	Smyrnion	254
Sertula campana	239	Solanum hortenfe	336
Serum lactis	129	Solanum manicum	338
Sesama	157	Solanum somniferū	ibi.
Sesamoides	372	Sonchus	177
Seseli	247	Sorba	100
Seseli Aethiopicum	248	Sory	461
			Spar



# INDEX.

Sparganion	314	Struthia cotonea	98
Spartion	378	Struthion	194
Spatha	93	Styrax	54
Sphondylion	260	Succinum	73
Sphragis ægos	458	Suillus pulmo	120
Spina acuta	77	Suillus talus	124
Spina alba	221	Sulphur	465
Spina Arabica	ibid.	Sycomorus	104
Spongiæ	474	Symphyton	309
Spongiarum lapides	482	T	
Spuma nitri	470	Talus suis	124
Spuma salis	468	Tamarix	75
Spuma argenti	449. & 510	Taxus	343. & 503
Squamma æris	441	Tauri sanguis	509
Squamma exacie decussa	442	Telephion	210
Stachys	277	Tellinæ	111
Staete	50	Terebinthus	62
Staphis agria	375	Terebinthina	ibidem
Stercus ferri	445	Terra	483
Stibium	448	Terra fornacum	486
Stimmi	ibidem	Testæ	485
Stœbe	310	Testiculus canis	287
Stœchas	230	Teucrion, Teucris	274
Stomoma	442	Thalassomeli	413
Stratiotes	352	Thalictron	351
Stratiotes millefoliū ibi.		Thapsia	376
Strigmēta balnearum	31	Thelygonon	286
		Thlaspi	189
		Thracias lapis	479

Q



# INDEX.

Thunnus	119	V	
Thus	56	V	Enenata 513
Thuris cortex	58	V	Veneris vmbilicus
Thuris fuligo	59		349
Thuris manna	58		Veratrum album 369
Thyites lapis	480		Veratrum nigrum 370
Thymelæa	389		Verbascum 353
Thymoxalme	415		Verbenaca 328
Thymus	236		Vermes terreni 127
Tilia	78		Vesparū ictus curatio 537
Tithymali	382		Vesicaria 337
Tordylion	248		Vetonica 305
Torpedo piscis	114		Victus ratio in morsura
Toxicon	506		biofi canis 527
Tragacantha	224		Vimen 86
Tragium	324		Vina marina 417
Tragoriganum	232		Vina picata 424
Tragos	155. & 325		Vina resinata 423
Tribulus	311		Vini natura 405
Trichomanes	365		Vinum abiegnum 423
Trifolium	278		Vinum abrotonites 428
Trimestria	152		Vinum absynthites 228
Triphyllon	278		& 425
Tripolion	363		Vinum acorites 430
Trissago	274		Vinum adynamon 410
Triticum	152		Vinum anethinum 431
Tuber	183		Vinum apiites 419
Tussilago	281		Vinum aromatites 428
Typha	283		Vinum asarites 430
			Vin



# INDEX.

Vinum bunitēs	427	Vinum myrsinites	421
Vinū calaminthites	428	Vinum myrtites	420
Vinum catorchites	422	Vinum à nardo syluestri	
Vinum cedrinum	423		430
Vinum cedrites	424	Vinum nectarites	429
Vinum cestrites	427	Vinum œnāthinum	419
Vinū chamædryites	426	Vinum omphacites	409
Vinum è chamælea	431	Vinum palmeum	421
Vinū chamapityinū	ibi.	Vinum organites	428
Vinum è coniza	428	Vinum panacites	430
Vinum cupressinum	423	Vinum phthorion	431
Vinum cydonites	418	Vinum è petroselino	ibi.
Vinum daucites	430	Vinum picatum	424
Vinum dictamnites	427	Vinum pineum	423
Vinum è flore salis	431	Vinum è pipere	429
Vinum helleborites	432	Vinum è pulegio	428
Vinum hyssopites	426	Vinum refinatum	423
Vinum ex iride	429	Vinum rhodites	420
Vinum iuniperinum	423	Vinum rhœtes	ibid.
Vinum laurinum	ibid.	Vinum saluiatum	430
Vinum lentiscinum	421	Vinum è satureia	428
Vinum mandragorites		Vinum scammonites	433
	432	Vinum scillinum	417
Vinum marathrites	431	Vinum selinites	431
Vinum è marrubio	427	Vinum stœchadites	426
Vinum melites	418	Vinum strobilites	423
Vinum melitites	410	Vinum è sycomoris	422
Vinum melomeli	429	Vinū è Syriaca nardo, cel	
Vinum è myrrha	429	tica, malabathro	429

Q 2



# INDEX.

Vinum terebinthinum		Vng.hedychroon	45
421		Vnguen.iasminum	52
Vinum thymites	428	Vnguentum irinum	46
Vinum è thymelæa	431	Vnguen.jilinum	42
Vinū tragoriganites	427	Vng.malabathrinum	52
Viola alba	285	Vnguen.megalinum	49
Viola purpurea	359	Vng.melinum	39
Viperæ ictus notæ	531.	Vng.mendesium	50
eius curatio	540	Vng.metopion	49
Viperinæ carnes	114	Vng.narcissinum	44
Viscum	270	Vnguen.nardinum	51
Vitis alba	394	Vng.ocyminum	41
Vitis nigra	395	Vng.œnanthinum	39
Vitis sylvestris	397	Vng.onychinum	45
Vitis vinifera	401	Vng.rosaceum	37
Vitex	85	Vng.sampsuchinum	40
Vlmus	73	Vng.styracinum	45
Vmbilicus Veneris	349	Vng.fusinum	42
Vnedo	101	Vng.telinum	40
Vnguentorum ratio	36	Vngula asini	120
Vng.abrotoninum	41	Vngula capræ	ibidem
Vng.amaracinum	48	Vnguis odoratus	111
Vng.anethinum	42	Vrina	148
Vnguentum butyrinū	45	Vrtica	349
Vng.cinnamominum	50	Vstio contra venenatos	
Vnguen.crocinum	44	ictus	526
Vnguentū cyprinum	45	Vua	402
Vnguen.elatinum	38	Vua passa	403
Vng.gleucinum	48	Vulpinus pulmo	120
			X2m



I N D E X.

<b>X</b>		<b>Xyris</b>		314
<b>X</b>	Anthion	365	<b>Z</b>	
	Xyphion	313	<b>Z</b>	Ea, seu semen 155
	Xylebalsamon	23		Zopiffa 66
	Xylocinnamomum	18		Zythum. 154

F I N I S.

I N D E X N O M E N C L A T I O

*num, quibus officinae Sepplasiariorum, & Herbarij nostri temporis utuntur.*

<b>A</b>		Berberis	77		
<b>A</b>	Cacia	83	Berula	175	
	Agnus castus	85	Bisinalua	297	
	Agrimonia	321	Borago	361	
	Alcanna	77	Branca vrsina	223	
	Alkekengi	337	Bruscus	367	
	Aloë	25	Bryonia	394	
	Apium	253	Buglossa	358	
	Apium rifus	283	<b>C</b>		
	Aphroditos	198	<b>C</b>	Alamentum	235
	Arabis	190		Camomilla	292
	Artichault	222		Capillus Veneris	364
	Aspergula	271		Caprifolium	311
<b>B</b>				Cartamus	398
<b>B</b>	Alfamita	175		Cataputia maior	1381
	Bardana	355		Cataputia minor	385
	Basilicon	182		Cauda equina	323

Q 3



# INDEX.

Centinodia	306	Hermodactylus	345
Cerefolium	131	I	
Ceterach	290	I Arus	197
Cheiri	285	I ringus	225
Coloquintida	392	I ua arthritica	302
Consolida maior	309	I usquiamus	334
Cornu cerui	176	L	
Crassula maior	210	L Acca	26
Cucumer asininus	372	L Lapatium	167
<b>D</b>		Lappa maior	355
<b>D</b>		Lappa minor	365
Ragaganthum	224	Laureola	368
<b>E</b>		Lenticula aquæ	347
Nula campana	28	Lilium conuallium	346
Eupatorium vulga-		Linaria	366
tum	298	Lingua hircina	316
<b>F</b>		Liquiritia	216
Aba inuersa	210	M	
Filipendula	284	M Aluauiscus	297
Flammula	308	M Malum granatū	93
Fumus terræ	355	Mastix	61
<b>G</b>		Matricaria	293
Allitrichum	288	Matrifylua	311
Genista	378	Melissa	276
<b>H</b>		Mezereon	389
Edera terrestris	361	Milium solis	295
Hepatica	326	Millefolium	352
Herba Iudaica	318	Morsus gallinæ	347
Herba Simeonis	298	N	
Herba tetrahil	318		




# INDEX.

N		Scariola	177	
N	Asturtium aquati-	Scrofularia minor	208	
	cum	Sicla	172	
Nenuphar		Sigillum Salomonis	307	
O		Siler montanum	247	
	Robus	Solatrum	336	
P		Sparagus	173	
P	Apauer cornutum	Spelta	155	
	Papauer rubrum	Squilla	200	
Parietaria	346	Squinantum	21	
Perforata	300	Stichas Arabica	230	
Perficaria	286	Stœchas citrina	327	
Pes columbinus	283	Sumach	91	
Petroselinum	153	T		
Piperitis	203	T	Amariscus	75
Plantago aquatica	299		Tapfus barbat <sup>9</sup>	353
Polytrichon	365	Terpentina		62
Prasinum fætidum	276	V		
Pulicaria	284	V	Ermicularis	348
R			Vicia syluestris	184
R	Estabouis	Vineam peruincā	307	
	Reuponticum	Tirga pastoris	220	
Rostrum porcinum	177	Vngula caballina.	281	
Rubia tinctorum	296	FINIS.		
S				
S	Aponaria			
	Satyrion			

Q 4







# CVRATIONVM

## MORBORVM IN

### DIOSCORIDE

*contentarum*  
*Index.*

#### ABSCESSVM

remedia.

**M** El  
Cucurbitæ  
Thlaspi      Mentha  
Viscum  
Bechion siue Tussilago  
Pentaphyllon  
Buglosson.

#### ABORTVM

facientia.

Asparagus      Arisaron  
Ampeloleuce  
Hedysaron  
Populus alba  
Oxyacanthos  
Coagulum  
Brassica satiua  
Cyclaminos  
Dracunculus duplex  
Onosma      Elaterium  
Scammonium  
Thelypteris  
Vinum phthorion, siue  
    abortiuum  
Vinum helleborites  
Coniza.

#### ABORTVS

remedia.

Sabina      Galbanum

#### ACONITO

contraria.

Balsamum  
Morus  
Lac schiston  
Coagulum  
Chamæpitys  
Vinum in communi  
Scoria, siue recremen-  
    tum ferri.

Diosc. lib. 6. cap. 7.

#### ACVLEOS ex-

trahentia.

Vide, spicula corpori  
    infixa extrahentia.

#### ACVLEATORVM

ictus remedia.

Laurus  
Malua  
Sisymbrium  
Anisum  
Althæa  
Oxalme  
Vinum thymite

Q s



# INDEX

- Adipam medelæ  
Diofc. lib. 2. cap. 68.
- ADVRENTES  
medicinæ.
- Buprestis  
Cantharides  
Pityocampæ  
Salamandra.
- ADVSTIONVM  
remedia.
- Vide, Ambustorum re-  
media.
- ÆGYLOPIÆ  
remedia.
- Asarum Myrtus  
Iuglans Oryza  
Malua Plantago  
Myosota, vel myosotis  
altera  
Baccharis Anthemis  
Strychnon satium siue  
Solanum hortense  
Aegilops  
Vua ænanthe Alica.
- ALARVM virus  
extinguentia.
- Myrrha Myrtus  
Scolymos, siue Car-  
duus Alumen.
- ALGORIS RE-  
media  
Laurinum oleum  
Ocimum vnguētum  
Cinnamomum  
Aristolochia terra  
Abrotonum
- Vinum scilliticum  
Elcomel, vel Elecomeli.  
ALLII acrimoniam  
extinguentia.  
Ruta.  
ALOPECIÆ mor-  
bi remedia.  
Harundo Iuglans  
Anellana  
Erinaceus terrestris  
Hippocampus  
Rana Locusta  
Adeps Fimum  
Rhapanus Beta  
Cape Milium  
Sinapi Cyclaminus  
Asphodelus  
Batrachion  
Myosotis  
Nympha  
Cynoglosson  
Adianton Thapsia  
Aerugo ferri  
Sandaracha  
Halcyonium Cotes  
Cinis vngularum capri  
narum
- ALVVM con-  
turbantia.
- Eruum Orobus  
Brassica sativa  
Allium Capparis  
Peplus Vux recentes  
Vinum dulce  
Aqua maris Flos salis.  
ALVVM soluentia  
atque



# CVRATIVVS.

atque purgantia.		Brassica marina	
Afarum	Crocus	Malua	Blitum
Crocomagma		Asparagos	
Oleum amygdalinum		Porrum	Cepe
Oleum cicinum		Struthion	Zinziber
Oleum balaninum		Cyclaminos	Scilla
Oleum cnidium		Bulbus esculentus	
Olea Aethiopica		Agaricum	Aloë
Fagus	Galla	Absynthium seriphium	
Faba Thebaica		Hyssopum	
Siliquæ		Ammoniacum	
Mespilus	Cornus	Phyllitis	Cestron
Ficus Aegyptia		Scordion	
Caprificus		Chamæpitys	
Cerasia	Melimela	Androsæmon	
Citrea mala	Pruna	Papauer ceratitis	
Amygdalæ amaræ		Vrtica	Cynoglosson
Morus	Ficus	Spartum	
Tellinæ Chamæ		Balanus myrepfica, siue	
Iuncus odoratus		glans vnguentaria	
Cochleæ terrestres		Hippophaës	
Sepiæ	Silurus	Characias	Linozostis
Pisces saxatiles		Lathyris	Quercus
Lac	Lac schistum	Chamæsyce	Cici
Butyrum	Medulla	Scammonium	
Fel	Finum	Ampeloleuce	
Tragus	Linum	Thelypteris	Passum
Lens	Phaselus	Melicratum	
Rhaphanus		Vinum Albanum	
Lapathum		Vinum Lesbium	
Masturtium		Coccimela	
Eruum	Eruca	Vinum melitite	
Scandix	Laetuca	Thalassomeli	
Cucumis		Vinum absynthite	
Cucurbita	Atriplex	Vinum belleborite	
Brassica sativa		Vinum scammonite	
		Rub	



# INDEX

Rubrica sinopis.		Aloë	Hæma
ALVVM fistentia.		Ruta	Anisum
Aspalathus		Orchis serapias	
Mastichinum		Pæonia	Althæa
Laurinum		Polygonon mas	
Populus nigra		Lagopus	
Populus picca		Clematis daphnoides	
Paliurus		Xyris	Anchusa
Oxyacantha		Gramen Parnasium	
Cynosbatos		Rubus	Pentaphyllon
Cistos	Rosa	Phœnix herba	
Acacia	Palma	Idæa radix	
Palma elate		Oxyshœnus	
Malum punicum		Rubrica sinopis	
Malus	Siliquæ	Aizoon	
Cotoneæ		Papauer satium	
Mala epirotica		Adianton	
Pyra	Mespilus	Phlomides	Vuæ
Lotus	Cornus	Vinum phalernum	
Sorbus	Pruna syriaca	Vinum œnanthe	
Lepus terrestris		Vinum passum	
Lac	Caseus	Vinum rhoite	
Fuligo butyri		Vinum myrtite	
Sanguis	Fimum	Vinum cedri	
Lyncurion	Triticum	Vinum lauri.	
Brassica sativa		ALVINIS vtilia.	
Hordeum	Plantago	Coagulum	
Crininon	Seris	Nymphæa	
Bromos	Chondryllæ	Clymenon	
Oryza	Alica	Papauer satium	
Milium	Faba	Omphacomeli.	
Lens	Anethum	AMATORIIIS ve-	
Apium	Aphace	nesciis attributa.	
Smyrnion		Cyclaminos	
Hippomarathrum		Catanance	
Acantha		Dorycnion	
			Cot



# CVRATIVVS.

Cotyledon	64.	
Mandragoras	ANGINAE re-	
Leontopodion	media.	
Phyteuma.	Acetum Absynthium	
AMBUSTORVM	Cyprinum vnguentum	
remedia.	Cedria Cape	
Acacia	Crocodilium	
Asphodelos	Elaterium	
Aristolochia	Fell animalium	
Althæa	Fimum Hirundo	
Aizoon maius.	Hyssopus Irinum	
Arction	Alumen Laserpitium	
Atramentū scriptoriū	Mel Oxymel	
Buccinum	Beta Spartum siue genista	
Cyros	Cistos Sal Violæ	
Coriū vstum, siue vete-	Piper Pix	
rum calceamentorum	Rhaphanus	
Cynoglossum.	ANHELITVS dif-	
Cinnabaris	ficultatis re-	
Ebulus.	media.	
Fimum		
Phlomis, siue verbascū	Afarum Balsamum	
Gallion	Hedera Naphtha	
Hypericon	Helxine Centaurium maius	
Lactuca sylvestris	Baccharis Peucedanū	
Lilium	Myrtus Galbanum	
Morus.	Malua Parthenion	
Narcissus.	Adianton	
Oliuæ colymbades	Ampeloleuce	
Ouum	Picea Et infrà in verbo Or-	
Platanus	Plantago thopnoicis	
Sesamum	Stimmi ANIMALIVM feri	
Sal	Thus tas mitigatur	
Vnguentum felinum.	Oenagra.	
AMPHISBAE-	ANI remedia.	
næ morsus curatio.	Vide, Sedis remedia.	
Dioscorides lib. 6. cap.	ANIMALIA ven-	
	tris	



# INDEX

tris expellentia.	Piper	Abrotonum
Vide, Tineas latas pel-	Stichas	Ruta
lencia.	Caros	Anethum
ANIMALIA quæ	Petrofelinon	
perimunt.	Hedysaron	
Diosco.lib.6.in præfa-	Mandragoras	
tionis fine.	Rubrica, siue terra le-	
ANIMALIUM ietus	mnia.	
remedia.	A P V M ietus	
Bdellium	remedia.	
Panaces heracleon	Laurus	Malua
Terra lemnia	Sisymbrium	
Diosc.lib.6.cap.55.	Althæa	
ANIMI defectus	Diosco.lib.6.cap.57.	
remedia.	A P O S T E M A T V M	
Cucumis	remedia.	
Pulegium	Vide, Suppurationum	
Coris	remedia.	
ANIMI volupta-	APPETITUM	
tes auget	generantia	
Buglosson.	Cerasia.	
ANIMI deliquia	APPETITUM	
generantia	incitantia.	
Diosc.lib.6.in præfat.	Vinum in communi	
ANODYNA.	Vinum Selenite.	
Hyoscyamus	A Q V A E inter cu-	
Aconitū pardaliāches.	tem remedia.	
ANTIDOTUM in-	Vide,Hydropicorum.	
gredientia.	A R A N E I S con-	
Acorus	traria.	
Phu		
Amomum	Morus	
Costum	Grossi	
Iuncus odoratus	Melanthion.	
Cyphi	A R A N E I ietus	
Scincus, siue scingus	remedia.	
Sanguis Rapæ satiuæ	Mullus piscis	
Napum, siue bunias		
Brassica satiuæ		

Alli



# CVRATIVVS.

Allium	Bulbus esculentus
Melissophyllon	Centaurium minus
Coris Oxyſchœnus	Cinis vitium
Hyacinthus	Helleborus niger
Aizoon maius.	Scammonium
ARGENTI vini	Mandragoras
curatio.	Meon
Dioſc. lib 6. cap. 28.	Nardus
ARGEMATVM	Ouum
morbi remedia.	Palma elate
Fel animalium	Pentaphyllon
Vrina	Pſyllium
Laſtica ſylueſtris	Ruta
Cera Argemone	Thapſia
Anagallis Ocymum	Thymoxalme
Papauer ceratidis	Vuapaſſa
Lotus ſatiua.	Vinum melnite.
ARQVATORVM	ARTERIAE re-
remedia.	media.
Onos ſiue millepeda	Irinum
Asparagus	Myrrha
Cyclaminos	Thus
Sphondylion	Caryotæ, ſiue caryoti-
Oenanthe	des
Buphthalmos	Ficus
Chryſanthemon	Sinapi
Vinum abſynthite.	Præſon, id eſt porrum
ARSENICI, ſiue	Glycyrrhiza
auripigmenti	Triticum
curatio.	Rhaphanus
Dioſc. lib. 6. cap. 29.	Laſerpitium
ARTICVLORVM	Pentaphyllon
morbis vtilia.	Vuapaſſa
Amurca Anethinum	Rhodomeli
Agaricum	Tragacantha.
Arction	ASPIDVM morſus
	remedia.
	Cimices lecti

But



# INDEX

Butyrum	Clematis	Lixiua ex ficu
Daphnoides		Ionia siue Cionia
Aqua maris		Adeps
Diosc. lib. 6 cap. 70.		Adipum medicinæ
ASTRICTORIAE		Faba Aegyptia
medicinæ.		Lens
Aspalathus		Portulaca
Bryon	Crocus	Seris
Oleum omphacinum		Porrum
Oleum ex oleastro		Myosotis
Myrrha		Hedera
Vnguentum melinum		Agaricum
Vnguentum ænâthinū		Rhaponticum
Cortex thuris		Gentiana
Picea acpinus		Absynthium
Pityides	Lentiscus	Absynthium seriphium
Terebinthus		Mentha
Fuligo picis		Melilotus
Cypressus	Iuniperus	Maron
Vlmus	Paliurus	Ruta
Cyprus	Lilia	Cyminum satium
Cistos	Hypocistis	Hieracium maius
Cydonia	Rosa	Conizæ tertium genus
Acacia	Salix	Lyfimachium
Vitex		Clymenos
Olea sylvestris		Anchusa
Quercus	Castanea	Idæa radix
Galla	Thus	Granum tinctorum
Palma	Palma elate	Chrysocome
Malicorium	Myrtus	Aizoon maius
Myrtidanum	Malus	Phlomidis
Cotonea	Perfica	Lotus sylvestris
Pyra	Pyra sylvestria	Ebulus
Mespilus		Vitis sylvestris
Mespilus alia		Nuclei acinorum
Cornus	Morus	Vua ænanthe
		Omphacium
		Pallum
		Vinum omphacite
		Vinum nigrum è la-
		brusca
		Vinum cydonite
		Omp



# CVRATIVVS.

Omphacomeli	Bulbus esculentus.
Vinum apitie	A'VRIVM medi-
Vinum myrtite	cinæ.
Vinum palmeum	Cannabis satiua
Vinum è celro	Araneus
Vinum pifsite	Adipum medicinæ
Vinum absynthite	Asphodelus
Vinum tragoriganite	Absynthium Anifum
Vinum pralite	Aparine Aqua maris
Vinum calaminthite	Acetum
Vinum aromatite	Acetum scilliticum
Spuma argenti	Alumen Aphronitrum
Chryfocolla	Blattæ Beta
Cinnabaris	Crocus Ciftos
Chalcanthon	Cornix Cucurbita
Diphryges	Cæpe Capparis
Arsenicum	Sal Cucumis anguinus
Fæx vini	Spongix Daphnides
Lapis Phrygius	Dracunculus maior
Lapis Afius	Ficus
Lapis fcifilis	Fel animalium
Terra eretria	Faba Aegyptia
Lapis Samius	Flos æris Flos falis
Fuligo pi&toria.	Hedera Helxine
A S S V L A S fixas cor	Irinum vnguentum
poribus extra-	Hylfopus Laurinum
hentes.	Lycium Lapation
Cochleæ terrestres.	Malum punicum
ATTONITIS vtilia.	Myrtus Mel
Ampeloleuce.	Myofotis Mentha
A V R V G I N E M	Melilotus Myrrha
tollentia.	Oleum amygdalinum
Lycium Agaricum	Oleum balaninum
Libanotis coronaria.	Oleum hyofcyaminum
A V R I C V L A	Olea fylueftris
rum remedia.	Onos Origanum
	R



# INDEX

Omphacium	Pix	Allium	Argemone
Populus alba		Eryngium	Pulegium
Plantago		Apium	Vinum cedrite
Porrum	Peucedanus	Sal	Terra samia.
Prasion		BILEM	adgene-
Polygonon mas			rantia.
Papauer satium		Iuglans.	
Psyllium		BILEM pur-	
Rhus obsomiorum			gantia.
Rosa	Salix	Agrio raphanus	
Seneſta serpentis		Androsæmos	
Sesamum	Sinapi	Anchusa	Apios
Spondylium	Stœbe	Brassica canina	
Strychnum satium		Calamintha	
Sulphur		Clematis	Cici
Thus cum pice		Cucumis anguinus	
Terebinthina		Characias	Chamælea
Vermes	Vrina	Helleborum nigrum	
Vinum myrteum, siue		Elaterium	Ebulus
myrsinite		Epithymum	Empetron
Vinum cedrites.		Helenium	Hippophaës
<b>B</b> DELLARVM,		Heliotropium	
siue hirudinum		Iris Illyrica	
curatio.		Lychnis syluestris	
Dioſc.lib 6.cap.32.		Lathyrus	Linzoſtis
BESTIAS fu-		Malus	Melanthion
gantia.		Mentha	
Acantha leuce, siue spi-		Nandragoras	
na alba.		Ocymum	Parthenion
BESTIARVM ve-		Peplos	Scammonia
nenatarum remedia		Thlaspi	Thapsia
Balsamum.		Thymelæa	
BESTIARVM mor-		Vitis sativa	
bus remedia		Unguentum suſinum	
Helenium Aegyptium		id est, lilij.	
Sanguis	Porrum	BLATTAS in se	
		cont.	



# CVRATIVVS.

contrahentia	Amygdalus amara
Phlomidēs.	Osisfragus
BOVM scabiem	Vrina Sium
emendantia	Struthion
Cedria.	Centaurium maius
BRONCHOCE-	Bdellium Daphnides
las discutientia.	Paliurus Pruna
Vide, gutturis remedia.	Fimum Lapathon
BVPRESTIS ve-	Silymbrium Ononis
neni remedia.	Cyminum syluestre
Lac schiston.	Artemisia
Dioscorides libro 6.	Hippomarathron
cap. 3.	Asplenon Anthemis
CACHEXIAE,	Parthenion Pæonia
Gi. maciei remedia.	Lithosperma
Aqua maris.	Althæa Tribulum
CACOETHE re-	Saxifragum
media.	Gramen Tragion
Vnguentum rosaceum	Acanthus
Crocinum Thus	Cotyledon prima
Glandes Ficus	Vitis satina
Cicer Plantago	Myrtus syluestris
Dracunculus maior	Oxalme
Dracunculus minor	Lapis Iudaicus Ochra
Hedera Viscum	Lapides spongiarum.
Asclepias Psyllium	CALEFACTO-
Vrtica Petasites	riæ medicinæ.
Cadmia Diphryges	Adipum medicinæ
Flos salis.	Medullæ animalium
CALCIS curatio.	Fel Cera
Diosc. lib. 6. cap. 29.	Propolis Triticum
CALCVLI remedia.	Rhaphanus
Cyperus	Rhaphanus agria
Cardamomum	Silymbrium
Oleum amygdalinum	Silymbrium aquaticum
Cerasia	Sinapi Nasturtium



# INDEX

Thlaspi	Erysimon	Myrrha
Piper	Zingiber	Myrrha Bœotica
Dracunculus maior		Styrax
Dracunculus minor		Bdellium
Asphodelus		Thus
Bulbus esculentus		Terebinthus
Agaricum		Refina
Gentiana		Palimpissa
Anonis, siue Ononis		Iuniperus
Eryngion		Sabina
Abfynthium		Cedria
Abfynthium seriphium		Cedrides
Hyssopum		Laurus
Origanum		Daphnides
Tragoriganum		Cyprus
Pulegium		Cistosalia
Mentha		Vitex
Serpyllum		Amygdalæ amaræ
Sampsuchum		Ficus
Maron	Aspalathus	Lixivia ex ficu
Crocomagma		Cisteris
Helenium		Cochleæ terrestres
Oleum vulgare		Fiber
Oleum ficyonium		Buprestis pityocampa
Strigmenta gymnastorum & palæstrarum		Salamandra
Elæomeli	Laurinum	Oesypus
Sampsuchinum		Panaces heraclion, siue herculeum
Ocyminum		Ligusticum
Anethinum	Sufinum	Seseli Malsiliense
Cyprinum, siue ligustrium		Sison
Irinum	Gleucinum	Anisum
Amaracinum		Caros
Metopium		Anethum
Stacte	Nardinum	Cyminum satium
Malabathrinum		Ammi
		Oreoselinon
		Smyrnion
		Hippomarathrum
		Daucus
		Libanotis
		Laserpitium
		Galbanum
		Ammoniacum
		Stachys
		Scordion
		Artemisia
		Anthemis
		Chrysocome
		Portulaca agrestis
		Lot



# CVRATIVVS.

Lotus syluestris		CALLO RVM
Vinum picatum		remedia.
Vinum in communi		Triticum
Aqua maris		Laſerpitium
Vinum è cedro, arbori-		Chalcitis lapis.
búsque aliis		CANCRESCEN-
Vinum è cypreſſo		tibus vlceribus
Vinum cedrite		medetur.
Vinum chamædryite		Vrtica.
Aerugo aurificum		CANES occidentia.
Chryſocolla		Asparagus
Chalcantho		Apocynon.
Alumen	Sulphur	CANIS rabie sanat
Flos ſalis	Pyrites	Alyſſum.
Lapis hæmatites.		CANIS rabioſi mor-
CALEFACTO-		ſus remedia.
rum remedia.		Lycium
Lana ſuccida.		Cinix vitium
CALIGINIS ocu-		Omotarichos
lorum remedia.		Smaris
Fel animalium		Iecur ardens canis
Lactuca ſylueſtris		Triticum
Ocymum	Cæpe	Sanguis
Dracunculus maior		Mel
Sinapi	Naſturtium	Groſſi
Eryſimon	Piper	Panaces heracleon
Zinziber		Cæpe
Dracunculus minor		Laſerpitium
Anagallis		Vrina
Chelidonium maius		Aſter atticus
Sagapenon		Meliſſophyllon
Chamædryſ		Vrtica
Chamæſyce		Cynogloſſon
Flos æris		Fœniculum
Pumex	Fæx vini	Ballote
Lapis thyites.		Oxalme
		Aphronitrum, ſiue ſpu-
		ma nitri.
		Dioſc. lib. 6. cap. 37.
		Herm. Coroll. cap. 212.
		CANIS non rabidi



# INDEX

morsus remedia.	Cupressus	
Amygdalæ amaræ	Fagus	Ilex
Iuglans	Ficus	Palma elate
Mituli	Gobius	Myrtus
Cucumis		Hedera
Bulbus esculentus		Eleliphacos
Mentha	Ebulus.	Rubus
CANIS impetum		Vinum myrtite.
cohibentia.		CAPILLVM
Iecur & dens canis.		rufantia.
CANES necantia.	Cyprus	Lycium
Chamæleon albus.	Lotus	Fæx vini.
CANVM scabiem		CAPILLVM fla-
emendantia.		uum reddentia.
Oleum lentiscinum		Aqua maris.
Cedria.		CAPILLVM
CANTHARIDES		purgantia.
fugantia.	Fœnogræcum	
Vnguentum melinum.	Linum.	
CANTHARIDVM		CAPILLOS
veneni remedia.		tingentia.
Lac schiston	Acacia	
Adipum medicinæ	Myrtus	Morus
Diosc. lib. 6. cap. 1.	Stratiotes terrestris	
CAPILLORVM	Ebulus	
defluuium repri-	Terra ampelites.	
mentia.	CAPILLOS	
Oleum ex oleastro	nutrientia.	
Myrrha	Iu glans.	
Cistos alia, siue ladanũ	CAPITIS vlce-	
Myrtus.	rum remedia.	
Brassica fatiua	Balsamum	
Nasturtium	Oleum ex oleastro	
Aloë	Oleum amygdalinum	
Adiantum.	Vnguentum rosaceum	
CAPILLVM	Telinum	
denigrantia.	Narcissinum	
	Myrrha	Thus
		Vrina



# C V R A T I V V S.

Vrina	Fœnogræcum	Oxyschœnos
Cicer	Linum	Psyllium
Malua	Allium	Papauer rhœas, siue er
Cyclaminos		raticum
Bulbus esculentus		Strychnon, siue solanū
Melilotus	Lilium	fatium
Bettonica, siue Britan-		Aizoon maius
nica		Hippoglosson
Xyris	Rubus	Chamæ daphne
Rubus Idæus	Oxalme	Myrtus syluestris
Vinum myrsinite	Sal.	Elaterium
CAPITIS dolo-		Scammonium
ris remedia.		Vitis satia
Iris Illyrica	Asarum	Vinum
Meon, siue meu		Vua œnanthe
Oleum oleastri		Aqua maris
Oleum amygdalinum		Acetum scillite
Vnguentum rosaceum		Lapis ophites.
Narcissinum	Cyprus	CAPITIS dolo-
Rosæ	Vitex	
Amygdalæ amaræ		rem facientia.
Torpedo		Styrax
Lac humanum		Oliuæ
Lana succida		Glandes
Curmi	Sisymbrium	Palma
Sesamum	Hedera	Arbutus
Portulaca	Aloë	Inglans
Mentha	Serpyllum	Eruum
Baccharis	Ruta	Absynthium
Anisum		Ferula
Sphondylion		Meu sine meon
Peucedanum		Peucedanus
Melanthion		Mandragora
Coniza maior		Vinum gypsatum
Anagyris	Bettonica	Vinum phœnicite
Radix hederæ		Vinum rhetinice
		Vinum mesagite.
		CAPVT purgantia.
		Anemone



# INDEX

Brassica satiua		Characias	Cadmia
Beta	Cæpe	Aes vstum	
Chelidonium minus		Flos æris	
Chalcanthum		Lasertium	
Cyclaminos		Lana vsta	
Origanum.		Lapis Asius	
CARBVNCVLO-		Spuma argenti	
rum medicinæ.		Smaris.	
Brassica satiua		CARCINOMA-	
Cupressus		tum remedia.	
Cinnamomum		Fuligo thuris	
Cyprus		Buprestis	Cicer
Coriadrum	Characias	Erysimum	
Eruum	Fimum	Dracunculus maior	
Iuglans		Dracunculus minor	
Lupinum satium		Aristolochia tertia	
Lasertium		Vrtica	Caliopsis.
Nasturtium		CASEVS	ne cariem
Olea sylvestris		sentiatur.	
Pix	Plantago	Dracunculus minor.	
Panaces heracleon		CAVA impleantia.	
Sabina	Vua passa.	Cadmia	Pompholyx
CARDIACO-		Cerussa	
rum reme-		Lapis schistos	
dia.		Lapis morochthus	
Buprestis		Terra samia	
Seris	Rubus.	Fuligo thuris	
CARNEM tenerio-		Aristolochia tertia.	
rem reddentia.		CAEPAE acrimonia	
Vrtica siue acalyphe.		retundit.	
CARNEM coalesce-		Ruta.	
re facientia.		CAERASTAEIUS	
Lixiua ficus		remedia.	
Symphyton.		Cedria, siue cedrinus li-	
CARNES superua-		quor.	
cuas compescentia.		Harundo	
			Rosa



# CURATIVVS.

Rosa	Sal	Aeris flos
Dioscor. lib. 6. cap. 55.		Aerugo aurificum
& 69.		Fuligo butyri
CERVSSAE CV-	Faba	Fæx vini
ratio.	Oleum myrtinum	
Dioscor. lib. 6. cap. 22.	Oleum Balaninum	
CERIONVM VL-	Oleum cicinum	
cerum remedia.	Olea Aethiopica	
Crossi	Peucedanum	
Pepo	Plumbum elotura	
Quære, Fauos rum-	Pumex	
pentia.	Scoria argenti.	
CERVICIS rigo -	CICVTAE con-	
ris medicinæ.	traria.]	
Vide, Opisthotonico -	Passum & vinum	
rum remedia.	Vinum in communi	
CHIRONIORVM	Acorum	
ulcerum remedia.	Hermo. Cor. cap. 17.	
Plantago	CIMICES fugan-	
Ampeloleuce.	tia & necantia.	
CHOLERICIS	Hermo. Cor. cap. 366.	
vtilia.	& 806.	
Cotonea mâla	CLAVORVM	
Calamintha	remedia.	
Ferrum	Smaris	Fimum
Mentha	La serpentium.	
Polygonon mas.	COELIACORVM	
CICATRICVM	Remedia.	
remedia.	Myrrha	Hypocistis
Anemone	Lycium	
Aloe	Olea syluestris	
Adeps	Quercus aut robur	
Bulbus esculentus	Galla	Thus
Balanus myrepica	Myrtus	Cotonea
Cistos	Morus	
Centaurium	Lixiua ex ficu	
Chamæsyce		
Calx viua		
Corallium		
Aes vstum		



# INDEX

Ceruinum cornu	num re media.
Faba Aegyptia	Amomum
Lapathon	Vnguentum telinum
Plantago Coronopus	Zopissa Naphtha
Rhaponticum	Nyrica Paliurus
Acantha leuce, siue spi- na alba	Cyprus
Ferula	Olea syluestris
Laserpitium	Glandes Morus
Tragos herba	Grossi Ouum
Papauer satium	Triticum Hordeum
Vinacci	Fœnogræcum
Nuclei vinaceorum	Linum Cicer
Elæomeli	Agriorhaphanus
Vinum phœnicite	Plantago Sonchos
Vinum rhetinite	Nasturtium
Ferrum	Bulbus esculentus
Lapis morochthus.	Argemone altera
COL I remedia.	Rhaponticum
Colocynthis	Acantha leuce
Fimum Galerita	Thymus
Mel Petroselinum	Coriandrum
Ruta Sefamum	Smyrnium
Talus suis.	Libanotis Viscum
COLOREM com- mendantia.	Parthenion
Acetum scillite	Cannabis syluatica
Buphthalmos	Anagryis syluatica
Cerussa	Helxine
Cyminum satium	Pentaphyllon
Laserpitium	Peristerion supinus
Mastichinum	Papauer satium
Vnguentum rosaceum	Stratiotes aquaticus
Vinum	Cytillus
Vinum aromatite.	Ampelos leuce
COLLECTIO.	Vinum in communi
	Vinum adynamon
	Vinum cydonite.
	COM



# CVRATIVVS.

## COMITIALIS

morbi remedia.

Cardamomum  
Balsamum Naphtha  
Populus nigra Ficus  
Iuncus odoratus  
Lepus terrestris  
Mustela Iecur  
Vnguis asini  
Lichen equi  
Iecur hirci Hirundines  
Serum Lachumauum  
Coagulum Fel  
Sanguis Fimum  
Plantago  
Eryngion Ruta  
Seseli Mafsiliense  
Libanotis  
Sphondylion  
Peucedanum  
Laserpitium  
Galbanum  
Sagapenum  
Ammoniacum  
Trifolium  
Conyza Anthyllis  
Symphyton Cestron  
Pentaphyllon  
Papauer aphrodeles  
Viola purpurea  
Helleborum nigrum  
Hippophæstion  
Ampelos leuce  
Ampelos melana  
Oxymel  
Acetum scillite

Lepis selenites

Lapis aetites

Cotes.

## CONCEPTIONI

contraria.

Epimedium  
Heliotropium maius  
Aerugo ferri  
Alumen  
Lapis ostracites  
Hermo. Cor. cap. 67.

## CONCEPTIO-

nem facilitantia.

Coagulum  
Lolium  
Staphylinos agrios  
Lapis samius.

## CONCOCTIC-

ni vtilia.

Anethum Althæa  
Acetum scillite  
Balsamum Crocus  
Crocomagma  
Caros Cestron  
Calx viua Eruca  
Ligusticum Pulegium  
Papauer satium  
Resina Styrax  
Seseli Mafsiliense  
Sulphur Vinum  
Vinum resinatum  
Vinum absynthite  
Vinum tragoriganite.

## CONSTRICTO-

riæ medicinæ.

Vide, Adstrictoriæ me-  
dic



# INDEX

dicinæ.

## CONVULSIONIS

remedia.

Iris Illyrica

Acorus

Cardamomum

Asarum

Costus

Iuncus odoratus

Balsamum Helenium

Calamus odoratus

Sampfuchinum

Metopium

Bdellium

Iuniperus

Cedrides

Halimos

Lixuia à ficu

Fimum

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Asphodelus

Capparis

Argemone

Rhaponticum

Gentiana

Aristolochia tertia

Centaurium maius

Acantha leuce

Abrotonum

Origanum

Pulegium

Calamintha

Serpyllum

Baccharis

Panaces heracleon

Libanotis

Peucedanum

Laserpitium

Sagapenon

Galbanum

Clinopodium

Chamædrys

Alisma

Cestron

Xyris

Symphytum

Psyllium

Phlomides

Ampeloleuce

Vinum scilliticum

Vinum chamædryte

Vinum tragorigantiæ

Vinum daucite

Vinum panacite.

## CONDYLOMATUM

remedia.

Strigmenta à balneis

Myrteum

Myrtus

Cotonea

Ouum

Aloë

Anethum

Libanotis

Ballote

Stachys

Phalangion

Pentaphyllon

Vitis sativa

Ferrum

Plumbum elotum

Sandaracha.

## CORDIS tremoris

medicinæ.

Nardi spica

## CORIANDRO

contraria.

Vinum in comuni

Dioscor. lib. 6. cap. 9.

## CORPORA defun-

cta à corruptione diu

tuetur

Cedria.

## CORPVS

macre-

scientia.

Canc



# CVRATIVVS.

Canchamum.		CROCEVM colo-
COXAE doloris re-		rem facit
media.		Rhaponticum.
Strigmenta à palæstis.		CRVDITATIS
COXENDICVM		remedia.
doloris remedia.		Balsamum
Asparagus		Strigmenta à balneis
Agaricus	Althæa	Gentiana
Abrotonum		Vinum scilliticum.
Aster Atticus		CRVSTAS generat
Acetum scilliticum		Lana vsta.
Centaureum minus		CVLICES fugan-
Calamintha		tia.
Coris	Cestron	Cupressus
Cucumis sylvestris		Coniza
Erysimon		Ebulus
Euphorbium		Absinthium
Finum	Garus	Hiberis
Helenium		Plumbum vstum.
Ammoniacum		CVTEM albicantia.
Hypericon	Hiberis	Rapum sylvestre.
Heliochrysos		CVTEM erugantia.
Iris Illyrica	Lolium	Oleum amygdalinum
Lupinum satium		Styrax.
La serpitium		CVTEM lenientia.
Laphtha	Onos	Amygdala amara
Populus alba		Oleum sicyonium
Panaces heracleon		Vnguentum telinum
Peucedanum		Succus peponis
Pentaphyllon	Ruta	Terra Chia.
Scammonium		CVTIS vitia tol-
Vinum asarite	Xyris.	lentia.
CRASSITVDI-		Adarce Ampelos leuce
nem extenuâtia.		Amygdalæ amaræ
Porrum		Cochleæ terrestres
Staphis agria.		Costus
		Chamæleon niger

Iris



# INDEX

Iris Illyrica	Lac	Ficus	Galba
Ficus	Linum	Galbanum	Hedera
Lupinus		Hyoſcyamus	
Lotus ſylueſtris		Hyſſopus	
Mel Ponticum		Laſerpitium	
Oleum raphaninum		Leucacantha	
Picea		Myrica	Morus
Sanguis leporis		Melaanthion	
Spuma argenti.		Meliſſophyllon	
CVTIS pruritus.		Naphtha	
remedia		Olea Aethiopica	
Lac.		Picea	Plantago
<b>D</b> ENTIVM do-		Panaces heracleon	
loris remedia.		Pyrethrum	
Amurca		Peucedanum	
Halicacabus		Pentaphyllon	
Asparagus		Rhus	Ranæ
Allium	Anagallis	Sepiæ	
Aristolochia		Senecta ſerpentis	
Acantha leuce		Strychno hypnoticon,	
Absynthium		ſiue ſomniferum	
Arction	Acetum	Vnguentum roſaceum	
Acetum ſcillite		Vermes terreni.	
Alumen	Batrachion	DENTIVM ſtupo-	
Cedria	Cytinus	ris remedia	
Cochleæ terreſtres		Portulaca.	
Capparis		DENTITIONI in-	
Chelidonium maius		fantium vtilia.	
Chamaeleon niger		Leporis cerebrum	
Clematis daphnoides		Butyrum cum melle.	
Cucumis anguinus,		DENTIFRICIA.	
ſiue ſylueſtris		Purpura	Buccinum
Characias		Ceruinum cornu	
Colocynthis		Halcyonium	
Ephemerum		Corallium.	
Helleborus niger		DENTIBVS ſtupo-	
		rem	



# CVRATIVVS.

rem' adferentia.	Althæa	Viscum
Cadmia.	Galbanum	
DENTES firmantia.	Ammoniacum	
Lentiscus	Lapis Gagates.	
Oliuæ colymbades	DOLORVM inue-	
Myrrha	teratorum remedia.	
Oleum omphacinum.	Sinapi	
DENTES albica-	Lana succida	
re facit	Ligusticum.	
Halcyonium.	DOLORES lateris.	
DENTES vitiatos.	Vide, laterum dolores.	
extrahentia.	DOLOREM ne sen-	
Amurca	tiant qui vrendi se-	
Oleum oleastri.	candive sunt.	
DENTES mouentia	Mandragoras	
Oleum oleastri.	Lapis memphites.	
DEPILES facientia.	DORYCNI curatio	
scolopendria	Diosc. lib. 6. cap. 6.	
Characias.	DRACONIS mari-	
DESQVAMATIS	ni morsus.	
vtilia.	Mullus piscis	
Strigmenta gymnasto-	Vrina	Ocymum
rum	Absynthium	
Lana succida.	Plumbum elotū & cre-	
DESTILLATIO-	matum	
nes coercentia.	Sulphur	
Irinum	Diosc. lib. 6. cap. 61.	
Naphtha	DYRINI morsus	
Et in verbo, Pituitæ de-	curatio.	
stillationis remedia.	Diosc. lib. 6. cap. 65.	
DILACRYMA.	DVRITIEM emol-	
tiones emendantia.	lientia.	
Picea	Amaracinū vnguentum	
Pinus.	Bdellium	
DISCVSSORIAE	Buphthalmos	
medicinæ.	Cyprinum	
Androsæmon.		

Cap



# INDEX

Capparis		Ferrum	Galla
Erysimon	Aegilops	Omphacium	
Ficus	Fimum	Hypocystis	
Glans	Galiopsis	Hedera	Hippuris
Hydropiper		Lentiscus	Lycium
Ammoniacum		Lotus	
Lens	Linum	Lixiua ex ficu	
Lapis alabastrites		Lac schiston	
Megaliun		Linum	Lapathum
Melanthion		Lyfimachia	
Mandragoras		Myrrha	Macer
Porrum		Malum punicum	
Panaces heracleon		Melissophyllum	
Pentaphyllon		Naphtha	
Paronychia		Nymphæa	
Pyrites	Styrax	Nuclei acinorum	
Sanguis	Smyrnion	Oryza	Omphacium
Terra cimolia		Oxalme	Portulaca
Vinacei.		Plantago	Phyllitis
DYSENTERICO		Polemonium	
rum remedia.		Pentaphyllon	
Adipum medicinæ		Papauer ceratite, siue	
Asparagus	Argemone	corniculare	
Agaricum		Quercus	
Althæa	Alcea	Rubrica, siue terra lēnia	
Alisma		Silurus	Sanguis
Aizoon maius		Sium	Scordium
Butyrum	Cupressus	Symphyton	
Cotonea	Cornu	Stœbæ	
Ceruinum cornu		Sideritis Achilleia	
Coagulum	Cera	Salsugo	Tragion
Clematis daphnoides		Vitis sativa, siue vini-	
Elatine		fera	Vinacei
Eupatorium		Vinum cydonite	
Fœnogræcum		Et in verbo, Intestino	
Faba Aegyptia		rum remedia.	
		Ebriet	



CVRATIVVS.

**E**BRIETATI  
vtilia.

Amygdalus amara

Brassica fatiua

Absynthium.

ELEPHANTIAE  
remedia.

Cedria

Erinaceus terrestris

Serum

Fel animalium

Zythum Plantago

Calamintha.

ELEPHANTIAS  
gignentia.

Vinum sicyte.

EMOLLIENTES  
medicinae.

Adipum medicinae.

Bdellium

Cinnamomum

Cypros

Cistos

Cera

Cerussa Chalcanthum

Calx viua Oesypus

Foenogracum

Gleucinum

Ammoniacum

Irinum Laurus

Lana succida

Linum

Lapis Gagates

Metopium

Myrrha Boeotica

Medulla animalium

Naphtha

Palimpissa

Panaces heracleon

Psyllion

Plumbum clotum

Refina

Styrax Viscum.

ENTEROCELAE  
remedia.

Hippuris, siue equisetū.

EPHELIDIS vt-  
lia.

Balanus myrepfica

Cici.

EPINYCTIDIS  
morbi remedia.

Olca syluestris

Myrtus

Amygdalæ amaræ

Grossi Fimum

Brassica fatiua

Plantago Cucumis

Porrum Absynthium

Coriandrū cum melle

palsaque vua

Viscum

Heliotropium maius

Vua passa.

EPIPHORAE re-  
media.

Asarum Malobathrū

Cotonea Crimnon

Coriandrum Liliū

Ambrosia Vua passa

Terra samia.

ERVIS pinorum  
conuenit.

S



# INDEX

Vnguentum melium

Diosc. lib. 6. cap. 2.

ERVPTIONVM  
remedia.

Serum

Lupinum satium

Beta Portulaca

Pentaphyllon

Balanus myrepica

Vinum myrsinite

Alumen.

EXCREATIONIS  
crassæ pectoris  
remedia.

Pix liquida

Dracunculus minor

Tordylon.

EXCRESCEN-  
tia deprimētia.

Alumen

Cerussa

Cinis vitis

Diphryges

Erinaceus marinus

Lapis Asius

Ochra

Pumex

Pyrites

Scordion

Spuma argenti Sal.

EXTENVATO-  
riæ medi-  
cinæ.

Artemisia

Anthemis

Iris Illyrica

Hyssopus

Lapis hæmatites

Pulegium

Panaces heracleon.

EXTRACTO-  
riæ medicinæ.

Galbanum

Viscum Thapsia

Scoria argenti.

FACIES ne à sole  
aduratur.

Ouum.

FACIEI vitia auge-  
rentia.

Ampelos agria

Halcyonium

Adarces

Brassica sativa

Bulbus esculentus

Balanus myrepica

Cinnamomum

Cochleæ terrestres

Cyclaminos

Eruum

Ficus

Hedera Iris Illyrica

Lepus

Lilium

Lotus sylvestris

Mastichinum

Mel sardoum

Oleum amygdalinum

Oleum raphaninum

Pepo Polygonaton

Spuma argenti

Sisymbrium aquaticum

Thapsia.

FACIEI rugas au-  
ferentia.

Cacalia

FASTIDIUM ge-  
ner



# CVRATIVVS.

nerantia.	Costus	Cucurbita
Vinum catorchite	Clymenon	
Diosc. 6. in præfat.	Fœniculus	Hypericon
EATIGATIO.	Hyoscyamus	
num remedia.	Heliotropium maius	
Adeps	Lac humanum	
FAVOS rumpentia.	Lagopus	
Eruum	Myrrha	Ouum
Vua passa	Oleum sicyonium	
Peponis radix	Portulaca	Piper
Grossi.	Panaces heracleon	
FAVCIVM morbi	Polygonon mas	
remedia.	Pentaphyllon	
Acetum	Peristerion supinus	
Acetum scillite	Rhaponticum	
Cacalia	Ruta	Smyrnion
Ficus	Lac	Sapapenon
LasERPitium	Mel	Saxifraga
Papauer satium	Trifolium vuæ	
Styrax.	Vinum melitite	
FAVCEs asperas	Vinum rhoite	
facientia.	Vinum hyssopite.	
Characias	FEBRIS quartanæ	
Cimolia terra.	remedia.	
FEBRIBVS con-	Araneus	Buglosson
traria.	Cimices lecti	Dipsacum
Mala punica.	Hypericon	
FEBRI FVGIA.	Heliotropion maius	
Centaurium minus	Pentaphyllon	
Coniza.	Verbenaca supina	
FEBRIVM remedia	Trifolium	Ruta.
Agaricum	FELLE suffusis uti-	
Aristolochia tertia	lia.	
Anthemis	Adiantum.	
Anchusa	Vinum asarite.	
Aphronitrum	FELLEI humoris	
Balsamum Buglossum		



# I N D E X

<p style="text-align: center;">remedia.</p> <p>Absynthium  Centaurium minus.  <b>F E R I T A T E M</b> ani-  malium mitigantia.  Oenagra.  <b>F E R R V M I N A N-</b>  di vim habentia.  Spuma argenti  Rubrica sinopis  Spongia  Lapis morochthus.  <b>F I L I V M</b> masculum  generantia.  Phyllon                      Orchis  Cratægonos.  <b>F I S T V L A R V M</b>  remedia.  Adeps                      Arisaron  Cinnamomum  Characias  Chalcites lapis  Dracunculus minor  Dipsacus  Helleborum nigrum  Orchis Serapias  Omphacinum  Papyrus                      Plantago  Pentaphyllon  Stratiotes terrestris.  <b>F L A T V S</b> discutien-  tia.  Cinnamomum  Ocymum  Vinum stichadite.  <b>F L A T V M</b> adgene-</p>	<p style="text-align: center;">rantia.</p> <p>Malus                      Zythum  Phascolus.  <b>F L V X I O N V M</b>  remedia.  Fuligo butyri  Erysimon  Lichen in petris  Ocymum                      Portulaca  Pepo                      Squama æris  Papauer satium  Acantha Arabica  Chinum vinum  Acetum                      Ebenus  Licium                      Lixiua ex ficu  Vinum rhoite  Vinum terebinthinum  Vinum pissite  Vinum melampsythiū.  <b>F O E T V S</b> necantia.  Vide, Partus necantia.  <b>F O E M I N A S</b> steri-  lescentia.  Lepus terrestris  Hedera.  <b>F O R M I C A E</b> mor-  bi remedia.  Cicer                      Characias  Chamæsyce  Batrachion                      Dipsacum  Heliotropium maius  Lacerta                      Ruta  Thus                      Vitis sativa.  <b>F R A C T V R A E</b> re-  media.  Fuligo pictoria.  <b>F V N G</b></p>
---	---



# CVRATIVVS.

FVNGORVM ve-  
nenatorum re-  
media.

Verbenaca

Fimum

Rhaphanus

Absynthium

Melissophyllon

Fungi

Vinum in communi

Acetum

Calcanthum

Pyrorum ligni cinis

Aphronitrum

Cinis vitium

Lapis Aſius

Dioſc. lib. 6. cap. 23.

FVRVNCVLO-  
rum remedia.

Ficus

Groſſi

Rhaphanus

Aſphodelus

Galbanum

Pygnoكوم

Aphronitrum.

FVRFVRES tol-  
lentia.

Adiantum

Fœnogræcum

Fel animalium

Groſſi

Lilium

Malua

Oleum oleaſtri

Oleum amygdalinum

Oleum myrtinum

Oxalme

Olea

Salix

Vnguentum melinum

Vnguentum telinum

Vrina

Vinum myrſinite.

Allium

Beta.

**G**ANGRENAE  
morbi remedia.

Ampelosleuce

Bralsica ſatiua

Bulbus eſculentus

Cinnamomum

Characias Galioſis

Iuglans

Lixiua è ficu

Lilium

Lens

Lupinum ſatium

Laſerpitium

Rhus

Rhaphanus

Vrtica

Vua paſſa.

**G**ENITALIUM

morbi remedia.

Asparagus Amurca

Aloe Aſter atticus

Cyprinum Cotyledon

Fœnogræcum

Flos ſalis

Linum

Malum punicum

Polygonon

Sampſuchinum

Vinum terebinthinum.

**G**ENITALIUM

virus extin-

guentia.



# INDEX

Alumen.	Aristolochia tertia
GENARVM mor-	Aloe Acetum
bi remedia.	Acetum scillite
Aloe	Alumen Butyrum
Aerugo aurificum	Canthamum Cytinus
Aerugo ferri	Chalcitis lapis
Ammoniacum	Aerugo aurificum
Lapis schistos	Aerugo ferri
Mituli Naphtha	Galla Lycium
Olea sylvestris.	Lepus terrestris
GENITVRAE pro	Lac schiston
fluuii in somno	Lapis alabastrites
remedia.	Myrrha Mastiche
Lactuca sylvestris	Oleum omphacum
Nymphæa	Pruna Plantago
Hermol. Cor. cap. 932.	Pumex Rosa
GENERATIO -	Rubus Staphis agria
nem deprimentia.	Sal Tribulus
Clymenon	Vua ænanthe
Heliotropium maius	Vinum rhenite.
Menta Thelypteris	GLABROS aut de-
Xyphion Asplenon.	piles facientia.
GENITVRAM ex	Scolopendra
tinguentia.	Characias.
Cannabis sativæ semen	GLADIORVM a-
Anethum.	ciem perstringentia.
GENITVRAM	Malum sylvestre.
augentia.	GLANDIS membri
Semen coriandri.	remedia.
Coriandrum.	Mel.
GENITALIVM	GRAVEDINIS
torporem indu-	remedia.
centia.	Styrax.
Cicuta.	GVRGVLIONI
GINGIVARVM	vtilia.
morbiremedia.	Silurus.

GVT



CVRATIVVS.

GVTTVRIS re-  
media.

Bdellium

Ficus After Atticus

Vinum halosanthinum

G Y P S I curatio.

Lixiua ex ficu

Diosc. lib. 6. cap. 24.

**H** A E M O R R H O I  
darū remedia.

Amaracinum

Allium Anonis

Aloe Cape

Irinum Libanotis

Lapis Arabicus

Ouum Palma

Plumbum elorum

Rhus Rubus.

**H** A E M O R R H O I -  
darum curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 69.

**H** A L I T V S oris re-  
media.

Agallochum

Anisum Bromos

Citrum Malobathrum

Myrrha Mastiche

Vinum selenite.

**H** A S T V L A S infi-  
xas corpori ex-  
trahentia.

Oxyacantha.

**H** E P A T I C O R V M  
remedia.

Vide, Iecinoris morbo-  
rum remedia.

**H** E R B A E quæ peri-  
munt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

**H** E R N I A E medicinæ

Cinnamomum

Cupressus Cytinus

Pentaphyllon

Psyllium Xyphion.

**H** E R P E T I S con-  
traria.

Strychnon satium

Acetum.

**H** I R V N D I N V M

visus restaurantia.

Chelidonium maius.

**H** I R V N D I N E S  
pellentia.

Acetum.

**H** I R V D I N I S  
curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 32.

**H** O M I N E M ne-  
cantia.

Iuniperi ramenta

Smilax seu taxus.

**H** O M I N I S morsus  
remedia.

Iuglans.

**H** O R R O R E S excu-  
tientia.

Vide, Rigorem excu-  
tientia.

**H** V L C E R A N T E S  
medicinæ.

Buprestis Salamandra

Batrachion Ruta



# INDEX

Lonchitis	Hedysaron	Gentiana	
Clematis		Iris Illyrica	Ifatis
Portulaca agrestis		Indicus lapis	
Ampeloleuce.		Lixiua cum cinere ficus	
H V L C E R V M	re-	Lentiscus	Lycium
	media.	Lana combusta	
Amygdala amara		Lolium	Lens
Anemone	Amylum	Lupinus	Libanotis
Anagallis	Aristolochia	Laserpitium	
Aloe	Anthemis	Lilium	Myrtus
Althæa	Anchusa	Mel	Mandragoras
Astragalus	Aconiton	Nasturtium	
Arction	Acetum	Narcissus	
Arsenicum	Alumen	Olea syluestris	
Brassica sativa	Beta	Oleum amygdalinum	
Bulbus esculentus		Orobis	Orchis
Ballote.		Oenagra	Omphacium
Caries lignorum		Plantago	Pix
Cistos	Chelidonium	Palma	
Centaurium		Purpura combusta	
Chamæleon niger		Pepo	Panaces
Coriandrum		Peucedanum	Prasion
Chamædrys		Pentaphyllon	
Chamæpitys		Peristereon supinus	
Chamælica		Papauer ceratitis, id	
Cadmia	Cinis vitis	est, corniculare.	
Corallium		Psyllium	
Dracunculus		Plumbum elotum	
Elelisphacon		Pumex	
Eupatorium		Rhamnus	Ruta
Ebulus	Aes vstum	Stratiotes terrestres	
Ficus	Finum	Scordion	
Aerugo aurificum		Sandaracha	Sal
Fel	Glans	Spongia	Thus
Grossi	Hedera	Viscum	Thelypteris
Goed, id est, coriandrū		Testæ fornacum	
			Vrt



# CVRATIVVS.

Vrtica.	Ruta	Scilla
HVMORVM malo-	Sanpſuchus	
rum medicina.	Staphylu	
Metopium vnguentum	Smyrnion	
Nardinum	Strychnon hypnoticon	
Amygdalæ dulces	ſiue ſolanum ſomni-	
Mel	ficum	Sal
HYDROPICO-	Trifolium Tithymalus	
rum remedia.	Vitex	Vrina
Aſarum	Amurca	Vinum ſcillite
Halicacabus	Allium	Vinum rethinite
Absynthium	Aniſum	Vinum cedrite
Androſaces	Alisma	Vinum aſarite
Ampelos agria		Vinum panacite.
Aqua maris		HYOSCVMICI cu-
Acetum Aphronitrum		ratio.
Halcyonium		Dioſc. lib. 6. cap. 15.
Bupreſtis	Cyperus	ECINORIS re-
Cinnamomum		media
Calamus odoratus		Acorus
Cochleæ terreſtres		Nardi ſpica
Cicer		Nardum Gallicum
Chamæleon albus		Amomum
Chamædryſ		Iuncus odoratus
Ceſtron	Cotyledon	Agallochum
Cucumis anguinus		Picea
Cici		Pinus
Helleborum nigrum		Daphnoides
Ebulus	Ficus	Palma elate
Erinaceus terreſtris		Amygdalæ amaræ
Hippophaes		Lac humanum
Hippophæſton		Scandyx
Hyllōpis	Laſerpitium	Struthium
Lathyris	Origanum	Anagallis
Plantago	Pancratium	Agaricum
Polium	Rhaphanus	Rhaponticum
		Gentiana
		Glycyrrhiza
		Eryngium
		Absynthium



# INDEX

Serpyllum	Sphōdylum	Lilium	Lens palustris
Ammoniacum		Lapis smyris	
Anthemis		Myrtus	Malua
Chamæpitys		Mandragoras	
Vettonica	Eupatorium	Portulaca	Plantago
Hyoscyamus		Parthenion	
Pentaphyllon		Polygonon mas	
Chrysocome		Pentaphyllon	
Papauer ceraticis, siue		Peristereon rectus	
cornutum		Papauer satium	
Epipactis	Isopyron	Psyllium	Rhamnus
Vinum cydonite		Rosa	Ruta
Vinum pissite		Rubus	Idæa
Vinum absynthite		Salix	Sanguis
Vinum nardite		Seris	
Vinum asarite		Strychnon, siue solanū	
Vinum ex syluestri asar-		fatium.	
ro		Stratiotes aquaticus	
Vinum chamælætes		Vrina.	
Rubrica sinopis.		ILEI morbi remedia.	
IGNIS sacri re-		Oleum vulgare	
media.		Strychnos halicacabus.	
Asarum	Acacia	IMPETIGINIS	
Acinos herba		morbi remedia.	
Anchusa	Lycopsis	Amygdalæ amaræ	
Aizoon maius		Lapathon	
Brassica sativa		Lichen in petris	
Acetum	Beta	Lolium	Thus
Baccharis	Bechion	Myrrha	Nasturtium
Crocus	Cupressus	Sinapi	Propolis.
Coriandrum	Cicuta	INCVSISIS vtilia.	
Cotyledon	Cici	Phlomidis.	
Chalcitis lapis		INFANTES mor-	
Aerugo ferri		tuos vtero cii-	
Harundo	Helxine	cientia.	
Isatis	Lens	Distampus.	

INF



# CVRATIVVS.

## INFANTIBVS

vtilia.

Athara After Atticus

Strychnum satium

Smilax aspera.

## INFANTIVM pu-

pillæ vt glaucæ,

non nigræ red-

dantur.

Auellana.

## INFLATIONES

facientia.

Allium

Capparis Glans

Laserpitium Porrum

Bulbus esculentus.

## INFLATIONVM

remedia.

Aspalathus

Amygdalæ amaræ

Abfynthium

Anifum Anethum

Anthemis Althæa

Costus Cicer

Cyminum Eryngion

Epithymum

Helenium Hyffopum

Hieracium maius

Iuncus odoratus

Iuniperus Lac

Ligusticum Hordeum

Ocymum

Peucedanum

Rapa fylueftris

Rhaponticum

Triticum

Thymoxalme

Vrtica

Vinacei

Vinum

Vinum piffite

Vinum abfynthite

Vinum fcilliticum

Vinum chamædryte

Vinum tragoriganite

Vinû fylueftris nardi.

## INFLAMMATIO

num remedia.

Coriandrum

Adeps Asphodelus

Argemone

Anagallis

Artemifia

Aizoon maius

Acetum Butyrum

Brasica fylueftris

Bechion

Brion thalaffion

Cafia

Cotyledon prima

Elatine Ebulus

Faba Ficus

Harundo

Hyofcyamus

Irinum Laurus

Linum

Lupinum fatium

Lonchitis

Lichen in petris

Lens paluftris Lapis

Melilotus Mādragoras

Naphtha Ocymum

Ochra Picca

Plat



# INDEX

Platanus	Portulaca	Irinum	Lac
Pulegium	Parthenion	Linum	Mastichinum
Polygonon mas		Malua	Hordeum
Papauer erraticum		Palma	Portulaca
Rofa	Rhus	Rofaceum	Rofa
Sufinum	Sabina	Ruta	Salix
Sefamum		Spartum	
Sonchos	Scordion	Vinum Surrentinum	
Symphytum		Triticum	
Stratiotes aquaticus		Et in verbo, Dysenteri-	
Triticum	Tribulus	corum remedia.	
Vinacei	Xyris.	INTERTRIGO	
INGVINVM mor-		vt tollatur.	
bi remedia.		Vitex	Corium.
Vide Genitalium.		ISCHIADICO-	
INGENIVM prom-		rum remedia.	
ptum facientia.		Asarum	Balsamum
Ouum.		Cardamomum	
INSANIAM in-		Silurus	Fimum
ducentia.		Nasturtium	Thlaspi
Hyofcyamus		Rhaponticum	
Strychnon hypnoticon		Thymus	
Mandragoras.		Ammoniacum	
INSANIEN-		Leontopetalon	
tium remedia.		Erythrodanum	
Betonica		Ascyron	
Helleborum nigrum.		Androsæmum	
INSOMNIA indu-		Chamæpitys	
centia.		Polemonia	
Vide, Somniferæ medi-		Ocymoides	
cinæ.		Aethiopsis	
INTESTINO-		Arction	
rum remedia.		Chamæcissos	
Agallochum Anthemis		Spartum	
Cochleæ terrestres		Colocynthis	
Hippuris		Oxymeli	
			Vinum



# CVRATIVVS.

Vinum panacite	Dioscorides libro 6. in
Salugo Adarces.	præfat.
IUMENTIS con-	LACRYMA-
traria.	tiones emen-
Gramen cilicum	dantia.
Nerion.	Vide, dilacrymationes
IUMENTORVM	emendantia.
scabiem emen-	LACTIS vberta-
dantia.	tem facientia.
Amurca Alysson	Argemone Anethum
Lupinum satium	Ampeloleuce
Oleum piscinum	Cicer Cicæa
Oleum lentiscinum.	Echion Fœniculus
IUMENTORVM	Halimos Hordeum
vlcera emen-	Lactuca Malua
dantia.	Melanthion
Oleum picinum	Ocymum
Alysson	Sonchos Vitex.
Thelypteris.	LACTIS coagu-
LABIORVM scif	laticuratio.
suræ remedia.	Diosc. lib. 6. cap. 26.
Adeps Lycium.	LASSITVDINVM
LAC coagulantia.	remedia.
Balsamum Ficus	Anethum
LAC extinguentia.	Adeps Clymenon
Cicuta.	Laurinum
LACRYMAS	Ammoniacum Sal
trahentia.	Lapis gagates
Aerugo aurificum.	Vinum chamælates.
LACERTAE mor-	LATERVM morbi
bus remedia.	remedia.
Portulaca	acorus agallochum
Seps, siue lacerta calchi	asphodelus
dica in vino epota.	aristolochia tertia
LACRYMAE quæ	ampeloleuce
perimunt.	Balanum.

Bras



# INDEX

Brassica satiua	Eruum	Galbanum
Bdellium	Melāthion	Rhaphanus
Cyprinum	Finum	Sanguis leporinus
Centaurium maius		Sisymbrium syluestre
Centiana	Galbanum	Spuma argenti
Hordeum		Triticum cum aceto.
Leucacantha	Myrrha	LEPRAE remedia.
Naphtha	Phu	Allium
Panaces heraclion		Anemone
Petrofelinon		Aristolochia
Praſium, ſiue marrubiā		Acantha
Pſeudobunion		Anchuſa
Ruta	Sagapenum	Acetum
Terebinthina		Ampelos leuce
Thapſia	Vrtica	Halcyonium
Vinum cedrite		Alumen
Vinum hyſſopite		Adarce
Vinum ſtichadite		Bupreſtis
Vinum tragoriganite		Brasſica ſatiua
Vinum aromatite		Cochleæ terreſtres
Vinum acorite		Clematis
Vinum glycyrrhite.		Fraxinus
LENDES necantia.		Cucumis anguinus
Cedria	Mel	Helleborum nigrum
Myricæ	Beta	Aerugo aurificum
Allium		Ficus
Alumen		Fel
LENTIGINIS ma		Hordeum
culæ remedia.		Iuniperus
Alyſſon	Halcyonium	Lolium
Aqua maris		Lapathum
Ampelolence		Lepidium
Brasſica ſatiua		Myſotis
Bulbus eſculentus		Oleum oleaſtri
Balanus myrepſica		Oleum cicinum
Cinnamomum		Olea Aethiopica
		Oryza
		Salamandra
		Serum
		Sinapi
		Struthion
		Scammonia
		Sulphur
		ſal
		Terebinthina
		Thapſia
		Terra melia
		Vlm



# C V R A T I V V S.

Vlmus	Vrina	Piper	Struthion
Vitis fatiua.		Hedera	Cyclaminos
LEPORIS ma-		Pancraticen	
rini remedia.		Capparis	Lepidium
Fiber	Cornus	Agaricum	
Lapis ophites		Rhaponticum	
Halcyonium		Aristolochia tertia	
Chamaeleon niger		Crocodilion	
Cicer		Absynthium	
Cucumis anguinus		Hyslopum	
Characias		Tragoriganum	
Helleborum nigrum		Pulegium	
Ficus	Glutinum	Distamnus	
Laserpitium	Olea	Sison	Anison
Pruna		Smyrnion	
Rhaponticum		Peucedanum	
Ruta	Sal	Sagapenum	
Vitis fatiua		Ammoniacum	
Vinum tethalassonic -		Viscum	Polium
num.		Chamaedrys	Leucoion
LIENIS morbi		Nymphæa	Asplenon
remedia.		Hemionitis	
Iris Illyrica		Erythrodanum	
Nardum Gallicum		Vetonica	
Myrice	Acorus	Lonchitis altera	
Canthamum		Polemonia	
Oleum amygdalinum		Clymenon	Xyris
Lycium	Vitex	Anchusa	Vrtica
Cotonea	Linum	Adiantum	Pteris
Ficus Aegyptia		Ampelos leuce & agria	
Lac humanum		Aqua maris	
Lupinum satiuum		Vitis fatiua	
Rhaphanus		Acetum scillicum	
Lapathum	Sinapi	Vinum panacite	
Brassica fatiua		Ferrum	Corallium
Nasturtium		Lapis Asius	Coris
			Her



# INDEX

Hermol. Cor. cap. 124.  
 LINGVAE utilia.  
 Olea Aethiopica.  
 LIPPITVDI-  
 nis remedia.  
 Ebenus  
 Lapis hæmatites  
 Plantago Spongiæ.  
 LIQVORES qui  
 perimunt.  
 Dioscorides libro 6. in  
 præfat.  
 LIVOREM emen-  
 dantia.  
 Allium Aqua maris  
 Juglans  
 Lana succida  
 Rhaponticum  
 Sinapi  
 Lupinum satium  
 Thapsia.  
 LOCORVM mulie-  
 brium remedia.  
 Anethum Althæa  
 Fœnogræcum  
 Linum Leucoion  
 Trifolium  
 LVMBRICOS  
 necantia.  
 Coriandri semen  
 Absinthium seriphium  
 Brassica sativa  
 Chamæleon albus  
 Calamintha  
 Myrrha Portulaca  
 Oleum cicutum  
 Thelypteris  
 Lupinum satium.  
 LVMBORVM affe-  
 ctuum remedia.  
 Asparagus Capparis  
 Chamæpeuce  
 Echion Harundo  
 Leucacantha  
 Papauer cornutum  
 Sampsuchinum  
 Smyrnion.  
 LVPOS necantia.  
 Aconitum pardalian-  
 ches  
 Aconitum alterum  
 Apocynum.  
 LVSCIOSORVM  
 remedia.  
 Fel animalium  
 Sanguis.  
 LVXATIS utilia.  
 Asparagus Acantha  
 Aphronitrum  
 Bulbus esculentus  
 Finum  
 Harundo  
 Heliotropion  
 Juglans Lilium  
 Narcissus  
 Polypodion  
 vitex  
 vrtica  
 vitis sativa  
 vinum pissite  
 Sampsuchus  
 Sal-

MAC



CVRATIVVS.

<b>M</b> ACIEI corpo ris remedia.	Apium	Asclepias
Erinaceus.	Hemerocallis	
<b>M</b> ACVLAS tol- lentia.	Althæa	
Oleum balaninum.	Chamæpitys	
<b>M</b> ACVLAS rube- scere facientia.	Epimedium	Cici
<b>C</b> rocodilea, id est, Cro- codilli terrestriis simū.	Hyoscyamus	
<b>M</b> ALIS medicamen- tis contraria.	Vinacei	
Adeps	Aqua maris	
Ruta	Fæx vini	
Pentaphyllon	Terra samia.	
Antirrhinon.	<b>M</b> AMMÆ virginum ne crescant.	
<b>M</b> ALORVM quæ serpunt remedia.	Cicuta	Cotis.
Acacia	<b>M</b> ASCVLVM	
Plantago	filium gene- rantia.	
Polygonon mas	Cratæogonos	
Helxine	Phyllon	Orchis.
Cicuta	<b>M</b> ATRICIS mor- bi remedia.	
Strychnum satium	Malua	
Aizoon maius	Oleum balaninum	
Colymbades oliuæ	Pæonia.	
Sabina.	<b>M</b> AXILLARVM	
<b>M</b> AMMARVM	doloris remedia.	
morbi remedia.	Ceruinum cornu.	
Asarum	<b>M</b> EATVS ape- rientia.	
Cotonea	Allium	Cyperus.
Iuglans	<b>M</b> ECONIO	
Thus	contraria.	
Erysimon	Passum & protropen vi- num	
Ochra	Acetum	Oxymel.
Eruum	<b>M</b> ELICERIDVM	
Asphodelus	morbi remedia.	
Mentha		
Scammonia		
Sandaracha		
Triticum		
Baccharis		

T



# INDEX

Serum	Chondrylla
Parthenion	Lactuca syluestris
Helleborum nigrum	Caucalis Eruca
Epithymum	Ocymum Cape
Acetum scilliticum	Orobanche Allium
Amomum	Porrum
Melilotus.	Ampeloprason
M E N S T R V A	Nasturtium
prouocantia.	Thlaspi
Iris Illyrica	Struthion
Meu Cyperus	Cyclamino
Asarum Casia	Asphodelus
Cinnamomum	Capparis
Costum	Anemone
Iuncus odoratus	Hedera
Balsamum	Agaricum
Canchamon	Aristolochia tertia
Helenium Myrrha	Centaurium maius &
Sampfuchinum	minus
Amaracinum	Eryngion
Abrotonum	Absynthium
Styrax Naphtha	Origanum
Cedrides Myrice	Tragoriganum
Tilia Hypocistos	Pulegium
Lycium Acacia	Elelisphacos
Vitex	Calamintha
Olea syluestris	Thymus
Lotus	Serpyllum
Amygdala amara	Sampfuchus
Ficus	Baccharis Ruta
Cochleæ terrestres	Panaces heracleon
Fiber Buprestis	Ligusticum
Oesypus Fimum	Seseli Malsiliense
Cicer Rhabbanus	Tordylon
Lapathum	Sison Anisum
Brassica satua	Feniculus
	Orasc



# CVRATIVVS.

Oroselinum		Heliotropion maius
Petroselinum		Vinum scilliticum
Hippomarathrum		Vinum absynthite
Hipposelinum		Vinum hyssopite
Smyrnion		Vinum aromatite
Daucus	Libanotis	Vinum daucite
Melanthion		Vinum panacite
Laserpitium		Vinum helleborite
Sagapenon		Vinum di&amnite
Euphorbion		Staphylinus.
Clynopodium		MENSTRVA
Chamædrys	Lilium	sistentia.
Melissophyllum		Lentisci succus
Prasium	Stachys	Myrica
Trifolium		Oxyacanthos
Polium	Scordion	Thus Palma
Artemisia		Malum punicum
Leucoion		Myrtus
Anthemis	Pæonia	Lepus terrestris
Erythrodanum		Fuligo butyri
Anagyris		Coagulum
Alisma	Coris	Sanguis Acinos
Hypericon		Acantha Arabica
Cestron	Medion	Hieracium maius
Xyphion	Tragion	Nymphæa
Heliochrysos		Pæonia Limonion
Mandragoras		Medion
Vrtica	Myrtus	Sideritis achilleos
Adiantum		Rubus
Myrtus syluestris		Idæa radix
Laurus Alexandrina		Tragos Lyfimachia
Daphnoides		Oxyschænos
Chamædaphne		Heliochrysos
Helleborus niger & al-		Papauer satium
bus		Mandragora
Ampelos melana		Aizon maius



# I N D E X

Aerugo ferri  
 Vinum rhetinite  
 Fæx vini  
 Lapis Afius  
 Morochthus  
 Hæmatites  
 Ostracites  
 Terra samia.

M E N T E M com-  
 mouentia.

Coriandrum  
 Oreoselinum

M E T A L L A quæ  
 perimunt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

M O L L I E N T E S  
 medicinæ.

Vide, Demollientes.

M O R B I regii  
 medicinæ.

Vide, Regii morbi.

M O R B O R V M quæ  
 serpunt remedia.

Vide, Malorum quæ ser-  
 punt.

M V L I E R V M deside-  
 rio quo satisfiat.

Acorum

Picea Pinus

Adeps bubulus.

M V L I E R V M  
 infirmitatum  
 remedia.

Amomum

Balsamum

Susinum

Seseli Mafsiliense.

M V R E S necantia.

Chamæleon albus

Aconitū pardalianches

Helleborus candidus

Hermol. Cor. cap. 28.

M V R I S aranei mor-  
 sus remedia.

Mus araneus

Absynthium

Chrysogonon

Diosc. lib. 6. cap. 62.

M V R I S morsus  
 remedia.

Grossi Allium.

M V S C A S necantia.

Lyfimachia.

M Y R M E C I A S  
 tollentia.

Ficus.

N A R I V M morbi  
 remedia.

Malum punicum.

N A V S E A M discu-  
 tientia.

Tragorigannum

Pulegium

Fœniculus.

N A V S E A M mo-  
 uentia.

Laurinum

Susinum.

N E R V O R V M mor-  
 bi remedia.

Oleum sicyonium

Oleum clæmeli

Laur



# CVRATIVVS.

Laurinum		MODIS vtilia.
Cyprinum		Bdellium.
Gleucinum		NOMARVM mor-
Amaracinum		bos curantia.
Metopium	Bdellium	Asparagus
Lixiua ex ficu		Sabina Papyrus
Erinaceus terrestris		Cistos
Cochleæ terrestres		Olea syluestris Olea
Vipera		Oliuæ colymbades
Vermes terreni		Malum punicum
Lac humanum		Smarides
Triticum	Poterium	Fel animalium
Peucedanum		Vrina Lilium
Laserpitium		Plantago Arisaron
Lilium	Satyrium	Asphodelus
Melissophyllon		Maron Prasium
Althæa	Coccus	Orchis serapias
Erigeron	Cacalia	Eritannica
Narcissus		Peristereon supinus
Hippophæstion		Galiopsis
Vini qualitas		vua ænanthe
Aqua maris		Omphacinum
Acetum scilliticum		Acetum Oxalme
Vinum slichadite		Squama æris
vinum thymite		Aerugo aurificum.
Fæx vini	Fiber.	Chalcites lapis
NERVOS lædentia.		Flos salis
Malus	Hedera	Lapis ostracites.
vinum		NVBECVLAS
vinum gypsatum		oculorum emen-
Mesagite.		dantia.
NERVOS tollentia.		Vide, Oculorum reme-
Mel sardoum.		dia.
NIGREDINES		NYCTILOPARVM
abstergit.		morbi remedia.
Sabina.		Vide, Luscioforum re-
		T ;



# INDEX

media.		Oleum vulgare	
<b>O</b> BMVTESCE-		Elæomeli	
re facientia.		Oleum amygdalinum	
Mandragora.		Myrrha	Thus
OCVLORVM epi-		Fuligo thuris & resinæ	
phoræ remedia.		& picis	
Afarum		Picea	Cupressus
Malabathrum		Sabina	Platanus
Cotonea	Sesamum	Populus alba	
Lens	Cucurbita	Myrice	Acalis
Anemone		Ebenus	Rosa
Argemone		Lycium	Acacia
Myosotis		Salix	
Gentiana		Olea sylvestris	
Baccharis	Ruta	Olea	
Apium	Hemerocallis	Olea Aethiopica	
Rubus idæa		Palma Thebaica	
Papauer satium		Cytinus	Myrtus
Phlomis		Cerasia	
Aster atticus		Halicacabus	Mituli
Viola purpurea		Cochleæ terrestres	
Cici.		Scorpius marinus	
OCVLIS contraria.		Vipera	
Lactuca		Senecta serpentis	
Porrum	Ocimum	Sepia	
Coriandrum		Mullus piscis	
Anethum.		Ouum	Hirundines
OCVLORVM mor-		Ceruinum cornu	
borum remedia.		Lac humanum	
Acorum	Casia	Costus	
Cinnamomum		Fuligo butyrî	
Amomum		Lana vîta	Oelypus
Balsamum		Fel animalium	
Canchamum		Sanguis	
Crocum		Vrina	Mel
Crocomagma		Amylum	
			Faba



# C V R A T I V V S.

Faba	Lens	nutum
Brassica fatiua		Hyoscyamus
Portulaca		Mandragoras
Seris	Pepo	Aconitum pardalian-
Lactuca syluestris		ches
Ocymum	Cæpe	Aizoon maius
Sinapi	Piper	Helleborus albus
Zingiber		Cici Chamæsyce
Cyclaminos		Capnos
Asphodelus		Lotus fatiua
Dracunculus maior		Sesamoides maius
Dracunculus minor		Aes vstum
Argemone		Vua ænanthe
Anagallis		Vinum Surrentinum
Chelidonium maius		Acetum scilliticum
Othonna		Cadmia
Centaurium minus		Squama æris
Tragacantha	Aloe	Aerugo aurificum
Absyntbium		Plumbum elotum
Abrotonum		Stimmi Cinnabaris
Ruta	Sampsuchus	Chalcitis lapis
Melilotus		Alumen Pumex
Ruta Galatica, siue syl-		Sal Flos salis
uestris		Fæx vini Spongia
Panaces heracleon		Corallium
Fœniculus		Pyrites
Libanotis		Hæmatites
Sagapenon		Galactites Thyites
Ammoniacum		Morochthus
Sarcocolla		Sapphirus
Chamædryes		Geodes
Praſium	Stœbe	Samius.
Tribulus	Erinos	O P I S T H O T O N I
Gramen Parnasium		corum, id est, cerui-
Rubus	Elatine	cis rigore laboran-
Papauer satium, et cor		tium remedia.



# INDEX

Acanthion		id est, difficulter spirantibus remedia.
Eryngion		Helenium
Laserpitium		Myrrha
Sagapenon		Capressus
Satyrion	Coris.	Daphnides
OPII remedia.		Cotonea
Sal		Struthion
Diosc. lib. 6. cap. 17.		Cyclaminos
ORIS halitus remedia.		Dracunculus maior
Vide, Halitus oris remedia.		Abrotonum
ORIS ulcerum remedia.		Hyssopus
Cyperus	Aspalathus	Calamintha
Fuligo picis	Cyprus	Thymus
Tilia	Acacia	Baccharis
Olea sylvestris		Seleli Malsiliense
Castanea		Hieracium maius
Malum punicum		Smyrnion
Mæna		Sphondylium
Lac schiston	Butyrum	Peucedanum
Plantago	Aloë	Melanthion
Origanum		Ammoniacum
Leucoion		Melissophyllon
Orchis serapias		Bechion
Anthemis		Borrys
Periclymenon		Anemone
Rubus		Hippuris
Staphis agria		Vrtica
Vua ænanthe		Elaterium
Omphacium		Hippophæston
Acetum scilliticum		Vinum panacite.
Sandaracha		OSSIUM squamas extrahentia.
Alumen	Sal.	Aristolochia
ORTHOPNOICIS		Ampelos leuce.
		OSSA fracta consolidantia



# CVRATIVVS.

lidantia.		Helxine
Vetonica	Xyris.	Ocymastrum
O V E S necantia.		Ammoniacum
Nerion.		Ifatis Plantago
O X Y P A R A ingre-		Xyphion.
dientia.		P A N T H E R A S ne-
Ligusticum		cantia.
Caros	Anethum.	Aconitum pardalian-
P A L P E B R A -		ches.
rum remedia.		P A P A V E R I S cu-
Vnguentum rosaceum		ratio.
Mastiche	Refina	Dioscor. lib. 6 . cap. 17.
Fuligo picis		& 18.
Grossi		P A P V L A R V M
Lixiua ex ficu		remedia.
Vrina	Alamen	Vrina Flos æris.
Chondrylla		P A R A L Y T I C O -
Vide supra, Genarum		rum remedia.
morbi remedia.		Capparis
P A L P E B R A R V M		Erythrodanum
pilli euulsi ne rena-		Colocynthis
scantur.		Ampelos melana
Tellinæ		Vinum scilliticum
Sanguis	Capnos.	Aphronitrum.
P A L L I D V M colo-		P A R T V S necantia.
rem facientia.		Daphnides
Hierachium minus		Coagulum
Aloc.		Adeps hircinus & ouil-
P A N O R V M remedia		lus & bubulus
Atriplex	Acetum	Nasturtium
Bulbus esculentus		Thlaspi Ruta
Coriandrum cum faba		Hedylaron
fracta		Helleborus albus & ni-
Coniza	Ficus	ger
Galiopsis		Colocynthis
Olea syluestris		Ampelos leuce



# INDEX

Vinum phthorium.	Clinopodium
P A R T V S quibus	Ammoniacum
iauat.	Chamædrys
Iris Illyrica	Prassum
Cinnamomum	Bechion
Bassamum	Artemisia
Vnguentum telinum	Coniza
Irinum	Leucoion
Amaracinum	Onofma
Myrrha	Anthemis
Picea	Fiber Anchusa
Olea Aethiopica	Mandragoras
Oesypum	Laurus Alexandrina
Fimum	Ampelos leuce
Cicer	Heliotropium maius
Lupinum satium	Vinum panacite
Allium	Vinum helleborite
Cyclaminos	Alumen
Dracunculus maior	Sulphur
Dracunculus minor	Lapis Iaspis
Hedera	Aetites
Gentiana	Samius.
Centaurium maius	P A R O N Y C H I A -
Centaurium minus	rum, id est, vngulum
Pulegium	morborum remedia.
Elelisphacos	Thus cum melle
Calamintha	Olea sylvestris
Baccharis	Myrtus
Panaces heracleon	Ebur
Staphylinus	Paronychia
Thynni falsi caro	Vua cœnanthe
Seseli Mafiliense	Aerugo ferri
Smyrnion	P A R O T I D V M id
Peucedanum	est, aurium apostema
Sagapenum	tum remedia.
Galbanum	Ficus
	Fim



# CVRATIVVS.

imum		Terebinthina
inum	Faba	Iuniperus
apathum		Ficus
lantago		Pomum
rysimon		Nasturtium
iscum	Althæa	Piper
syllium		Chelidonium minus
trychnon satium		Rhaponticum
Vrtica		Stichas
Galiopsis		Thymus
Terra cimolia.		Ruta
Et in verbo, Aurium		Libanotis
medicinæ.		Sagapenum
PAVESEM.		Ammoniacum
tium remedia.		Scordion
Linum		Bechion
Melicratum		Vrtica
Hydromel.		Isopyrum
PECORIS scabiem		Vinum cedrite
emendantia.		Vinum aromatite
Vide, Iumentorum sca-		Vinum nectarite
biem.		Vinum daucite.
PECORI vtilia.		PEDICVLOS ne-
Adiantum.		cantia.
PECVS necantia.		Allium
Nerion		Alumen
Aconitum lycoctonon.		Mel
PECVS mortuum		Cedria.
extrahentia.		PEDVM qui à frigo-
Aristolochia.		re-asserunt remedia.
PECTORIS morbi		Cyclaminos.
remedia.		PEDVM rimarum
Acorus	Meu	remedia.
Costum	Myrrha	Scilla
Iuncus odoratus		PERFRICTIO-
Pityides		nis medicinæ.
		Iris



# INDEX

Iris Illyrica	Asphodelus
Cyperus	Scilla
Balsamum	Batrachion
Oleum	Arction
Ficus Aegyptia	Cotyledon prima
Vinum stichadite.	Aqua maris
PERCVSSIS à fe-	Alumen.
ris vtilia.	PERIPNEVMO-
Balsamum	niacorum remedia.
Paliurus	Abrotonum
Mustela	Tragoriganum.
Ouum	PESTILENTIAE
Argemone	contraria.
Hippomarathrum	Myrrhis, id est celifo-
Coagulum	lium.
Sanguis	Vinum omphacite.
Piper	PHALANGIO-
Elaphoboscon	rum idus remedia.
Phyllitis.	Cinnamomum
PERNIONVM re-	Terebinthus
media.	Myrica
Vnguentum melinum	Myrtus
& telinum	Lixiua ex fico
Thus cum fuillo adipe	Cancri
Acacia	Malua
Ficus	Asparagus
Cancri	Lactuca syluestris
Pulmo marinus	Hedera
Vngues asini	Abrotonum
Adeps	Daucus
Eruum	Sphondylium
Rapa satina	Aparine
Beta	Phalangium
Cyclaminos	Myrrhis
Dracunculus maior	Aqua maris
Dracunculus minor	Diosc. lib. 8. cap. 58.
	Phag



# CVRATIVVS.

PHAGEDAE NAE

morbi remedia.

el Fimum

Dracunculus minor

fatis

Chamaeleon niger

anaces

taphylinus

etafites

Characias

Ampelos leuce

Vinum

Acetum

Alumen

sal Flos salis.

PHARICO veneno

contraria.

Vinum Albanum

Dios. lib. 6. cap. 19.

PHLEGMATIS

contraria.

Plantago.

PHRENETICO-

rum remedia.

Crocium

Vitex

Asparagus

Serpyllum

Coniza tertia

Leucoion.

PHTHIRIASIS. si

ne pedicularis mor-  
bi remedia.

Strigmenta gymnasto-  
rum

Myrica

Hedera

Staphis agria

Sandaracha.

PTHISICO-

rum remedia.

Pix

Adeps

Porrum

Agaricum

Rhaponicum

Acantha

Prasium

Cestrum

Lapis Asius.

PILI genarum ne

defluant.

Spica nardi

Cochleæ terrestres

Oesypus

Chondrylla

Armenius lapis.

PILI palpebrarum

euulsi ne rena-

scantur.

Tellinæ

Sanguis

Capnos.

PILI alarum euulsi

ne renascantur.

Fabæ.

PITVITAE crassæ

remedia.

Iris Illyrica

Sesamum

Hysopus

Thymoxalme.

PIT



# INDEX

PITUITAE	remedia.	Clematis
Cinnamomum		Sideritis achilleos
Styrax	Naphtha	Hyoscyamus
Vlinus		Helleborum nigrum
Anellana		Sesamoides maius
Ouum		Cucumis
Serum		Elaterium
Vrina		Staphis agria
Hordeum		Thapsia
Linum		Hippophaes
Faba		Hippophaeston
Lupinum sativum		Cici Characias
Agrio raphanus		Lathyrus
Portulaca		Scammonia
Cucurbita		Thymelæa
Capa		Ebulus
Sinapi		Apios
Piper		Colocynthis
Cyclaminos		Epithymon
Dracunculus maior		Empetron
Capparis		Ampelos leuce
Anemone		Polypodion
Anagallis		Heliotropium maius
Centaurium minus		Vua passa
Tragacantha		Aqua maris
Hyssopus		Vinum rhetinite
Origanus		Vinum aromatite
Tragoriganum		Vinum mandragorite
Pulegium		Vinum scammonite
Thymus		Sulphur Peplus
Ruta		PITYOCAMPARUM
Pyrethrum		rum curatio.
Sphondylium		Diosc. lib. 6. cap. 2.
Melanthium		PLAGARVM vicia
Parthenion		ces emendantia.
		Susino.

PLAN



# CVRATIVVS.

PLANTAE quæ pe-Scordion  
rimunt

Diosco. lib. 6. in præfat. Androsaces

PLEVRETICO Helxine

rum remedia. Papauer fatium

Staphylinus Hyoscyamus

Laserpitium Lens palustris

Aethiops. Aizoon maius

PODAGRÆ mor- Bryon thalassion

bi remedia. Phycos marinus

Amomum Cucumis anguinus

Naphtha Balanus myrepica

Populus nigra Ebulus

Amurca Heliotropium maius

Salix Vua passa

Ficus Acetum Ferrum

Cochleæ terrestres Sulphur Sal

Mustela Lapis Asius

Marinus pulmo Lapis gagates

Lac humanum Testæ siue terre fornacum.

Adipum medicinæ POLYPI morbi remedia.

Sanguis scilicet menstruus. Dracunculus maior

Fimum Dracunculus minor.

Hordeum PRESTERIS serpentis morsus remedia.

Lens Omotarichos

Rapa fatua Rubus.

Brassica fatua PRAEPVTIO-

Seris rum morbire-

Cucurbita media.

Aros Aloë.

Asphodelus PRAECORDIO-

Bulbus esculentus rum remedia.

Pulegium Scor

Panaces Heracleon

Libanotis



# INDEX

Scordion

Vinum thymite

Vinum daucite.

**P R A E C I P I T A**

tis ex alto vtilia.

Iris Illyrica

Vitex

Asparagus

Anisum

Cannabis satiua.

**PROFLVVI** ge-  
nituræ remedia.

Vide Genituræ proflu-  
uii in fomno.

**PRVRIGINEM**

facientia.

Scolopendra

Ephemeron

Opium.

**PRVRIGINEM**

emendantia.

Vrina

Eruum

Lapathum

Aloë

Origanum

Palegium

Elelisphascos

Melilotus

Balanus myrepica

Acetum

Alumen

Sulphur

Sal.

**PSILOTHRVM,**

sive vnguentum de-  
pilatorium.

Lepus marinus

Hedera

Ampelos leuce

Dryopteris

Arsenicum.

**P S O R A E** morb

remedia.

Cardamomum

Oleum amygdalinum

Lycium

Olea

Palma clate

Ficus

Erinaceus marinus

Cicer

Lupinum satium

Batrach ion

Chelidonium minus

Origanum

Pentaphyllon

Staphis agria

Balanus myrepica

Ampelos leuce

Vitis satiua

Aqua maris Sal.

**P S Y L L I I** curatio.

Diosc.lib. 6.cap. 10.

**P T E R I G I I** morbi

remedia.

Acacia

Rhus

Malum punicum

Myrtus

Ficus

Glycyrrhiza

Aloë

Pras



# CVRATIVVS.

Praſium  
 Pentaphyllon  
 Characias  
 Ampelos leuce  
 Vua œnanthe  
 Acetum  
 Alumen  
 Sal  
 Ferri rubigo.  
 PVBERTAS ne  
 erumpat.  
 Hyacinthus.  
 PVLMONIS mor-  
 bi remedia.  
 Iuncus odoratus  
 Baſſamum  
 Cedria  
 Amygdalus amara  
 Ficus  
 Lac  
 Pulegium  
 Ruta  
 Sagapenum  
 Symphyton  
 Pentaphyllon  
 Chryſocome  
 Vrtica  
 Thapſia  
 Melicratum  
 Vinum hyſſopite  
 Vinum aromatite.  
 PVLICES ne cãtia.  
 Vnguentum telinum  
 Crecinum  
 Butyrum.  
 PVTREDINVM ge

nitalium remedia.  
 Aſpalathus.

## PVTREDINES purgantia.

Irinum  
 Cinnamomum  
 Pix  
 Sal

**Q** VADRVPE-  
 dum ſcabiẽ  
 emẽdantia.

Vide Iumentorum ſca-  
 biẽ.

QVARTANA E fe-  
 bris remedia.

Vide, Febris quartanæ  
 remedia.

**R** ADICES quæ  
 perimunt.

Dioſc. lib. 6. in præfat.

RAVCEDINIS re-  
 media.

Tragacantha  
 REDVVIAS fa-  
 nantia.

Ferri rubigo.  
 REFRIGERAN-  
 tes medicinæ.

Vnguentum melinum

Cupreſſus

Rhodides

Rola

Acacia

Ouum

Sonchos

Seris



# INDEX

Laſuca	Atriplex
Caros	Asparagus
Coriandrum	Eryſimon
Hieracium maius	Scilla
Polygonum duplex	Chelidonium
Clymenon	Aloë
Periclymenon	Abſynthium
Helxine	Origanum
Papauer ſatium	Hippomarathrum
Psyllium	Libanotis
Cicuta	Sphondylium
Lens paluſtris	Laſerpitium
Aizoon duplex	Praſium
Erigeron	Scordion
Phacos thalaſſion	Aſplenon
Potamogeton	Anthemis
Cytisus	Pæonia
Ebulus	Erythrodanum
Acetum	Chamæpitys
Omphacomeli	Pentaphyllon
Pompholyx	Hyacinthus
Plumbum elotum	Halicacabus
Spuma argenti	Chamæciſſos
Ceruſſa	Oſyris
Corallium	Myrtus ſylueſtris
Terra	Elaterium
Lapis ſamius	Vinum chamædryte
Terra ampelitis.	Vinum calaminthite
REGII morbi	Vinum nardite
remedia.	Sulphur.
Nardi ſpica	RENVM doloris
Schiſtos	remedia.
Ceruinum cornu	Amygdala amara
Fimum	Asparagus
Cicer	Anagallis
Lapathum	Agaricus
	Anth



# CVRATIVVS.

Anthyllis	Vua passa
Anchusa	Vinum
Halcyonium	Vinum cydonite
Cardamomum	Vinum holosanthinum
Calamus odoratus	Erinaceus terrestris
Cicer	Casia Fœniculus
Cinnamomum	Vinum absynthite
Chamæpitys	Vinum nardite
Passum	Vinum aromatite
Glycyrrhiza	Oleum balaninum.
Iuncus odoratus	R H A G A D V M
Laurinum	remedia.
Lac	Pix
Lotus sativa	Lycium
Meu	Vitex
Pistacia	Cancr.
Nardus Gallica	R H E V M A T I-
Nuclei pini	smis vtilia.
Oleum amygdalarum	Acetum
Palma elate	Cupressus
Portulaca	Daphnoides
Plantago	Ficus
Porrum	Fæx vini
Petroselinum	Macer
Peucedanum	Oleum oleastri
Pæonia	Ouum
Rhaponticum	Perfica
Saccharum	Portulaca
Scandyx	Plantago
Smyrnion	Staphis agria
Symphyton	Triticum
Stratiotes aquaticus	Vini qualitas
Tragacantha	Vinum labruscæ
Cordylon	Vinum ex pyris
Vrina	Vinum myrtite.
Vetonica	R I C I N O S necãtia.



# INDEX

Cedria.	Fimum
RIGORES seu hor-	Dracunculus maior
rores febrium ex-	Dracunculus minor
cutientia.	Asphodelus
Gleucinum	Bulbus esculentus
Piper	Capparis
Panaces heracleon	Rhaponticum
Staphylinus	Gentiana
Vinum cedrite	Aristolochia
Pyrethrum.	Centaurium
RIMARVM sedis	Acantha
remedia.	Leucacantha
Vide, Sedis rimarum.	Abrotonum
ROSIONIS re-	Origanum
media.	Calamintha
Lac schiston.	Serpyllum
Pæonia.	Baccharis
R V C T V M mouentia.	Panaces heracleon
Mastiche	Libanotis
Rhaphanus	Laserpitium
Anethum	Sagapenum
Smyrnion	Galbanum
Vinum daucite.	Polycnemon
R V P T O R V M re-	Climopodion
media.	Althæa
Acorus	Celtron
Cardamomum	Symphyton
Alarum	Hololteum
Calamus odoratus.	Xyris
Helenum	Hr puris
Bdellium	Heliechryson
Inniperus	Phlomidis
Cedrides	Ampelos leuce
Halmos	Vinum daucite
Lixia ex ficie	Vinum trageriganite
Fek	Vinum panacie
	Lapis



# CVRATIVVS.

Lapis scistos.	Amylum
<b>S</b> AGITTAS infi-	Portulaca
xas extrahentia.	Plantago
Vide, Spicula infixa.	Porrum
<b>SALIVAM</b> euo-	Erysimon
cantia.	Agaricum
Pyrethrum.	Aloë
<b>SALAMANDRAE</b>	Rhaponticum
veneni remedia.	Centaurium
Diosc. lib. 6. cap. 4.	Acantha leuce & Ara-
<b>SANGVINEM</b> ex-	bica
creantibus vtilia.	Ferula
Iuncus odoratus	Althæa
Aspalathus	Cestron
Thus in potu datum	Lyfimachiæ
Lentiscus	Symphytum
Mastiche potu data	Polygonon mas
Naphtha	Symphytum alterum
Cupressus	Clymenon
Macer	Aethiopis
Myrica	Isopyrum
Hypocistis	Adiantum
Rosa	Vitis sativa
Lycium	Vua
Salix	Omphacium
Quercus	Vinum phœnicite
Palma	Corallium
Malum puniceum	Lapis hæmatites
Myrtus	Terra samia.
Cichorium	<b>SANGVINEM</b> fi-
Amygdalus amara	stentia.
Ouum	Thus
Ceruinum cornu	Cupressus
Fimum	Galla
Coagulum	Persea
Triticum	Cochleæ terrestres



# INDEX

Ranæ	Gypsum.
Araneus	SANGVINEM con-
Ouum	cretum discutientia.
Coagulum	Lixiua ex ficu
Sanguis	Thymus
Fimum	Heliochryson.
Faba	SANGVINEM per
Plantago	vrinam expellentia.
Porrum	Eruum
Ifatis	Cantharides
Elelisphacos	Ammoniacum.
Mentha	SANGVINEM per
Serpyllum	nares expellentia.
Ruta	Crocodilium.
Cyminum satium	SANGVINEM per
Stœbe	vrinam reddentium
Ferula	remedia.
Clymenon	Cyminum syluestre.
Hippuris	SANGVISVGAS
Sideritis achilleos	necantia.
Pentaphyllon	Oxalme
Phoenix herba	Diosc.lib.6.cap.32.
Astragalus	SANDARACHAE
Lichen in petris	curatio.
Idæa radix	Diosc.lib.6.cap.19.
Gallium	SARDONIAE
Stratiotes terrestres	curatio.
Vua ænanthe	Diosc.lib.7.cap.14.
Acetum	SCABIE M iumento
Vinum terebinthinum	rum emendantia.
Plumbum elotum	Vide,Iumentorum sca-
Stimmi	biem.
Cinnabaris	SCABIE I morbi
Alumen	remedia.
Sulphur	Argemone prima
Spongiæ	Chamaeleon niger
	Hel



# CVRATIVVS.

Helleborus niger		Sampsuchum
Oesypum	Sal	Hieracium maius
Oleum oleastri		Delphinion
Sinapi		Lasertitium
Sulphur		Atraçilis
Vnguentum melinum.		Lychnis vtraque
SCOLOPENDRAE		Millefolium
morius remedia.		Phalangium
Grossi		Polemonia
Scolopendra		Chamaefyce
Asphodelus		Heliotropium
Sal.		Scorpioides
Diosc.lib.6.cap.59.		Aqua maris
SCORPIONIS iæus		Vinū tethalassomenum
remedia.		Vinum cydonite
Cyperus		Sulphur
Amomum		Sal
Cardamomum		Lapis sapphirus.
Cinnamomum		Diosc.lib 6.cap.60.
Daphnoides		SCORPIONES
Myrtus		necantia.
Ficus		Cancr.
Cancr		SCORPIONIS marini
Scorpius terrestris		iæus remedia.
Smarides		Vrina
Mullus piscis		Asphodelus
Locustæ		Plumbum syncerum &
Lacerta		crematum
Mures domestici		Sulphur.
Fimum		Diosc.lib.8.cap.6r.
Lapathum		SCORPIONES torpe-
Sonchos		facientia.
Seris		Delphinion
Lactuca syluestris		Lychnis syluestris
Ocymum		Lenspalestris.
Abrotonum		SECVDINAS



# I N D E X

trahentia.		media.
Balsamum		Thus
Sampsuchinum		Lentiscus
Abrotonum		Pix
Picea	Schistos	Amurca
Fiber		Malum punicum
Iecur mergi		Myrtus
Linum		Cancrī
Aristolochia tertia		Ouum
Thymus		Oesypum
Pulegium		Adeps
Prasum		Lens
Stachys		Malua
Artemisia		Althæa
Oenanthe		Portulaca
Hemerocallis		Sonchos
Erythrodanum		Anagallis
Anagyris		Melilotus
Myrtus		Lasertium
Adiantum		Aster Atticus
Ampelos leuce		Viola purpurea
Vinum dictamnite.		Cucumis anguinus
SEDIS rimarum		Colocynthis
remedia.		Acetum
Strigmenta balneorum		Oxalme
Meu	Aloë	Vinum terebinthinum
Dipsacos		Flos æris
Leucoion.		Plumbum elotum.
SEDIS inflammatio-		SEMINA quæ
nis remedia.		perimunt.
Oleum cicinum		Diosc. lib. 6. in præfat.
Amaracinum		SENSIBVS nocētia
Lens	Libanotis	Vinum annosum.
Symphyton		SENSVS recreantia.
Erigeron		Lapis Samius.
SEDIS morbi re-		SEPIUS bestiolæ mor-
		sus



# CVRATIVVS.

sus remediæ.	Anchusa	
Portulaca	Ocinoides	
Oxymel.	Hyacinthus	
SERPENTIVM ve	Mandragoras	
nenis contraria.	Nerion	
Paliurus	Adiantum	
Vitex	SERPENTES	
Canceri	fugantia.	
Hippopotamus	Iuniperus	
Fiber	Mustela	Cornu ceruium
Gallinaceus	Adeps	
Cantharides	Nasturtium	
Chondrylla	Dracunculus maior	
Nasturtium	Abrotonum	
Dracunculus	Origanum	
Asphodelus	Calamintha	
Rhaponticum	Peucedanum	
Aristolochia tertia	Melanthion	
Origanum sylvestre	Galbanum	
Baccharis	Polium	
Ruta	Oenanthe	
Phlomos, siue verba-	Lysimachia	
scum	Alter Atticus	
Panaces chironium	Vinum conizite	
Staphylinus	Lapis gagates.	
Smyrnion	SERPENTIVM	
Aparine	morsus remedia.	
Chamædrys	Iris Illyrica	
Lychnis fatiua, siue co-	Asarum	
ronaria	Cinnamomum	
Erythrodanum siue Ru-	Balsamum	
bia	Pix	Naphtha
Sparganion	Iuniperus	
Polygonon mas	Platanus	
Clematis daphnoides	Erica	Glandes
Polemonia	Pistacia	



# INDEX

Ficus Aegyptia	Sagapenon
Pastinaca piscis	Praſion
Ranæ	Phyllitis
Gobius	Trifolium
Fel	Scordion
Omotarichos	Ceſtron
Fimum	Periclymeuos
Marinus pulmo	Echion
Mel	Ocymoides , ſive ocy- maſtrum
Eruum	Rubus
Diſtamnus	Eupatorium
Rhaphanus	Heliochryſon
Agaricum	Adiantum
Brasſica ſatiua	Periſtereon ſupinus
Cyclaminos	Ebulus
Ampelopraſon	Ampelos leuce
Dracunculus minor	Vitis ſatiua
Asphodelus	Vinum
Anagallis	Acetum
Acantha leuce	Oxymeli
Abrotonum	Vinum conizite
Asclepias	Vinum panacite
Origanum	Sal Cinis vitis
Lilium	Lapis ophites.
Calamintha	SERPENTES ne feriant.
Clinopodium	Cerui medulla.
Serpyllum	SERPENTES ne- cantia.
Leontopetalon	Anchuſa onocheles
Panaces heracleon & aſclepion	Vinum cedrite.
Cyminum ſatiuum & ſylueſtre	SICCANTES me- dicinæ.
Ammi	Ammi
Fœniculum	Bromos
Daucus	
Libanotis	

Ciſt



# CVRA TIVVS.

Cistos	Glycyrrhiza
Cyminum sativum	Symphyton
Ebulus	SMILACI cōtraria.
Aes vstum	Vide, Taxo contraria.
Arena litoris	SOMNIFERAE
Libanotis	medicinæ.
Mentha	Amygdalæ amaræ
Pompholyx	Halicacabus, siue sola-
Spodium	num vesicarum
Rubus	Anisum
Terra Chia	Amomum
Rubrica sinopis	Cistos tertia, siue lada-
Fæx vini	num
Diphryges.	Baccharis
SINGVL TVM pel	Dorycnion
lencia.	Hyoscyamus
Fiber	Lactuca
Sisymbrium	Iris Illyrica
Rhaponticum	Opium
Mentha	Mandragoras
Aristolochia tertia	Papauer rhœas, siue sa-
Anethum	tium
Cyminum sylvestre	Porrum
Alysson	Styrax
Asplenon	Smilax hortenſis
Clymenon	Strychnon hypnoticon
Saxifragum.	siue solanum somni-
SIRIASIS remedia	ficum
Cucurbita	Vitex
Pepo	Vinum nouum
Heliotropium maius.	Lapis menphites.
SITIM generantia.	SOMNV M discu-
Cape Allium	tientia.
Capparis	Sphondylium
Vini qualitas.	Peucedanum.
SITIM extinguentia.	SOMNIA imaginosa

&



# I N D E X

& mala inducentia.	Silurus
Faba	Triticum
Leus	Tragion
Pygnochomum	Xyphion
Smilax leuis.	Xyris
SORDES purgantia.	Lacerta.
Irinum	SPISSANDI vin
Cortex thuris	habentia.
Sabina.	Acacia
SPATICORVM	Cotonea
remedia.	Malum syluestre
Fiber.	Amygdalus amara
SPASMI remedia.	Baccharis
Vide, Convulsionis re-	Britannica
media.	Polygonon mas & fœ-
SPIRITVM, id est,	mina
flatum generantia.	Clymenon
Gentiana.	Medion
SPIRANTIBVS	Rubus
difficiliter vtilia.	Helxine
Vide, Orthopnoicis.	Idæa radix
SPIRITVS discurre	Hippuris
tes coërcentia.	Plyllium
■ dellium.	Bryon thalassium
SPIRANTIBVS vi	Potamo geton
tam auferentia.	Acetum
Cedria.	Vinum Hadrianum
SPICVLA infixæ cor	Aerugo aurificum
pori extrahentia.	Vinū nigrum labruscæ
Anagallis	Vinum Tyburtinum
Harundo	Cadmia
Aristolochia	Pompholyx
Dictamnus	Squama æris
Propolis	Pumex
Narcissus	Corallium
Oxyacantha	Rubrica sinopsis

Lap



# CVRATIVVS.

Lapishæmatites.	Terebinthina
<b>SPLENETICIS</b>	Cedrides
vtilia.	Melimela
Vide, Lienis morbire-	Pruna
media.	Arbutus
<b>SPVM AE argenti</b>	Iuglans
contraria.	Auellana
Vinum in commune.	Ficus
<b>SQVAMAS</b> ofsium	Hordeum
extrahentia.	Lens
Aristolochia tertia	Malua
Peucedanum.	Porrum
<b>STAPHYLOMA-</b>	Brassica sativa & mari-
tis remedia	na
Palma Thebaica	Cape
Lapis schistos.	Nasturtium
Lapis sapphiros.	Capparis
<b>STERNVTAMEN</b>	Ablynthium
tum mouentia.	Ablynthium seriphium
Iris Illyrica	Balanus myrepica
Fiber	Sinapi
Parmice	Vua
Struthion	Thynclæa
Batrachion	Ebulus
Daphnoides	Prasium
Helieborus albus.	Galbanum
<b>STERILES</b> fœmi-	Aqua maris.
nas facientia.	Vinum tethalassomenū
Vide, Generationem de-	<b>STOMACHI</b> mor-
primentia.	bi remedia.
<b>STIGMATVM</b>	Meu
remedia.	Nardi spica
Batrachion	Nardum Gallicum
Mandragora.	Malabathrum
<b>STOMACHO</b>	Iuncus odoratus.
contraria.	Agallochum
	Helenium

Oleum



# INDEX

Oleum balaninum	Lyncurion
Mastichinum	Saccharon
Vnguentum rosaceum	Faba Aegyptia
Sulinum	Sifer
Nuclei pini	Lupinum satium
Mastiche	Lapathum
Cupressus	Lampfana
Iuniperus	Brassica sativa
Laurus	Portulaca
Populus nigra	Sonchos
Rosa	Seris
Oliuæ colymbades	Cucumis
Palma	Lactuca
Palma elate	Gingidium
Malum punicum	Scandyx
Siliquæ	Aphace
Myrtus	Ampeloprason
Cotonea	Allium
Mala Epirotica	Zingiber
Armeniaca	Scilla
Mespilus	Lotus Bulbus esculentus
Pruna	Agaricum
Amygdalæ dulces	Rhaponticum
Pistacia	Gentiana
Juglans	Acantha leuce
Morus	Aloë
Persea	Absynthium
Ficus Aegyptia	Mentha
Ionia	Tragoriganum
Cochleæ terrestres	Pulegium
Ouum	Melilotus
Lac	Ligusticum
Lac humanum	Caros Anethum
Caseus	Cuminum sylvestre
Lana succida	Hieracium maius
Oryza	Apium

Pet



# CVRATIVVS.

Petroselinum	Vinum rhoite
Smyrnion	Vinum myrtite
Fœniculus	Vinum terebinthinum
Scordion	Vinum phœnicite
Artemisia	Vinum absynthite
Nymphæa      Præonia	Vinum bunite
Cestron	Vinum dictamnite
Polygonon mas	Vinum calaminthite
Rubus	Vinum aromatite
Strychnon satium	Vinum nectarite
Cotyledon prima	Vinum nardite
Erigeron	Vinum ex syluestri nar-
Adiantum	do
Aster Atticus	Vinum selenite
Viola purpurea	Ferrum
Chamædaphne	Flos salis
Colocynthis	Fæx vini
Vitis lamia	Lapis alabastrites
Nuclei acinorum	Lapis Samius.
Vua œnanthe	S T R V M A E gut-
Omphacium	turis remedia.
Vini qualitas	Iris Illyrica
Phalerum	Grossi
Hydromel	Vipera
Thymoxalme	Mustela
Omphacomeli	Vnguis asini
Vinum	Finum
Vinum Surrentinum	Hordeum
Vinum omphacite	Lolium
Vinum nigrum ex la-	Fabæ      Lens
bruscæ floribus	Lupinum satium
Vinum melitite	Lapathum
Vinum scilliticum	Andrachne, siue portu-
Vinum cydonite	laca syluestris
Vinum apiite	Plantago
Vinum anethinum	Piper

Capp



# INDEX

Capparis  
 Argemone  
 Coriandrum  
 Libanotis  
 Laserpitium  
 Aparine  
 Millefolium  
 Scordion  
 Libosfermon  
 Coryledon prima  
 Galioptis  
 Pseudobunion  
 Adiantum  
 Testæ huc terræ fornacum.  
**STRANGVLATUS** remedia.  
 Irinum  
 Absynthium.  
**STRANGVRIAE** morbi remedia.  
 Aspalathus  
 Cedrides  
 Locultæ  
 Alparagus  
 Silymbrium  
 Medica  
 Panaces heracleon  
 Sefeli Massiliense  
 Hipposcelinon  
 Hippomarathron  
 Polyenemon  
 Clinopodium  
 Oenantiæ  
 Coniza  
 Asplenon

Cape  
 Onobrychis  
 Polytenon mas  
 Saxifragon  
 Xyris  
 Laurus Alexandrina  
 Tragion  
 Pseudobunion  
 Adiantum.  
**STYPTICAE** medicinæ.  
 Vide, Adstrictoriæ medicinæ.  
**SVCCI** qui perimūt.  
 Diosc. lib. 6 in præfat.  
**SVDOREM** deprimentia.  
 Oleum  
 Oleum omphacinum  
 Oleum oleastri  
 Myrtinum  
 Lentiscinum  
 Unguentum melinum  
 Rhodides  
 Myrtus  
 Bulbus esculentus  
 Vinum myrsinite  
 Sulphur  
 Gypsum  
 Terra samia.  
**SVDOR L. Seuoctia.**  
 Metopium unguentum  
 Smyrnion  
 Pyrethrum  
 Onobrychis  
 Flos salis.

Anch



# CVRATIVVS.

Anchusa  
 Lycoplis.  
 SVES necantia.  
 Chamæleon albus.  
 SVFFVSIONVM  
 morbi remedia.  
 Fel Sanguis  
 Sagapenum  
 Euphorbium  
 Chamæsyce  
 Harena litoris.  
 SVGILLATORVM  
 remedia.  
 Acetum Sal.  
 SVPERCILIO-  
 rum raritati vtilia.  
 Picea.  
 SVPERCILIIS  
 glabris vtilia.  
 Fuligo resinæ.  
 SVPPVRATIO-  
 nis tuberculorum  
 remedia.  
 Crocomagma  
 Palimpissa.  
 SVPPVRATIO-  
 num remedia.  
 Ficus Aegyptia  
 Mel Hordeum  
 Lolium  
 Cucurbita  
 Ligusticum  
 Smyrnion  
 Althæa  
 Mandragoras  
 Vrtica

Narcissus  
 Ampelos leuce  
 Diphryges.  
 SVSPIRIOSO-  
 rum remedia.  
 Canchamum  
 Cyphi  
 Oleum amygdalarum  
 Pix  
 Ficus  
 Vulpinus pulmo  
 Eruum  
 Plantago  
 Agaricum  
 Rhaponticum  
 Aristolochia tertia  
 Hyssopum  
 Thymus  
 Acinos  
 Ruta  
 Galbanum  
 Ammoniacum  
 Prasium  
 Parthetium  
 Anagyris  
 Adiantum Thapsia  
 Ampelos leuce  
 Vinum passite  
 Vinum hyssopite.  
**T**ABIDI corporis  
 remedia.  
 vide, Phthysicorum re-  
 media.  
 TABESCENTI-  
 bus vtilia.  
 Daphnoides



# INDEX

- Vinum strobilite.  
**T A X O** contraria.  
 Vinum in commune  
 Acetum.  
 Diosc. lib. 6. cap. 12.  
**T E L A** infixa corpori-  
 bus extrahentia.  
 Vide, Spicula infixa.  
**T E N A S M I** mor-  
 bi remedia.  
 Lac schiston  
 Fœnogræcum  
 Linum  
 Eruum.  
**T E R E D I N E M**  
 sentientia.  
 Ficus Aegyptia  
 Hyoscyamus.  
**T E R E D I N E M**  
 non sentientia.  
 Tilia.  
 Hermol. Cor. cap. 133.  
**T E R E D I N E M**  
 necantia.  
 Sal.  
**T E S T I V M** mor-  
 bi remedia.  
 Vitex  
 Myrtus  
 Cicer  
 Faba  
 Erysimon  
 Asphodelus  
 Melilotos  
 Ruta  
 Cuminum
- Lilium  
 Hyoscyamus  
 Erigeron  
 Vua passa      Sal  
 Geodes lapis  
 Terra samia  
 Cimolia.  
**T H A P S I A E**  
 contraria.  
 Diosco. lib. 6. in præfat.  
 & cap. 33.  
**T H E R I A C A M**  
 ingredientia.  
 Rapa sativa  
 Zingiber  
 Dictamnus  
 Apium.  
**T H E R I O M A T V M**  
 remedia.  
 Lupinum sativum  
 Elelisphacos.  
**T H O R A C I S** reme-  
 dia.  
 Cerebrum gallinacei  
 Glycyrrhiza.  
**T H Y M O S** ab-  
 sumentia.  
 Smaris      Fimum  
 Thymus      Ruta  
 Heliotropium maius  
 Vitis sativa      Sal.  
**T I B I A R V M** vlce-  
 rum remedia.  
 Hydropiper  
 Ampelos leuce.  
**T I N E A S** latas  
 Pellem



# CVRATIVVS.

pellentia.	Pix	Cedria
Cardamomum	Lycium	
Costum	Pruna	
Malicorium	Morus	
Melimela	Ficus	
Iuglans	Morus	
Heliotropium minus	Hirundines	
Vinum absynthite	Lac schiston	
Lupinum satium	Mel	Sinapi
Brassica satua	Aloë	
Portulaca	Origanum	
Chamaeleon albus	Britannica	
Hyssopum	Periclymenos	
Calamintha	Helxine	
Thymus	Peristereon supinus	
Coriandrum	Ruta	
Melilotum	Omphacium	
Bryon thalassion	Vinum myrsinite	
Pteris	Flos æris	
Thelypteris	Alumen	Sal.
Vinum cedrite	TORMINIS remedia.	
Chalcanthum	Iris Illyrica	
Anchusa tertia.	Acorus	Meu
TINEAS rotun-	Cardamomum	
das generantia.	Balsamum	
Triticum.	Agallochum	
TINEAS necantia.	Oleum	
Absynthium seriphion	Iuniperus	
Mentha	Halimos	
Heliotropium minus	Iuglans	
Cedria	Ficus	
Aizoon maius.	Fiber	
TINEIS contraria.	Talus suis	
Citria.	Triticum	
TONSILLARVM	Mihum	
morbi remedia.	Panicum	
	Eruum	
	Atriplex	



# INDEX

Sisymbrium		corum remedia.
Piper	Scilla	TORPORIS remedia.
Agaricum		Fagus.
Rhaponticum		TORSIOMIS
Centaurium maius		remedia.
Eryngion		Tragoriganum.
Calamintha		TOXICO contraria.
Serpyllum		Glande;
Sampfuchus	Ruta	Sanguis.
Panaces heracleon		TREMOREM
Acetum		excitientia.
Cyminum satium		Vnguentum cinnamo-
Seseli Mafsiliense		minum.
Cyminum sylvestre		TREMORIS remedia.
Elaphoboscon		Lepus terrestris.
Petroselinum		TVBERCVLO.
Daucus		rum suppuration-
Libanotis		nis remedia.
Ferula		Strigmēta gymnastorū
Peucedanum		Morus Cape
Asclepias		Asphodelus
Melissophyllon		Panaces Asclepion
Phalangion		Laserpitium
Coniza		Viscum Thapsia
Alisma		Mandragoras
Chamæpitys		Ephemeron
Gramen		Cucumis anguinus
Pseudobunion		Vrtica
Chamædapne		Aerugo aurificum
Vinum scillite		Lapis Asius
Vinum cedrite		Terra cimolia.
Vinum hyssopite		TVBERA exte-
Vinum tragoriganite		nuantia.
Vinum panacite		Triticum
Aphronitrum		Leontopodium
Et in verbo, Dysenteri.		Scam



# CVRATIVVS.

Scammonia  
Vinum nigrum è labru-  
fca.

TVMORVM  
remedia.

Anagyris  
Platanus  
Fagus  
Ilex  
Hordeum  
Brassica fatiua & sylue-  
stris  
Cucurbita  
Nasturtium  
Hydropiper  
Bulbus esculentus  
Isatis  
Chamaeleon  
Tragoriganum  
Sampfuchum  
Ligusticum  
Daucus  
Libanotis  
Melanthion  
Orchis serapias  
Orminum  
Buphthalmus  
Cannabis syluatica  
Polygonon mas  
Lagopus  
Helxine  
Pentaphyllum  
Peristereon supinus  
Hyoscyamus  
Psyllium  
Xanthium

Adeps  
Faba

Sesamoides  
Ephemerum  
Phlomis  
Cucumis anguinus  
Thapsia  
Chamaesyce  
Pygnoconomum  
Aqua maris  
Indicus lapis  
Fæx vini  
Spongia.

TVSSIS remedia.

Amygdala amara  
Asphodelus  
Apium sativum  
Bdellium  
Bromos  
Cinnamomum  
Calamus odoratus  
Cupressus  
Cedrides  
Cistos  
Cacalia  
Chamaedrys  
Tragacantha  
Dracunculus  
Faba  
Helenium  
Hippuris  
Hyoscyamus  
Iris Illyrica  
Lycium  
Laserpitium  
Melicratum  
Origanum  
Paliurus  
Peucedanum  
Prasium  
Papauer sativum

Mel

Pix  
Piper



# INDEX

Ruta	Styrax	Myrrha	
Struthion		Lacerta	Linum
Smyrnion		Porrum	Cæpe
Sulphur		Bulbus esculentus	
Triticum		Pulegium	
Tragoriganum		Balanus myrepfica	
Terebinthina		Cici	Sory.
Vua passa.		Ampelos leuce.	
TVSSIS veteris		VARICES sanantia.	
remedia.		Cirfion.	
Asarum		VENEFICIIS	
Myrrha		medetur	
Nuclei pini		Scilla.	
Mastiche		VENEREM cum vo-	
Naphtha		luptate expedientia.	
Cerasia		Laurus Alexandrina.	
Amygdala amara		VENEREM co-	
Auellana		hibentia.	
Allium		Portulaca	
Ficus	Propolis	Lactuca	
Rhaphanus		Lactuca sylvestris.	
Scilla	Hyssopus	VENEREM sti-	
Centaurium maius		mulantia.	
Baccharis		Costum	Crocum
Seseli Malsiliense		Mastiche	
Daucus		Linum	
Sagapenon	Galbanum	Rapa sativa	
Scordion		Sicer	Eruca
Bechion		Porrum	Cæpe
Helxine		Nasturtium	
Phlomides		Dracunculus maior	
Acetum		Dracunculus minor	
Vinum hyssopite		Bulbus esculentus	
Sandaracha.		Mentha	
V	VAROS purgãtia	Staphylinus	
Oleũ	balaninum.	Anisum	Orchis
			Orc



# CURATIVVS.

Orchis ferapias	Oleum	Pix
Satyrion	Paliurus	Lycium
Satyrion alterum	Olea Aethiopica	
Orminum	Iuglans	
Xiphium	Lixiua ex ficu	
Vrtica	Lepus terrestris	
Caliopfis.	Fiber	Butyrum
VENENATA	Sanguis	Vrina
fugantia.	Rapa satiua	
Vitex	Malua	
Dictamnus.	Erysimon	
VENAS excitantia.	Agaricum	
Vinum Phalernum.	Aristolochia secunda	
VENTRIS anima-	Abrotonum	
lia expellentia.	Ruta	Apium
Vide, Tineas latas.	Laserpitium	
VENTREM soluentia.	Leucas	
Vide, Aluum soluentia.	Polium	Cestron
VENENATORVM	Pentaphyllum	
ictus remedia.	Colchicon	
Cardamomum	Epipactis	
Nardum gallicum	Passum	
Helenium	Linum gypsatum	
Cinnamomum	Rubrica lemnia	
Bdellium	Terra samia.	
Ficus	VERMIBVS	
Rhaphanus	contraria.	
Eryngium	Cedria.	
Cuminum syluestre	VERRVCAS	
Althæa	tollentia.	
Tribulus	Batrachion	
Praſium	Clinopodion	
Smilax aspera	Characias	
Aqua maris	Chamaesyce	Dipsacos
Acetum.	Ficus	Groſſi
VENENORVM	Cicer	Lacerta
remedia.		
Cinnamomum		



# INDEX

Heliotropium		Ceruinum cornu	
Fimum		Saccharum	
Staphis agria		Gramen	Malua
Scilla	Thymus.	Hippuris	
VERTIGINIS mor-		Portulaca	
bi remedia.		Lotus syluestris	
Balsamum		Plantago	Vua passa
Lac humanum		Cucumis	
Peucedanum		Scandyx	Passum
Galbanum		Ochra	Porrum
Ampelos leuce		Bulbus vomitius	
Ampelos melæna		Rhaponticum	
Acetum scilliticum		Glycyrrhiza	
Vinum scilliticum.		Tragacantha	
VERTIGINEM		Panaces heracleon	
adgenerantia.		Petroselinon	
Cardamonum		Smyrnion	
Balsamum		Peucedanum	
Hyoscyamus		Fœniculus	
Mandragoras		Nymphæa	
Falernum		Anthemis	Pæonia
Vinum rhetinite		Phalaris	
Mandragorite		Cape	
Aconitum	Cicuta.	Halcyonium	
VESTICAE morbi		Cestron	
remedia.		Vinum terebinthinum	
Meu		Vinum scilliticum	
Nardum Gallicum		Vinum aromatite	
Nuclei pini		Vinum halofanthite	
Cupressus		Lapis morochthus.	
Laurus	Palma	VE SP AR VM iæus	
Palma etate		remedia.	
Myrtus	Lac	Laurus	Malua
Ficus	Ouum	Sisymbrium.	
Cochleæ terrestres		VESTIBVS ne ani-	
Cicadæ	Napum	malia noceant.	
		Absyn	



# CV R A T I V V S.

Absynthium	Beta
Heliochrysos.	Lupinum satium
VIBICES plagarum	Chondrylla
emendantia.	Capa Allium
Sufinum.	Piper
VIPERAE morsus	Dracunculus maior
remedia.	Dracunculus minor
Casia Costum	Asphodelus
Iuniperus	Capparis
Macer	Argemone
Fraxinus Vrina	Gentiana
Carles lignorum	Telephion Ruta
Triticum Eruum	Chamaeleon niger
Ferula Anchusa	Libanotis Lilium
Onocheles	Nymphæa Cicuta
Ocimoides	Erythrodanum
Diosc.lib.6.cap.63.	Helleborum nigrum
Herm.Cor.cap.72r.	Cucumis anguinus
VIRIVM infirmi-	Balanus myrepica
tates roborantia.	Narcissus
Nuclei pini.	Sulphur
VISCO contraria.	Halcyonium
Vinum in communi	Terra melia.
Acetum	VITRA fracta con-
Vinum absynthite	glutinantia.
Diosc.lib.6.cap.2r.	Herm. Cor.cap.254.
VISCERVVM mor-	VMBILICI re-
bi remedia.	media.
Thus.	Lapis magnes.
VITILIGINIS	VNGVIBVS vtilia.
remedia.	Pix Cupressus
Daphnoides Myrtus	Daphnoides
Ficus Crossi	Olea Oryza
Cochleæ terrestres	Linum Lapathum
Lepus terrestris	Bulbus esculentus
Sepiæ Faba	Batrachion



# I N D E X

Chelidonium minus	Aes vstum
Viscum	Vua passa
Sandaracha	Chrysocolia
Alumen	Rubrica lemnia.
Sulphur	VOMITIONES co
Fæx vini.	hibentia.
VOCÊ claram red-	Atriplex
dentia.	Acetum
Myrrha	Apium
Styrax	Faba
Silurus.	Mentha
VOLVPTATES	Eupatorium.
animi augescencia.	VOMICAE morbi
Buglossum.	remedia.
VOLVCRVM mor	Paliurus
sus remedia.	Thlaspi
Iecur aprinum.	Struthion
VOMITIONES	Eryngion
mouentia.	Psyllion
Irinum	Mandragora
Laurus	Acetum.
Cochleæ terrestres	VRENDI vim ha-
Omotarichos	bentia.
Blattæ	Misy
Pepo	Melanteria.
Asphodelus	VREDINEM fa-
Capparis	cientia.
Bulbus vomitorius	Trifolium.
Origanum	VRINAE difficulta-
Celtrum	tem generantia.
Anagyris semen	Diosc. lib. 6. in præfat.
Papauer spumeum	VRINAE harenosæ
Mandragoras	& asperæ remedia.
Daphnoides	Papauer ceratitis.
Helleborus albus	VRINAM cruentam
Elaterion	mouentia.
Silybon	Clymenon.
Balanus myrepica	VRINAM arces-
Narcissus	sencia.
Cici	Eruum
Melicratum	Galbanum.
	VRINAM mo-
	uentia.
	Acor



# CVRATIVVS.

Acorus	Meu	Erinaceus marinus	
Cyperus		Cimices lecti	
Cardamomum		Oues	Buprestis
Nardi spica		Vermes terreni	
Nardum Gallicum		Mel	Hordeum
Afarum	Phu	Zythum	
Malabathron		Milium	
Casia		Panicum	
Cinnamomum		Cicer	Eruum
Costum		Rapa sativa	
Iuncus odoratus		Rhaphanus	
Calamus odoratus		Rhaphanus agria	
Balsamum		Sifer	Bunion
Crocum		Brassica sativa	
Crocomagma		Asparagus	
Helenium		Sisymbrium aquaticum	
Oleum amygdalinum		Crithmon	
Vnguentum melinum		Cucumis	Pepo
Sufinum		Lactuca	
Irinum		Gingidium	
Amaracinum		Caucalis	Eruca
Bdellium		Ocymum	
Picea	Nuclei pini	Smilax hortensis	
Lentiscus	Resina	Porrum	
Terebinthus		Ampeloprasen	
Cupressus		Cæpa	Allium
Iuniperus		Piper	
Populus alba		Struthion	
Paliurus	Tilia	Dracunculus	
Olea Aethiopica		Asphodelus	
Glandes	Myrtus	Scilla	Capparis
Palma elate		Agaricum	
Siliquæ	Cotonea	Crocodilion	
Mala Epirotica		Centaurium maius	
Cornus		Chamæleon albus	
Amygdalæ dulces		Acantha leuce	
			Acanth



# I N D E X

Acantha	Anonis	Saxifragon	
Eryngion		Xyris	Gramen
Abfynthium		Gramen parnaſium	
Abrotonum		Phœnix herba	
Tragoriganum		Hippuris	
Eleliſphacos		Oxyſcœnos	
Thymus		Heliochryſos	
Serpyllum		Aſtragalus	
Baccharis		Hyacinthus	
Ruta	Moly	Papauer rhœas	
Ligultiſicum		Strychnon hypnoticon	
Staphylinus		Cotyledon prima	
Tordylon		Vrtica	Arction
Siſum	Aniſum	Vinum Leſbion	
Caros	Anethum	Hydromel	
Cyminum ſylueſtre		Melicratum	
Opium		Vinum rhetinite	
Oreofelinum		Vinum catorchite	
Petroſelinum		Vinum è cedro	
Daucus	Libanotis	Vinum è lauro	
Melanthion		Vinum abſynthite	
Ammoniacum		Vinum calaminthite	
Chamædrys		Vinum aromatite	
Trifolium	Scordion	Vinum neſtarite	
Androſaces		Vinum nardite	
Anthyllis		Vinum aſarite	
Anthemis		Vinum ſylueſtris nardi	
Lithoſperma		Vinum daucite	
Erythrodannum		Vinum acorite	
Lonchitis	Althæa	Halcyonium	
Hypericon		Lapis hæmatites	
Choris		Lapis Iudaicus	
Chamæpitys		Corallium	
Ceſtron		Vinum chamæpyteos.	
Polygonon mas		VRTICAE herbæ	
Polemonia		pruritus remedia.	
		Herm	



# CVRA TIVVS.

Herm. Cor. cap. 707.

VSTIS vitia.

Vrtica siue acalyphe.

VVAE faucium  
remedia.

Pix

Pruna

Hirundines

Vrtica

Omphacium

Acetum

Flos æris

Alumen

VVLPE S necantia.

Apocynon.

VVLNERVM re-  
media.

Amurca

Allium

Argemone

Aristolochia

Aloë

Althæa

Androsæmon

Lycopsis

Butyrum

Bralsica

Coccus

Chamæpitys

Centaurion

Cyclaminos

Cytinus

Cupressus

Dracunculus

Di&amnus

Aerugo aurificum

Galla

Sal.

Anthyllis

Acetum

Oenanthe

Ficus Aegyptia

Fimum

Gentiana

Glycyrrhiza

Glutinum

Hippuris

Ifatis

Lana succida

Ligusticum

Lilium

Lyfimachion

Minium sinopicum

Myriophyllon

Picea

Palma

Portulaca

Porrum

Polycnemon

Polium

Polygonon mas

Polygonatum

Pentaphyllum

Phœnix herba

Pteris

Peristereon

Papauer

Plumbum elotum

Scordion

Symphyton

Sideritis

Stratiotes aquaticus

Spongia

Cochleæ terrestres

Thus

Terra cretria

Vm



# INDEX

Vinum	Iuniperus
Vinum œnanthe	Laurus
Vnguentum citrinum	Myrica
Vlmus	Cistos
Vitex.	Rosa
V V L V AE mulie-	Lycium
ris remedia.	Acacia
Meu	Amurca
Cyperus	Vitex
Nardi spica	Galla
Casia	Palma elate
Costum	Myrtus
Iuncus odoratus	Cotonea
Balsamum	Iuglans
Bryon	Cimices lecti
Narcaphthum	Lae schiston.
Oleum amygdalinum	Butyrum
Mastichinum	Oelypum
Vnguentum rosaceum	Coagulum
Melinum	Adeps
Sampsuchinum	Fœnogræcum
Abrotoninum	Pinum
Susinum	Malua
Narcissinum	Portulaca
Crocinum	Plantago
Irinum	Sonchos
Gleucinum	Porrum
Amaracinum	Sinapi
Metopium	Piper
Cinnamomum	Agaricum
Myrrha	Rhaponticum
Syrax	Pulegium
Bdellium	Centaurium maius
Lentiscus	Melilotus
Pix	Ruta
Naphtha	Panaces heracleon

Amma



# CVRATIVVS.

Ammi	Ageraton
Sphondylion.	Vinum terebinthinum.
Peucedanum	Vinum cedrite
Sagapenum	Vinum picatum , siue
Galbanum	pissite
Asclepias	Vinum chamædryte
Lilium	Vinum daucite
Circæa	Vinum helleborite
Artemisia	Lapis gagates
Geranion	Peristereon rectus
Anthyllis	Hyoscyamus
Parthenion	Mandragoras
Pæonia	Ebulus
Cestron	Ampelos leuce
Clematis daphnoides	Acetum
Chrysocome	Acetum scilliticum.


INDICIS CVRATIVI

FINIS.



Lugduni,  
Excudebat Iacobus  
Faure.







ad Caput III libri quarti propriam  
etiam graeci codicem apud Dionysium  
Chamalarum Regem pro. alp. Libris  
replant. Exot. cap. 35.

ad. Cap. clx libri 2. In hujus planta  
nominibus, interde non consentiens auctor  
tantum interpretum culpa maxime Dios  
coridi. super hac verba de ad phos do earo  
ὁ λείων ἔχεται ἡ κάλας ἀνθός καὶ οὐρανός ἀνθός  
ita interpretatur caule leui flosculi in racem  
florem, quem anthucon appellant; cum adye  
καὶ οὐρανός id est vocatur respicendum de ad  
caulem non ad florem ut ceteris pluri  
ostendit, quod non aeneas ad huc  
emendatum. Aristoteli in annot. ho  
in commentariis aniali lustrari in Dioscoridis  
libro de med. medic.



